

هَدِيَّةُ الْمُفْتَطِنَةِ السَّنَوِيَّةِ

الْفِرَقَاتُ الْحَدِيثَةُ

حَاضِرُهَا وَمُسْتَقْبَلُهَا

تَأليف

الشيخ محمد بن أبي الخير

ليسانسيه في العلوم والتاريخ من مدرسه المعلمين العرب
مدير ادارة السينما بوزارة المعارف

المكتاب موضح بالصورة

قالت عنه لجنة الفحص بوزارة المعارف

« ان المطومات الواردة به قد تناسب ادراك طلبة الجامعة المصرية
الذين يدرسون مواد تتصل بعلم الطبيعة »

الطبعة الاولى

١٣٥٩ - ١٩٤٠

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

طبع بمطبعة نفطية بمطبعة



هَدِيَّةُ الْمُقْتَلِفِ السُّوِّيِّ

الْفَيْرِيقَا الْكَلِيشِيَّة

حَاضِرُهَا وَمُسْتَقْبَلُهَا

تَأليف

أحمد فؤاد أبو الخير

إيسائيسيه في العلوم والتربية من مدرسة المعلمين العليا
مدير إدارة السينا بوزارة المعارف

الكتاب موضح بالصورة

قالت عنه لجنة الفحص بوزارة المعارف

« إن المعلومات الواردة به قد تناسب ادرالك طلبة الجامعة المصرية
الذين يدرسون مواد تتصل بعلم الطبيعة »

الطبعة الاولى

١٣٥٩ - ١٩٤٠

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

طبع بمطبعة المقطف والمقطم

مقدمة

أما بعد فأريد في سلسلة البحوث التي يتضمنها هذا الكتاب مخاطبة قرائي الذين ليست لهم معرفة سابقة بالفيزيكا الحديثة . وأؤكد لهم أنهم سيخرجون من مطالعتها منشروحي الصدور وإن كان بعضهم قد لا يقتنع بها اقتناع الرجل العلمي

سأقدم لقرائي في القسم الأول من هذا الكتاب ، وهو الخاص بمحاضر الفيزيكا ، « دنا جديدة بدل تلك الدنا القديمة » ، دنا جديدة في الفرات وفي النجوم ، وصورة جديدة لأرضنا بهوائها ومائها وتربها . والحق أن الفيزيكا قد خطت إلى الأمام خطى واسعة مذهشة أثرت في العالم المادي كل التأثير ، ومن ثم نجتم علينا تصوير دنيانا من جديد على أساس كشفها الحديثة وسأقدم لقرائي في القسم الثاني من هذا الكتاب ، وهو الخاص بمستقبل الفيزيكا ، ما يجعلنا نقرب كثيراً من الوصول إلى تفسير المادة والحياة والعقل تفسيراً علمياً ، وسأخرج بهم إلى أن الفيزيكا والبيولوجيا والسيكولوجيا تتلاقى كلها عند مسألة الحياة . وسأدرس معهم مسألة الزمن على ضوء كل من الفيزيكا والفلك . ولا إخالهم بعد ذلك إلا معتقدين معي أن العلم إذا نجح في تفسير هذه المسألة وتطبيقها تطبيقاً فيزيقياً خالصاً سيؤدي إلى ظهور نوع جديد من العلم ، هو العلم العام الجامع الشامل

وأعد قرائي ألا أنجح بهم في حضم النظريات — وخصوصاً الرياضي منها — ولكني سأطلعهم على الأعماق وهم وقوف على الشاطئ . ولعلهم أن ليس لي في ذلك أي فضل ، لأنني إنما أنقل إليهم أقوال أهل الفضل ، وتلك حقيقة أرتاح دائماً إلى الاعتراف بها . فليفهم قرائي ذلك ، ولعلهم أتني ناقل عن كتب غيري ، جامع من كتب غيري ، مترجم عن كتب غيري ، مع تصرف يناسب ظروف الحال . وفوق هذا وذاك أعلن أنني أتقبل مع السرور كل ما يوجه إلي من نقد سليم ، لكي أتلافى كل ما يمكن تلافيه مما يكون قد فاتني ، وذلك إذا قدر لسكتاني هذا أن يباد طبعه

والله أسأل أن يضطلع كتابي هذا بحظه في نشر الثقافة العامة ، والله أسأل أن ينفع به

القسم الأول

حاضر الفيزيقا

وفيه أربعة عشر فصلاً

من الأول إلى الرابع عشر

الفصل الاول

ذرات الكهرباء

من المفيد لنا أن ندرس طبيعة السكون ، لأن ذلك من جهة يسحو
بنا فوق كل وضع ولا أنه من جهة أخرى يجر الروح وبكسها
الشجاعة والرفعة اللتين تلزمان لها وقت الحاجة
« سكا »

زبد أن نستكشف طبيعة المادة وطبيعة الفضاء أيضاً . فلنفكر إذن في مختلف أنواع المادة
الشائعة المتداولة . لقد اهدى الأقدمون بتفكيرهم إلى العناصر الأربعة ، النار والهواء والتراب
والماء . ولكن هذه الأشياء في الحقيقة معقدة . فلنوجه تفكيرنا إلى جهة أخرى
لنبحث في أن المادة قد تكون صلبة وقد تكون سائلة وقد تكون غازية ، فذلك التقسيم مبسور
لأنه يدل على الصيغ المعروفة عن المادة . وكل ما يحتاج إليه في هذا الصدد ينحصر في تغير
درجة الحرارة فتتميز المادة من صيغة لأخرى أو من حالة لأخرى . فمثلاً لكي نحيل الماء ثلجاً
أو بخاراً ، أو لكي نحيل الهواء هواء مسالاً أو جامداً ، أو لكي نصهر الحديد ونحيله بخاراً
فالأمر كله يتوقف على الحرارة . فأي أحوال المادة هذه يكون أسهل في البحث والدرس ، أو
بعبارة أخرى أي هذه الأحوال يستطيع أن يصل إلى حل لغز طبيعة المادة ؟ الظاهر أن الغاز
خير ما يستطيع ذلك ، لأن للغازات على الرغم من أنها لا ترى في العادة ، وعلى الرغم من عدم
سهولة فحصها تمتاز بأنها أقل أنواع المادة امتلاءً واندماجاً . فلتر الماء إذا استحال بخاراً بلغ
حجمه ١٦٧٢ لتراً ، ثم إن الجسيمات الدقيقة يسهل فحصها كلما قل عددها

ولقد كان فن خزن الغازات وقياسها مستعصياً على الفهم ، ولكن قد مضى الآن ما يقرب
من ثلثمائة عام على الخطى الأولى التي خطاها في هذا الصدد روبرت بويل Robert Boyle
بعد أن نجا من القبض عليه في الحرب الأهلية لأنه كان من الحزب الملكي بالجملة ، فقد ذهب
إلى الريف حيث انصرف إلى تجاربه وتدريبيه ، فوضع أساس معلوماتنا عن الغازات في الجملة ،
وساعده في ذلك أحد أبناء وطنه واسمه شارلز Charles صاحب فكرة المناطيد ذوات الهواء
الساخن التي كان لها أثرها أيام الثورة الفرنسية . ولكن صاحبين هذين ما استطاعا أن يذكرنا
ما إذا كانت الغازات متألقة من جسيمات منفصلة أو ما إذا كانت مادة منتظمة غير مجزأة

ومنتشرة بركة متناهية . هذه المسألة القديمة لم تكن وقتذاك قد حلت ، فمن بين الاغريق ظهر كثيرون من أمثال أنكساجوراس Anaxagoras وهو معلم سقراط ، وقالوا إن نقطة الماء يمكن أن تنجز جزءاً بعد آخر ، وهكذا إلى ما لا نهاية . وظهر آخرون أشهرهم ديمقريطس Democritus ممن كانوا يقولون بوجود جزء نهائي للماء أو أية مادة أخرى لا يمكن أن تنجزاً وهو الجوهر الفرد . ولكن درس الفازات قد مكنتنا من التثبت من صحة النظرية الثانية التي قال بها ديمقريطس ، وهي النظرية الذرية القائلة إن لكل مادة جزءاً نهائياً إذا انقسم كانت النتيجة مادة أخرى مخالفة

وأدخلت كلمة « ذرة » وصارت تطلق على هذه الأجزاء الصغيرة التي لم يكن يعرف عن طبيعتها شي إلا رجاح إليه . ولا بد لكل جديد من اسم جديد . ونحن نحسن صنفاً إذا عرفنا بعض هذه المسميات . فهناك جسيمات من الكهربائية . وهذه لن نسميها ذرات بل سنسميها « بروتونات » و « إلكترونات » وسنتكلم عنها فيما بعد . وهناك نومان من جسيمات المادة . فأما التي لا تنجز إلى أبسط وأخف من نفسها فهي « عناصر » وأما التي تنجز فهي « مركبات » فمثلاً يمكن أن ينقسم الماء إلى غازين هما الايدروجين والاكسيجين ، ويمكن أن ينقسم السكر إلى نفس هذين الغازين مضافاً إليهما الكربون ، بينما الحديد والرصاص والزجاج والراد يوم لا يمكن أن تتحول بأي الوسائل الصناعية إلى مواد أخرى أبسط منها . ويسمى أصغر أجزاء العنصر « ذرة » وأصغر أجزاء المركب « جزيئاً » . وواضح أن الجزيء شيء أكبر من الذرة لأنه يمكن أن ينقسم إلى ذرات ، ولكنه ليس أكبر منها كثيراً . وقد أثبت الكيميائيون أن لجزيء الماء ثلاث ذرات داخلية فيه ، ولجزيء ملح الطعام اثنتين ، ولجزيء سكر القصب خمساً وأربعين ذرة ولجزيء المركبات المعقدة أكثر من ذلك عدداً . فالجزيء أكبر من الذرة ولكنه لا يختلف عنها كثيراً وستتناول الذرة أولاً بالبحث لبساطتها

إن أنواع الذرات أقل عدداً من أنواع الجزيئات ، إذ يوجد من الذرات تسعون ذرة مختلفة استكشفها العلماء ودلت الأبحاث على وجود اثنتين أخريين . أما الجزيئات فقد عرف منها عشرات الألوف ولا يزال يستكشف الجديد منها الفينة بعد الفينة . ويصح أن نشبه تكوين الجزيئات غير العضوية من الذرات بتكوين الكلمات من الحروف مع فرقين اثنين : أولهما أن عدد الكلمات كبير ، لأن نفس الحروف قد تعطي أكثر من كلمة إذا تغير ترتيب وضعها فمثلاً من الحرفين م م م يمكن أن تصوغ الكلمتين « من » و « مم » ولكن ذرة واحدة من الأكسيجين قد تتحد بأخرى من الكربون فينشأ الغاز السام أول أكسيد الكربون ولا شيء سواه . وثانيهما أننا قد نختزع كلمة بوصل حرفين بعضهم بعض ، ولكن يستحيل أن نصل

ذرة إيدروجين بذرة أكسيجين فيتحداً معاً — بل لسكي يحدث الاتحاد بين هذين الغازين وتكون نتيجة هذا الاتحاد تكوين الماء لا بد من وجود ذرتين من الايدروجين وذرة واحدة من الأكسيجين . وتختلف العناصر كثيراً جداً في السهولة التي بها يمكن وصلها بعضها ببعض وبعضها كالمليوم مثلاً يأبى الاتحاد بناتاً وبعضها كالكربون والايدروجين والأكسيجين مثلاً على استعداد الاتحاد على نطاق واسع اضطر علماء الكيمياء إلى أن يفردوا لهذه المركبات سمياً خاصاً سموه « الكيمياء العضوية »

والذرات التسمون المختلفة متناهية كلها في الصغر بحيث لا تراها العين ولا المجهر . وأكبرها ذرة عنصر السيزيوم Caesium ويبلغ قطرها جزءاً من مائتي مليون جزء من البوصة . وأصغرها ذرة الايدروجين ويبلغ قطرها ربع هذا القدر . وفي المواد العادية تكون الذرات متلاصقة ومندمجة بحيث يشغل العدد الكبير منها حيزاً صغيراً جداً . فيوجد في رأس الدبوس مثلاً من الذرات بقدر عدد جالونات الماء الموجود في جميع بحار العالم . ولو أنك أعطيت من رأس الدبوس مليون ذرة لكل إنسان في هذه الدنيا ما فقدت رأس الدبوس ، بل قد تخيل إليك أنك لم تقصها شيئاً . والواقع أنك تستطيع أن تعاود الهبة خمسين ألف مرة قبل أن تنفذ رأس الدبوس ولكن كيف أمكن قياس شيء صغير كالذرة ؟ توجد لذلك طرق كثيرة ليس هذا مكان ذكرها بالتفصيل . وإحدى هذه الطرق مبنية على تجربة أجراها لورد رالي Rayleigh لايجاد مقدار سطح الماء الممكن تغطيته بنقطة زيت . وأخرى عن طريق قياس سرعة سريان غاز خلال أنبوبة ضيقة ، وهذه الطريقة تعطينا حجم الذرات إذ كلما كبرت الذرات زاد اعتراض بعضها سبيل البعض الآخر وأبطأ سريان الغاز في الأنبوبة . وثالثة خاصة بقياس زرقة السماء ، لأن هذه أيضاً تنوقف على عدد جسيمات الهواء الدقيقة وعلى حجمها

أضف لذلك أن هذه الذرات لا يمكن أن تستقر أبداً ، وهذه حقيقة هامة لا بد من الاشارة اليها . وحتى في المادة الصلبة التي تبدو مينة عديمة الحركة ترقص الذرات باستمرار ولا يمكن أبداً أن يقر لها قرار . ولقد وصل كبار العلماء الفيزيقيين إلى جعل هذا الرقص يبطل ، كثيراً جداً ، ولكنهم لم يصلوا إلى إيقافه . وذلك لأن هذه الحركة ماهي إلا الحرارة التي نعرفها . ومن المعلوم أن المادة وهي في أصغر درجة حرارة ممكنة لا تزال تحتوي على بعض الحرارة . ففي قطعة الثلج مثلاً يوجد مقدار عظيم من الحرارة ، وكثيراً ما نرى في المعامل كيف ينفلي الهواء للمسال . وحرارة الثلج لا تظهر عادة لأن الحرارة لا يمكن أن تخرج من الجسم إلا إذا وجد بجواره جسم آخر أبرد منه أي أقل درجة حرارة عنه . وتلك بعينها هي قاعدة سريان الحرارة من الأجسام العادية . فحرارة النار مدركة بسبب برودة ما يحيط بها من

الأجسام ، وما كان لنا نحن أن نحس بالحرارة الصادرة من أشد الأمكنة المعروفة (أو المتخيلة) حرارة لو أننا كنا في درجة حرارة تماثل درجة هذه المصادر : وما الحرارة إلا حركة سرية جداً للذرات أو الجزيئات ، وكلما كانت الحركة أسرع كان الجسم أشد حرارة. وفي النار المادية توجد حركة جزيئية كبيرة ، تنتقل إلى ذرات المحرك الموضوع في النار، حتى إذا ما لمسناه زادت بسرعة حركة جزيئات أصابعنا وشعرنا بالحرارة . وفي الجسم الصلب تكون الذرات مترابطة مترابطة فلا تستطيع هذه الحركة نقلها من أماكنها بشكل محسوس . أما في السائل ، وفي الغاز أيضاً بشكل أظهر ، تكون الذرات أكثر حرية في النقل . وهواء الحجرة التي لا تيارات فيها عملاً بهذه الحركة كذلك . والسرعة التي تسير بها جزيئاته مذهشة . فإذا كانت درجة حرارة الهواء 20° على مقياس فهرنهايت (28° على الترمومتر المئوي تقريباً) كانت السرعة المتوسطة للجزيئات ٥٤٠ ياردة في الثانية . وجزيئات التروجين أسرع قليلاً من جزيئات الأكسجين لأنها أخف . فإذا ما طبقت درجة الحرارة إلى نقطة التجمد طبقت السرعة إلى أقل قليلاً من ٥٣٠ ياردة في الثانية ، ومن ذلك يتضح أن درجة الحرارة لا بد أن تهبط كثيراً إذا هددت هذه الحركة . وعلى الرغم من ارتفاع سرعة جزيئات الهواء فإن هذه الجزيئات لا يمكن أن تقطع أية مسافة كبيرة لأنها كثيراً ما تصادم بعضها مع بعض

وقد ساعدت هذه الحركة كل المساعدة في عملية عد الذرات . فالذرات نفسها صغيرة جداً لا ترى حتى بأقوى مجهر (ميكروسكوب) ، فلا يمكن أن تتوقع رؤية حركتها مباشرة . فأصغر جسم استطاع الميكروسكوب كشفه هو ما بلغ عرضه جزءاً من مائة ألف جزء من البوصة ، وهذا القدر يسع ألف مليون ذرة . فإذا طفا جسم له هذا الحجم فوق سائل فلا بد أن يرتطم من كل جانب بتلك الذرات المتحركة حوله فلا يمكن أن يظل ساكناً . وقد لا يستطيع جسم كبير أن يتحرك بحركة محسوسة من جراء هذا النظام وذلك لثقله ، ولكن الجسم الصغير لا بد أن يتحرك ببطء . وتحدث هذه الحركة باستمرار طالما وجدت جسيمات صغيرة صلبة معالقة في سائل ، ويكون منظرها خلاباً إذا أنت نظرت إليها بالميكروسكوب وهي كذلك . وقد سميت بالحركة البراونية نسبة إلى العالم الثاني براون Brown الذي كان أول من لاحظ ذلك منذ مائة سنة . ثم بحث المسألة من جديد الأستاذ بيرن Perrin بحثاً دقيقاً جداً مستعملاً جسيمات دقيقة من دهان الكبريت العادي (صين النفط) طافية فوق سطح الماء الراكد . ومن مدى الحركة الاهتزازية لكل جسيم استطاع أن يحسب عدد الصدمات الذرية التي تعرضت هذه الجسيمات لها بسبب جزيئات الماء المحيطة بها ، ومن ثم استطاع أن يوجد عدد الجزيئات

على أن أعداد الذرات وأوزانها لم يعمل إلا قليلاً في سبيل تفسير طبيعة المادة ، غير أن

ذرات الكهرباء

هذا هو كل ما كان قد عرف عنها عند نهاية القرن التاسع عشر . ولم نستطع فهم السبب الذي من أجله تكون مادة ما أصلب أو أمتن من أخرى إلا بعد أن خطروا إلى الأمام خطوة أخرى ، وعرفنا كيف تبعاً هذه الذرات وتحزم فتتساك معاً ، فإذا فرضنا أن الذرات كرات صغيرة صلبة كالكرات الرخامية صلب علينا في الواقع أن ندرك السبب في أن جميع البلورات غير متساوية في الصلابة وغير متشابهة في الشكل . وتحيى بعد ذلك مشكلة ألوان الأجسام ولماذا لا تكون كلها واحدة ، فشكلة النجوم وكيف استطاعت أن تبت لنا بصورها وهي في هذه الأبعاد السحيقة . أمثال هذه المسائل المتواضعة والصعبة معاً قد أجابت عنها كشف الثلاثين سنة الأخيرة ، وكان ذلك بمثابة الثمار الأولى لنهضة علمية لا زلنا في عجائبها سادرين وظهر في الوجود من ثم علم جديد ، هو علم الفيزياء الذرية العملي والنظري ، وهو ابتكار حديث وكشف عظيم وصل إليه عقل الانسان ، وفتح جديد له انتصر به على ماحوله

وتبدأ قصة ذلك باستكشاف سير ج . ج . طومسون J. Thomson . ولجسيم الكهرباء السالبة سنة ١٨٩٧ . وهو لم يكن يجري تجاربه على الذرات مباشرة بل كان غرضه الوصول إلى معرفة طريقة سريان التيار الكهربائي . واستمر يحرب في الغازات لهذا الغرض على الرغم مما كان معروفاً من أن الكهرباء تبدو كأنها تسري خلال الغازات بشكل أكثر تمقيداً منه خلال الأجسام الصلبة ويستدلون على ذلك بمثل شهير وهو الفرق بين مظهر وميض البرق وميض أضواء الشمال (الفجر الكاذب) ، إذ أنهما كليهما حالتان لسريان الكهرباء خلال الغازات . وحينما يفرغ الغاز من بصلة زجاجية تفريفاً شديداً يصبح التيار الكهربائي الذي يسري داخلها منظوراً ، ويبدو للعين كأن سبلاً ينهمر في البصلة من أحد طرفيها وينشر فوق جدرانها نوراً أصفر مخضرراً ، وإذا ما اعترض هذا السيل جسم ما ظهر له ظل — الأمر الذي يدل على أن هذا السيل المضيء يسير في خطوط مستقيمة . ويبدو هذا السيل وكأن له ضغطاً شديداً فكأنما هو متألف من شيء مادي ، وسبب ذلك أنه لما وجه في أنبوبة سير ولیم كرووكس Sir W. Crookes إلى عجلة خفيفة من الميكات دأرت العجلة على الفور متحركة فوق قضيتين . وفي الحقيقة إن العجلة لم يدها السيل لما له من كتلة وسرعة فقط ولكنها تسخن بسببه أيضاً فتدور كعجلات الراديو متر الصغيرة التي نراها في نوافذ صانع الآلات البصرية دائرة في ضوء الشمس

ولهذا السيل صفتان أخريان من الأهمية بمكان : الأولى أنه يبدو كأنما هو يسير في غير الاتجاه الصحيح ، وذلك لأنه بدلاً من أن يسير من القطب الموجب إلى القطب السالب كما هو المفهوم من الحمل الكهربائي نراه يسير في الاتجاه المخالف ، ولذا سمي بالسيل المبهطي أو

أشعة المهبط الذي هو القطب السالب . والثانية أن يجري هذا السيل ينحرف إذا اقترب من الأنبوبة مقابليس أو شحنة كهربائية ، وهذا يدل على أن السيل الموهطي نفسه هو التيار الكهربائي وقد كان غرض سبنر جوزيف طمس من تجاربه في هذا الصدد أن يقيس مقدار تأثير القضبان المتعادلة في التيارات بشكل مباشر ، وأن يثبت أنه ما كان يصل إلى ما وصل إليه من النتائج لو أن هذا السيل كان متواصلاً . أما إذا كان متألفاً من جسيمات دقيقة من الكهرباء السالبة أمكن على الفور الوصول إلى فهمه وتفسيره . وقد أمكن أيضاً إيجاد وزن الجسيمات وكذلك سرعتها حسابياً من الأقيسة التي أجريت . والتجربة في حد ذاتها بسيطة نسبياً ، وصار الآن طالب العلوم يجرىها في معمله لأنها تدخل ضمن مناهجه العملي في السلكية

ذلك كان استكشاف « الإلكترون » وهو الجسيم السالب . والالكترون خفيف الوزن جداً لأنه أخف من أخف ذرات المادة ، وهي ذرة الهيدروجين ، ألف وسبعمائة مرة . وتلك حقيقة فذة تطلنا بها تجاربنا في الطبيعة . ومن الغريب أن الطبيعة في تغيراتها الكثيرة سواء كانت مادتها تذوب أو تموت ، أو كانت تخرق أو تتجمد ، أو كانت تصدأ وتضمحل ، لم يعرف عنها يوماً أنها استطاعت إبادة أقل جسيمات المادة أو خلقها من جديد . ولقد وزن الكيميائيون بموازنتهم البالغة غاية الحساسية ، المواد خلال ما يقع لها من التغيرات الكثيرة فما وجدوا قط تغيراً في الوزن . فإذا احترقت شمعة مثلاً فإن كل جزء من مادتها يمكن أن يثر عليه في الهواء على صيغة غاز . أما الالكترون فيستطيع عملياً أن يغير وزنه — ويستطيع ذلك بكل بساطة إذا هو زاد من سرعته . وهذا بلا شك حدث عظيم وتغير كبير في قوانين الطبيعة وسنعود إلى مناقشة ذلك فيما بعد عند الكلام على النسبية في الفصل الثاني عشر . ولن يظهر هذا التغير إلا في حالة السرعات الكبيرة جداً . وهذه يمكن أن تصل إليها الالكترونات بسهولة نظراً لخفتها المتناهية ، إذ من السهل أن نكسبها في أنبوبة الفراغ العادية سرعة تبلغ عشرة آلاف ميل في الثانية ، بل قد وجدت إلكترونات تسير بسرعة تزيد عن عشرة أمثال هذه السرعة . فليس مدهشاً من ثم إذا نحن قلنا بوجود تنقيح القوانين العادية إذا هي طبقت على المادة المتحركة بسرعات عظيمة تقرب من سرعة الضوء . وقد اقترح كروكس أن يسمى السيل الموهطي الحالة الرابعة للمادة لأنه ليس صلباً ولا سائلاً ولا غازاً . وله بعض الحق في هذه التسمية . وسنرى بعد أن جسيمات الكهرباء هذه هي الحقيقة جسيمات المادة أيضاً وإن تكن أصغر كثيراً من الذرات

وليس من السهل تقرير حجم الالكترون ، أما وزنه فقد وجد أن جميع الالكترونات ذات وزن واحد حينما تتساوى سرعاتها . وأما شحناتها الكهربائية فتساوية دائماً . والثابت أنه

لا يوجد إلا نوع واحد من الالكترونات ، ونستطيع تقدير حجمه عن طريق نظرية الوزن الكهربائي ، أو الكتلة الكهربائية بالأحرى ، وهذه تتضمن تقاطعاً عويصة جداً ليس هذا مكان شرحها . وقد وجد الفيزيقيون من الأسباب المقولة ما يبرر افتراض أن كتلة الالكترون تنجم عن شحنته الكهربائية ، وأنه ليس سوى كرة صغيرة من الكهربائية قطرها يساوي جزءاً من عشرة بلايين جزء من البوصة . وهذا أصغر من قطر ذرة المادة عشرة آلاف مرة .

على أن استكشاف أن الكهربائية السالبة تتألف من جسيمات جعل من المحتمل كثيراً أن توجد جسيمات أخرى مشابهة ذات كهربائية موجبة . وكان بنيامين فرانكلان Franklin أول من أشار إلى وجود نوعين من الكهربائية ، وإلى أنه يمكن إيجاد هذين النوعين بسهولة وبكميات قليلة . فإذا دلكت قلمك الأنبوس بقطعة من الصوف فإنه يشحن على الفور بالكهربائية السالبة . وحينئذ تدلك سافاً من الزجاج الجاف بالحرير فإنه يشحن بالكهربائية الموجبة . وفي كلتا الحالتين يمكن تبين وجود الشحنتين عن طريق انجذاب قطع صغيرة من الورق أو القش إلى السطح المشحون والتصاقها به بسهولة . ومن الخواص المميزة لهاتين الشحنتين أن السالبة والموجبة منهما تتجاذبان ، فإذا ما تلامسنا تعادلتا تماماً . ومعنى ذلك أنه إذا شحنت القلم الأنبوس بشعر وحدات من الكهربائية السالبة عند ذلك ، ثم أضيف إليه عشر وحدات من الكهربائية الموجبة فلن يكون القلم مكهرباً . ومن المهم أن نعلم أن قطعة الخشب أو الحديد قد تحتوي على قدر كبير من الكهربائية ومع ذلك لا تكون مكهربة ، لأنه إذا وجد مقداران متساويان من نوعي الكهربائية في الخشبة فلا يمكن إدراكهما . وسنشرح عند الكلام على الذرة وبنائها كيف أن كل قطعة من المادة في الكون تحتوي بالفعل على مقدارين متساويين من الكهربائية الموجبة والسالبة — ولا شيء غير ذلك . أي أن المادة تتألف من الكهربائية

ولقد نجح البحث عن جسيمات الكهربائية الموجبة فأثبت وجودها بالفعل ، ولقد سمي العلماء الجسم منها « بروتون » والبروتونات أثقل بكثير من الالكترونات ، ومن ثم كان إيجاد سيل منها تكفي سرعته لتبينه أصعب كثيراً من إيجاد سيل من الالكترونات . وكان الأستاذ فين Wien في ميونخ وسيرج. ج. طمس في كمبرج أول عالمان توصلوا لذلك ، وقد وجدوا أنه إذا صدم سيل سريع من البروتونات لوحة فوتوغرافية فإن علامة سوداء تظهر فوق اللوحة عند تكشفها ، وهذا السيل ينحرف أيضاً إذا ما اقترب منه مغناطيس قوي ، ويكون الانحراف أقل منه في حالة سيل الالكترونات . وبقياس هذا الانحراف أمكن حساب سرعة الجسيمات الموجبة وكذا وزنها وقد ثبت أن الكهربائية الموجبة لا يمكن أن تتألف من مادة منتظمة متواصلة بل لا بد أن تنقسم إلى جسيمات منفصلة . ويكاد وزن البروتون يساوي وزن الذرة الهيدروجينية

أي أنه أثقل من الإلكترون ١٨٥٠ مرة ويتألف من مقدار من الكهرباء يعادل وبضاد مقدار كهربائية الإلكترون بالضبط، وعلى ذلك يمكن أن يتبادل البروتون تماماً مع الإلكترون أما عن حجم كل منهما فلا نستطيع أن نتكلم بهذه الدقة والبساطة . وتبدو البروتونات كأنها أصغر حجماً من الإلكترونات (على الرغم من أنها أكبر وزناً) وذلك لأن سير إرنست رذرفورد Sir Ernest Rutherford استطاع أن يحبل اثنين منها بمقاربان أكثر من تقارب الإلكترونين ، فكان حين البروتونين أصغر من حين الإلكترونين . والواقع أن البروتونات من الصغر بحيث يمكن وضع عشرين ألف بلون واحد منها جنباً لجنب على خط مستقيم في فراغ عرضه بوصة واحدة . وبناءً على هذا التقدير يكون البروتون أصغر من الإلكترون ١٨٠٠ مرة ، وأصغر من أصغر ذرة مليون مرة وهذا من حيث الحجم . والمدعش مع ذلك أن البروتون يكاد يساوي هذه الذرة وزناً !!

يتضح مما مضى أن الإلكترون والبروتون هما أبسط الأشياء التي كشفت حتى الآن في الطبيعة . وحينما حصل الكيميائي جون دالتن John Dalton في أول الأمر على براهين جلية على وجود الذرات ، وكان ذلك منذ مائة سنة ، قال إن الذرات أبسط الأشياء في الوجود . وبعد ذلك جاء كلارك ماكسويل Clerk Maxwell وهو من كبار علماء الفيزياء في زمانه ، ووصف الذرات وصفاً جميلاً قال «إنها حجارة الكون الأساسية » وهانحن قد رأينا أنها ليست أساسية ولا بسيطة كما تبدو ، لأنها هي أيضاً تتألف من جسيمات أصغر منها ، هي البروتونات والإلكترونات وقد تخطو الفيزياء خطوة أخرى إلى الأمام في يوم لعله أن يكون قريباً فتستكشف كيف بنيت هذه البروتونات والإلكترونات . وعند الكلام على نظريات بناء الذرة سنعلم شيئاً عن المجهود الجديد في هذا السبيل . ولنتكلم مؤقتاً باعتبار أن جسيمات الكهرباء هذه هي حجارة البناء المكونة لأنواع المادة المعروفة جميعها

الفصل الثاني

الموجات الأثيرية

يتجهن على الفيلسوف أن يصفي لكل اقتراح تم بحكم فيه نفسه ، وعليه
الأن يتحدده الظواهر والأل يتمسك بمرض دون آخر ، والأل يتسبب لاية
مدرسة والأل يكون له على عقيدته سلطان غير نفسه . يجب عليه ألا يكون
من عباد الأسماء ، بل يكون عبد مذهبه وسجين عقيدته وأن يكون
المحق أول أغراضه . فإذا أضاف الى هذه الصفات الجد في العمل كان
له أن يتطلع الى الوصول الى ما وراء الحجب في معبد الطبيعة

« فرادي »

قد يبدو غريباً القول بأن خواص الفضاء الفارغ الحلاء لا تقل أهمية عن خواص الأشياء
المادية . والحق أنك لا تستطيع البتة أن تتدرب على الفضاء الفارغ ، لأن « الطبيعة تكره الفراغ »
كما كان يقول قدماء العالين ويقصدون طبيعة عالمنا هذا . فحينما لا توجد مادة صلبة أو سائلة
يوجد الغاز على الأقل ، فلا يوجد إذن في عالمنا فضاء فارغ . وحقيقتي إن أخذاً لم ينصح في
إحداث الفراغ بقطع النظر عن فراغ تورشيلي ، وأن الأفضية العظيمة الحالية حقيقة من
المادة إنما هي تلك الاتساعات المماوية العظيمة . لقد خلاصت هذه الاتساعات إلى حد كبير من
المادة بسبب قوة الجاذبية الخفية — رغم كشف أينشتين — التي تجعل أجزاء المادة تتقارب
بعضها من بعض لتكون كتلاً عظيمة كالنجوم وكالأرض وأخواتها الكواكب السيارة . هذه
الأفضية العظيمة الفارغة ذات أهمية عظمى ، لأن ضوء الشمس مثلاً يصل إلينا عبر واحد منها .
ولقد جهد الأقدمون منذ مئات السنين في درس خواص الفضاء الفارغ وذلك بتفريغهم في المعامل
بعض الأواني هريفاً تاماً . وبدأ التفريغ بظهور مفرغات الهواء الأولى التي اخترعها أوتوفون
جيريك Otto von Guericke وروبرت بويل ، ثم بدأوا يدرسون خواص الفراغ وما
زالوا يدرسونه إلى وقتنا هذا . وآخر ما وصل إليه المخترعون من مفرغات الهواء تلك المضخات
العظيمة القوية التي اخترعها جيد Gaede في ألمانيا ولانجموور Langmuir في أميركا ، وبها
أمكن تفريغ هواء أي إناء إلى جزء من بليون جزء من عدد ذراته الأصلية . وحجرت العادة
أن يحسب الضغط الواقع من الذرات على جدران الإناء ، بدلاً من إيجاد عدد الذرات ، إذ أن

المقدارين يتناسبان معاً . فالضغط في الهواء الطلق أو في أي إناء مفتوح ، كما يدل عليه البارومتر يساوي حوالي جزء من ألف من المليار^(١) ، وهذا أقل من الضغط الذي يساوي جزءاً من ألف جزء من المليار على البارومتر الزئبقي . وكان العلماء منذ مائة سنة يعدون أنفسهم سعاداء لو كانت مضخاتهم استطاعت أن تفرغ أنية إلى أن يصير الضغط داخلها مليار واحد . أما اليوم فقد أصبح من السهل التفريغ إلى جزء من ألف جزء من هذا المقدار ، ونجد هذا التفريغ في أي مضخ كهربائي هادي . والضغط في المصباح العادي (لا المصباح الذي من النوع الممتلئ الآن بالغاز) يساوي جزءاً من ألف من المليار . ونستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك إذا استعملنا في المعامل أجهزة أخرى دقيقة ، وما كان يصدق أن يصلوا إلى إحداث فراغ أخلي من الأخير عشرة آلاف مرة . ففي سنة ١٩٢٧ استطاعت الدكتورة ماري شيرمن Marie Schirrmann ، وهي من علماء الفيزياء الألمان ، أن تحصل على فراغ ضغطه يساوي جزءاً من عشرة آلاف بلون جزء من المليار . فكان هذا أقصى ما وصل إليه العلماء في التفريغ ومن الصعب جداً أن نحكم سد أنية بعد تفريغ جوفها إلى هذا القدر ، وستضي سنون قبل أن يستطيع أي مشغل بالعلوم أن يحدث مثل هذا الفراغ إذ أن الوصول إليه يستلزم أوفر قسط من الصبر والمثابرة

يبد أنه مع ذلك لا يزال يوجد مقدار كبير من المادة في أخلي فراغ حصلوا عليه . فقد تتخلف ذرة من كل مليون ذرة ، أو حتى من كل بلون ذرة ، فإذا بالتخلف الباقي بعد ذلك لا يزال كبيراً ، وكبيراً جداً . فثلاً يوجد حوالي خمسمائة بلون جزئي في بصلة المصباح الكهربائي العادي ، فإذا استخدما أقوى المضخات المفرغة المعروفة لسحب هذه الجزئيات فلا بد أن يبق منها بضعة ملايين لا يمكن استخلاصها . ولا يمكن إظهار أهمية هذه الأشياء الصغيرة بأكثر من أن نقول إن ما يذلل في المعامل الطبيعية من مال ووقت ومجهود للحصول على أمثال هذا الفراغ لدرس خواص المادة والفضاء شيء كثير مسرف فيه

وهناك نوع من الفراغ قد تستخلصه نفسك من الفصل الماضي . ذلك أن الذرة أكبر كثيراً من الالكترونات أو البروتونات مع أنها لا تحتوي على غير الالكترونات أو البروتونات . وإذن فلا بد من وجود أفضية فارغة بين هذه الجسيمات الدقيقة في داخل الذرة . وعدا هذا فالذرات نفسها ليست مزدحمة التعبئة في الغازات العادية ، وإذن فلا بد من وجود أفضية فارغة من الذرات . في القدم المكعب الواحد من البخار مثلاً يكون الحجم الكلي للجزئيات مساوياً

(١) البار وحدة الضغط المستعملة في الميودولوجيا أي علم الظواهر الجوية ، وهو يساوي الضغط الواقع من مليون دايـن dyne على السنتيمتر المربع

نصف بوصة مكعبة فقط ، ولا يوجد شيء البتة في الأفضية السكائنة بينها . وقد يعترض معترض بأن ذلك يخالف ما قلناه سابقاً بخصوص قوة الجاذبية التي تجذب أجزاء المادة كلها أو بعضها ، ولكن من يعترض هذا الاعتراض يتقاضى عن حركة الذرات . إنها في الحقيقة تتباعد عن بعضها وتتقارب ، ولولا حركتها السريعة بسبب حرارتها لشغلت حيزاً أقل من ذلك كثيراً جداً . وقد يمكن للجمهور من المسافرين الوداعين الهادئين أن يوجدوا في إحدى عربات السكة الحديدية ويشغلوا منها فضاء أقل مما يشغله مثل عدد من صبية المدارس الذين لا تهدأ لهم حركة ولا يقر لهم قرار ، بين عدو وقفز وصدم ودفع . فاذا أخذت من الحزبات حرارتها قلت حركتها وسال الغاز ، فاذا تجمدت شغلت الذرات في الحقيقة والواقع أقل حيز يمكن بسمح به شكها

فما هي التأثيرات الممكنة إحداثها في تلك الأفضية الموجودة داخل الذرة ؟ وهل يمكن أن تحدث مثل هذه التأثيرات في الأفضية الشاسعة السكائنة بين النجوم ؟ فأما عن التأثيرات الصوتية فلا يمكن أن توجد في الفراغ لأن الصوت حركة في الهواء . إنه حركة مطردة لجزيئات الهواء أضيفت إلى حركة حرارية غير مطردة . وأما التأثيرات الضوئية والحرارية فن السهل عليهما أن يمرا خلال الفضاء الفارغ لأنهما يجيثان لنا من الشمس والنجوم . ومن السهل أن ثبت أيضاً أن القوى المغناطيسية والكهربائية يمكنها أن تسير خلال الفراغ . فاذا وضع مغناطيس داخل إناء مفرغ فأن قوته الجاذبة لا تنقص شيئاً البتة . وسنرى فيما بعد أن الضوء والحرارة نفسيهما قوتان كهربائيتان . فيجس نبأ إذن أن نعرف شيئاً عن أبسط صيغة للقوى الكهربائية فكيف تنبعث قوة المغناطيس ؟ نحن ضربون بالطريقة التي يستطيع بها مغناطيس أن يجذب إليه قطعة من الحديد ، فهل نستطيع أن نبسط هذا وتوسع فيه حتى يصور الفضاء المحيط بالمغناطيس بأنه يشتمل على سبب هذه القوة الجاذبة حتى في حالة عدم وجود قطعة الحديد ؟ لقد استكشف أمير المجرين العالم العبقري ميخائيل فرداي خير طريقة لتصوير تأثير المغناطيس . فسواء كان المغناطيس محاطاً بهواء أو بخشب أو بفضاء فارغ فإن التأثير الناجم عن وجوده هو إحداث تغير في الفضاء المحيط به . إن هذا الفضاء ينفعل فيلتوي بشكل ما حتى إذا ما وجدت فيه قطعة خضعت لقوة جاذبة . وكذلك يكون تأثير الشحنة الكهربائية . فاذا نحن دلكتنا القلم الأبنوس بتمريره فوق ردن معطفا الصوفي تغير الفضاء المحيط بالقلم واتقل . وقد يكون أثر ذلك غير مدرك إذا كبرت المسافة قليلاً ، ولكنه موجود حتماً وإنما بمقدار طفيف . والفضاء الفارغ قادر على أن ينفعل انفعالا مغناطيسياً أو كهربائياً

فهل لنا أن نستنتج أنه لا بد من وجود شيء ما في الفضاء الفارغ ؟ قد يكون الجواب سلباً

وقد يكون إيجاباً ، وإنما هناك أمر لا يحصى عنه : هو قدرة الفضاء الفارغ على أن يحتوي على قوة كهروستاتيكية . وإذن فلنا أن نقول بوجود وجود وسط يحمل هذا الانفعال ، وقد يكون هذا الوسط عديم الوزن لا يلمس ، ولكننا لا نستطيع أن نرسم له صورة مادية تمثل شخصيته وهويته . على أننا لن نخرج على العلم الحديث إذا نحن لم نأت قبله شيئاً أكثر من أن نسماه « الأثير » وكان من الخطأ أن نفرض أن الأثير نوع من المادة ، فلما تقدمت البحوث الروحية وظهر العلم الروحي الحديث ، واستكشف العلماء الروحيون بشكل عملي تجريبي « العالم الأثيري » وحددوا موضعه في خريطة الكون أمكن القول بأن الأثير مادة والمادة أثير ، وسنزيد ذلك بياناً في الفصل القادم عند الكلام على نظريات بناء الذرة . وكل ما نستطيع قوله هنا هو أن الأثير مقر القوى الروحية psychic ، بل إنه يشتمل على مناطق تؤثر في نفسها عالم الروح (١) نحن الآن أكثر استعداداً لفهم أن الفضاء الفارغ قد يشتمل على قوة مغناطيسية أو كهربائية معارضة مع ما يقترن بهذه القوة من طاقة ، وإذن فلنفسر خطوات أخرى بعد ذلك . لنبحث في القوى الدائرية الثغير . فإذا جعل القلم الأنبوس المنكرب يتحرك جيئةً وذهاباً في الهواء فإن القوة عند كل نقطة مجاورة تتراوح وتأرجح تبعاً لقرب القلم منها وبمدى عنها . وهذه التراوحات تنتشر خارجياً وتتبع حركة القلم . وكل تراوح متطرد متتابع يسمى في المصطلح العلمي « موجة » . ويشمل هذا التعريف موجة الماء في البحار مع أنها تختلف عن الموجة الكهربائية . لأنه في حالة الموجة المائية يتحرك الوسط بالفعل — والوسط هنا هو الماء . وهذا الوسط لا يسير إلى الأمام ، ولكن كل جسم من الماء يتحرك إلى أعلى ثم إلى أسفل . ونحن لا نستطيع أن نقول يتحرك شيء عند انتشار موجة كهربائية ، ولكن كل ما يحدث هو أن القوة الكهربائية عند كل نقطة تقطع دوراً منتظماً من التغيرات . وسنتكلم فيما يلي عن طول الموجة وعن قوتها ، ولكننا سنعي بذلك المسافة بين نقطتين تبلغ القوة الكهربائية في كل منهما في لحظة واحدة نهايتها القصوى . فلا يوجد إذن في الأثير شيء اسمه « حركة موجية » ولو كان يوجد لكائنات تصوراتها العقلية لهذه العمليات أبسط وأسهل ، لأن تفسير ذلك تفسيراً كاملاً شيء كثير الاستعصاء على الفهم في الواقع ، وليس من حقنا أن نفرض أن بناء الطبيعة قد وضع تصميمه بحيث يستطيع العقل البشري تصويره بسهولة وبساطة

ليست الموجات الكهربائية مجرد ابتكار شائق نافع ظهر في السنين الأخيرة ، ولكنها في الحقيقة أمر هام له خطره في حياتنا العادية ، ومن ثم فهي تستحق منا الفحص الدقيق والدرس

(١) انظر كتب العلامة ج آرثر فندلاي J. Arthur Findlay في الروحية وهو رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن . وقد قلنا في المراجعة كتابه الشهير « على حافة العالم الأثيري »

العميق المتني به . والأمر الذي تجب معرفته بعد ذلك هو أن الموجة الكهربائية لا بد أن تصحبها موجة مغناطيسية . ولقد استكشف السواء الصلة بين المغناطيسية والكهربائية ، وترجع المغناطيسية كلها بالاختصار إلى الشحنات الكهربائية المتحركة ، فهي سببها وأصل وجودها فثلاً لا توجد مغناطيسية في القلم الأبنوس المشحون بالكهربائية مادام القلم في حالة سكون (إلا) بمقادير صغيرة سببها بناء الذرة) ولكنه متى بدأ يتحرك وجدت القوة المغناطيسية . ولا خلاف بين حركة الالكترونات في القلم وبين حركتها التي نسميها تياراً كهربائياً في سلك إلا في السرعة . وقد عرف التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي بعد أن استكشفه أورستد سنة ١٨٢١ فحيث وجدت قوة كهربائية متغيرة وجدت معها قوة مغناطيسية . وسواء كانت القوة الكهربائية ترجع إلى وجود الالكترونات كما في حالة التيار العادي ، أو وجدت هذه القوة في الأثير حيث لا توجد إلكترونات ، فالقوة المغناطيسية توجد ولا بد من وجودها . ومن ثم لا توجد موجة كهربائية خالصة ، أي دون أن تصحبها قوة مغناطيسية ، وعلى ذلك يتحتم علينا تسميتها « موجة كهربائية مغناطيسية » أو « موجة كهروطيسية » لأن هذه التسمية أدق وأوضح . ولا يفوتنا أن نذكر أن هاتين القوتين في كل نقطة اتجاههما معياً في كل لحظة . وهما متعامدتان معاً وعموديتان أيضاً على اتجاه الموجة نفسها

والمعروف الآن ثلاثة أنواع من الموجات الكهروطيسية ، وسنناقش فيما بعد بضعة أنواع أخرى . أما الثلاثة المعروفة فهي الموجات الضوئية ، والأشعة السينية (أشعة إكس) ، وتلك الموجات المسماة موجات لاسلكية . وكان كلارك مكسويل أول من استكشف سنة ١٨٦٤ أن الضوء المادي يتألف من قوى كهروطيسية ، ثم جاء بعده هرتز فاستكشف سنة ١٨٨٧ الموجات اللاسلكية . أما إثبات أن أشعة إكس من هذا القبيل أيضاً فقد تم في أوائل القرن الحالي . فكيف تتألف ثلاثة إشعاعات مختلفة الخواص من نفس الموجات ؟ لنبحث أولاً في نقطتين رئيسيتين من نقط الخلاف . الموجات الضوئية منظورة ، أما الأخريان فليست كذلك ، وهذا الخلاف من خصائص العين ، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هذا الفرق بين هذه الإشعاعات الثلاثة برهاناً ينقض المشابهة الأساسية بينها

ولكن هناك فرقاً عظيماً آخر بين هذه الأنواع الموجية الثلاثة ، وهو يتحصر في الطريقة التي بها تستطيع كل منها أن تنفذ خلال المادة الصلبة . فالضوء يستطيع أن يخترق بضع مواد كالزجاج ، والموجات اللاسلكية تخترق الخشب والصخور ولكنها لا تنفذ خلال الحديد أو أي فلز آخر ، وأما أشعة إكس فتستطيع أن تخترق أي نوع من المادة لمسافة بضع بوصات على الأقل ويتوقف هذا على ما يسمى بالامتصاص ، وهو فقدان الموجة لطاقتها كلها أو بعضها وتركها المادة

التي تمر خلالها . ونحن نعرف كيف أن الطاقة تتبدد من آلة بخارية مثلاً إلى حد ما عن طريق احتكاك السيور والبكرات التي تستخدم في حمل الطاقة إلى حيث يراد حملها . ونعرف أيضاً عن موجات الصوت أن المسافة التي تقطعها تتوقف على شدة الصوت ، لأن الحركة المنتظمة للجزيئات الهوائية تفقد انتظامها بالتدريج بسبب تصادم الجزيئات بعضها ببعض ، ولذا تنفد الطاقة الصوتية بالتدريج إلى طاقة حرارية . والصوت المنبعث في حجرة ينعدم فلا يسمع بعد بضع دقائق في حين تكون طاقته كلها قد استخدمت في تسخين هواء هذه الحجرة . ولكن كيف تضع طاقة القوى الكهربائية المتراوحة ؟ أجواب أنه إذا مرت القوة بالكثرونات طليقة خفيفة فلها لا بد أن تحرك هذه الالكترونات مستخدمة بعض طاقتها في العملية ، ولهذا السبب ، لا تستطيع الموجة اللاسلكية أن تخترق صفيحة فلزية ، لأن الفلز يحتوي دائماً على إلكترونات كثيرة طليقة أما القوة الكاثية في شعاع إكس فلا تتبدد ولا تضع بهذه الطريقة ، لأن ترواحات قوة الموجة في هذه الحالة سريعة جداً فلا تستطيع أن تحرك إلكترونات طليقة زمنياً طويلاً ، وبذلك تمضي في سبيلها دون أن تفقد كثيراً من طاقتها . وأما بالنسبة للموجات الثالثة ، وهي موجات الضوء العادي ، فإن الجزيئات نفسها والالكترونات المحزونة داخلها تكون أكبر طاقاً للموجة . توجد الالكترونات في كل ذرة وفي كل جزيء ، وهذه تظل في مكانها تبقى فيها فيه قوى تمنع حركتها الحرة ولكنها تسمح ببعض اهتزازات . ويصح تشبيهها بالحرز المنظوم في خيط مشدود ، إذ أن الحرز يستطيع أن يتحرك ويتذبذب من جانب لجانب وتزداد سرعته كلما كان الخيط مشدوداً . وكذلك ذرات المواد المختلفة تمسك بالكتروناتها بدرجات متفاوتة شدة وضبطاً ، ونسمح لها أن تتحرك في هزات تختلف درجاتها . وإذا حدث أن استطاعت بعض الالكترونات أن تنذبذب بمعدل مليون مرة في الثانية ، وحدث أيضاً أن مرت بها موجة تنذبذب قوتها الكهربائية بنفس المعدل ، فإن الالكترونات تترغم على الاستجابة فتهتز هي نفسها متوافقة معها . إنما إن تأثر بتغيرات قدرها ألف ذبذبة أو عشرة ملايين ذبذبة مثلاً في الثانية ، ولكنها لا بد أن تستجيب للموجة التي تضاهيها في الاهتزاز والزمن

وهذا هو السبب في أن قطعة الخشب حاجبة أي لا تنفذ الضوء . وذلك لأنه توجد إلكترونات وذرات في الخشب تستطيع أن تهتز كاهتزاز موجة الضوء . فإذا أرادت موجة ضوئية أن تمر خلال الخشب فقدت بسرعة طاقتها وأخفقت في اختراقه إلا إذا كان الخشب رقيقاً وكان الضوء قوياً جداً . وأما بالنسبة للموجات اللاسلكية أو أشعة إكس ، فالخشب ليس حاجباً ، لأن الاهتزازات في الحالة الأولى بطيئة جداً وفي الأخرى سريعة جداً ، فلا تتأثر بها الالكترونات

فالفروق الظاهرية إذن بين أنواع الموجات الكهربائية المختلفة أقل مما تبدو لأول وهلة . أما الشيء الوحيد المشترك بينها فهو سرعة سيرها في الأثير . فسرعتها ٣٠٠٠٠٠ ميل في الثانية (حوالي ٣٠٠٠٠٠ كيلو متر في الثانية) مهما كان عدد ذبذبات الموجة فإذا كانت الاهتزازات قليلة الحدوث نسبياً فينتج عن ذلك أن تكون الموجات طويلة جداً . وإذا نحن أمعنا النظر قليلاً اتضح لنا أن حدوث عدد كبير من الموجات القصيرة في الثانية يجعل سير سلسلة الموجات جميعها فكاً كما هي بضع موجات طويلة تتحرك . وهنا لا نستطيع تشبيهها بموجات الماء ، لأن سرعات هذه تتوقف على طولها الموجي ، والموجات المائية الصغيرة تبطل في سيرها كثيراً عن موجات البحار الهائجة . ولا تتغير سرعة الموجات الكهربائية في الفضاء الفارغ بناً ، فسرعة الموجات اللاسلكية التي يبلغ طول الواحدة منها ميلاً هي سرعة الموجات الضوئية التي يبلغ طول الموجة منها جزءاً من خمسين ألف جزء من البوصة . والبيئة على صحة ذلك في الوقت الحاضر بيئة غير مباشرة ، ولا توجد إلا حالة واحدة استطاعوا فيها فعلاً قياس هذه السرعة العظيمة بالضغط بطريقة مباشرة — وهي سرعة الموجات الضوئية . حقيقة توجد موجات ضوئية ذات أطوال مختلفة ، ولكن التجربة دلت على أن السرعة واحدة في كل حالة . على أن التغير في الأطوال الموجية الضوئية صغير المدى . فأطول الموجات الحمراء المنظورة تساوي في الطول جزءاً من ثمانية وعشرين مليون جزء من البوصة ، وعدد ذبذباتها في الثانية ٤٣٠ بليوناً . وأقصرها الموجات البنفسجية المنظورة وتبلغ في الطول نصف السابقة ، ولكن عدد ذبذباتها يبلغ الضعف . وحينما نخترق الموجات الملونة هذه مادة شفافة كالماء أو الزجاج تكون التراوحات كما هي في حالة الفضاء الطليق ، ولكن الموجات تكون أقصر قليلاً . وتكون سرعتها من ثم أصغر قليلاً . وذلك هو السبب في أن أشعة الضوء تنحرف قليلاً إذا هي اخترقت الماء أو الزجاج ، وهو أيضاً السبب الذي مكنتنا من استعمال العدسات والمناظير المكبرة . ومن حسن الحظ أيضاً أن هذه الموجات التي قلنا عنها إنما تختلف في اللون لا تبطل كلها بنفس القدر حينما تسير خلال الماء أو الزجاج ، وتستطيع استخدام هذه الخاصية في فصلها . ومن الغريب أن الطبيعة نفسها تستخدم ذلك أيضاً حينما تفصل ضوء الشمس إلى ألوان قوس قزح ، فهي تجعل الضوء يخترق نقط ماء المطر ، وكذلك نجحت تجربة سير إسحق نيوتن الشهيرة الخاصة بتحليل الضوء الأبيض بوساطة المنشور الزجاجي الثلاثي . وتدين معظم الأشياء الملونة من حيث لونها إلى اهتزازات جزيئاتها ، أو بعبارة أدق ، إلى اهتزازات إلكتروناتها داخل ذرات الجزيئات . وإذا قد انتهينا من بحث عملية الامتصاص يصح أن نختم هذا الفصل ببيان كيف أن هذا يحدث اللون

نصور ضوء النهار سابقاً فوق ورقة حمراء ، فالملحوم أن الضوء موجة مختلطة تشتمل على موجات من جميع الأطوال بين الحدين اللذين ذكرناهما سابقاً ، وكلها تسير معاً . فكيف تدخل في الورقة وتسير فيها مسافة قصيرة بين الإلكترونات والتويات الذرية . فيضطر كثير من الجسيمات أن يهتز تهاً لتراوحت قوى الموجات على حسب الطريقة التي ذكرناها ، فإذا كانت الورقة حمراء فإن الموجات الخضراء والزرقاء هي التي تكون قد أحدثت هذا الأثر لأنها تخلصت عن طاقتها للجسيمات المادية . والموجات الأخرى لا تثير أي استجابة في جزيئات الصبغ الأحمر فتعمل هذه الجزيئات كأنها عقبات سلبية تصد الموجات الحمراء ، ولذا ينعكس بعض الضوء الأحمر ، ويمر بعض الآخر خلال الأفضية الكائنة بين الجسيمات . وتبدو الورقة حمراء عن طريق الضوء النافذ والضوء المنعكس . أما الضوء الآخر فيضيق في الاهتزازات المادية التي يحدثها . ولما كان انتظام هذه يخلل بسرعة فإن تأثيرها النهائي ينعصر في تسخين الورقة قليلاً . وتبدو أية مادة حمراء إذا اشتعلت على جزيئات معدل اهتزازها ٤٥٠ بليون هزة في الثانية وتحتوي الأصباغ ذوات الألوان الأخرى على جزيئات لها نفس عدد الهزات المقابلة لألوانها المتنامة . وبالطبع لا يوجد شيء اسمه لون في الموجة نفسها ، وإنما المسألة كلها قوة كهربائية مغناطيسية مهتزة ، وليس اللون سوى أثر هذه الاهتزازات في أعصاب العين .



الفصل الثالث

نظريات بناء الذرة

يخيل اليّ ان الله جلت قدرته قد خلق في البداية المادة وجعلها ذات
حجوم وأشكال ونسب تتلاءم والحاجة التي خلقت هي لسدها . وخلق الجسيمات
المكونة لها جامدة لا تنثني ولا تتجزأ . وليست هنالك قوة عادية تستطيع
تجزئة ما جعله الله في بدء الخليقة جوهراً فرداً لا يتجزأ

« نيوتن »

لم يكن يجزؤ أي عالم علمي منذ خمسين سنة حتى على مجرد التفكير في أن داخل الذرة قد
يستكشف يوماً من الأيام، ولم تصل حتى اليوم إلى حل واف يفسر لنا لغز البناء الذري على الرغم
من الآراء القيمة التي سنجيء على ذكرها . وإني أترك للقارئ أن يتصور صعوبة ذلك، فالذرة
لا يمكن أن ترى أبداً لأن الموجة الضوئية آلة ضعيفة جداً لا تستطيع تناول الذرة ولا كشفها.
فهي أكبر من الذرة ألف مرة ، ولذا فهي تغطي عليها كما تغطي موجة البحر الناز على سارية
صغيرة منفردة تفترض سبيلها فلا تكتثر لها . وكذلك لا تكتثر الموجة الضوئية لذرة واحدة
وهي أقوى مجهر (ميكروسكوب) فلا يستطيع التغلب على هذه الصعوبة الخاصة بطبيعة الضوء
وطبيعة الذرة

ولذا فممن مرغمون على تصوير نموذج للذرة على أساس غير مباشر ، وما في ذلك من قصور
أو نقص البنية . ولكن مهما أطلقنا لأنفسنا عنان التخيل والتصور فلا نستطيع أن نقول إن هذا
النموذج الذي اخترناه للذرة يشبه الذرة أو أن الذرة مثله، لأنه إذا اختلف معها في شيء بسيط
فهو إذن ناقص وغير صادق على أن الطريق الذي سلكه غير واحد من العلماء العاملين في هذا
السبيل إنما هو تخيل وتصور أولاً ، ثم خبر النماذج المتخيلة ثانياً ، في ضوء البحثين النظري
والعملي . وسنتكلم فيما يلي عن ذرات كل من طمسن ورذرفورد ولانجميور وبوهر وشروودنجير
وجينز ومشرقة ، ثم نخرج على رأي العلم الروحي الحديث . وقد يؤدي بنا انجيازنا لواحد من
تلك النماذج الدقيقة إلى القول بأن لغز الذرة قد حلّ . ولكننا مع ذلك لا نجترئ على القول بأن
الذرات مبنية على هذا النمط أو ذاك—وكل ما في الأمر أن العلماء توصلوا إلى نماذج قد تبي بالغرض

وتوجد على جانبي طريق البحث هذا معالم كثيرة ، فحجوم الذرات وأوزانها مسروفة ، وكذلك الطرق التي على مقتضاها تتجمع الذرات وتترابط ، سواء كانت كلها من نوع واحد كما في العناصر أو كانت من أنواع مختلفة كما في المركبات . وكذلك عرف في كل ذرة عدد النقط التي قد تتصل فيها بذرات أخرى ، وعرفت شدة هذه الاتصالات في حالات كثيرة . ومعروف أيضاً مقدار الحركة التي تسببها كل ذرة دون أن تنفصل من أربطها لأننا نعرف درجة الحرارة التي ينصهر عندها أي عنصر أو يغلي ، أي حينما تحصل الذرات المنفصلة على حريتها . وكل أولاء يينات على التكوين الذري ، وتستطول بنا سلسلة البينات . وقد عمدنا الضوء بما يستجلي بعض الفواض ، فكل ذرة تعطي ضوءاً ذا لون خاص أو مجموعة ألوان خاصة . وذلك حينما تضطرب سواء بتسخينها في لهب أو بإطلاق الألكترونات عليها في أنبوبة تفريغ كهربائي . ولقد مررنا أن كل لون يقابل تراوحاً كهربائياً ذا تردد خاص ، فيتنبأ من ثم أنه يوجد شيء ما في كل ذرة يستجيب لهذا التراوح بأن يتحرك حركة مقابلة . وما أشبه الذرة باليانو الذي يعطينا عدداً كبيراً من النغمات المختلفة مع فارق بسيط هو أن الاهتزازات في الذرة أنغام ضوئية لاصوتية ويمكن قياس تردد كل نغمة بجهاز الاسبيكتروسكوب الحديث — أي منظار الطيف الحديث ، ولكن هل إذا عرفنا حجم اليانو ووزنه وأنغامه استطعنا أن نستنتج حقيقة ما بداخله ؟

قبل الحرب العظمى بقليل توصل العالم الفتي هـ. ج. موزلي H. G. Moseley إلى كشف عظيم وهو في منشستر ، ولكن القدر لم يمهل له ليرى ثمار استكشافه حيث قتل في غاليلوي . كان الرجل يبحث في اهتزازات الذرات لابعوجات منظورة بل بأشعة إكس ، فوجد أنها تترتب في نظام بسيط مدحش يرجع إلى الزيادة البسيطة المعارضة في عدد الألكترونات التي تهتز باختيارها في داخل كل ذرة ، وقد وجد أن أخف الذرات تحتوي على إلكترون واحد ، والتي تليها على اثنين ، والثالثة على ثلاثة ، وهكذا . فالأكسجين مثلاً هو العنصر الثامن في الترتيب من حيث الوزن الذري ، وعلى ذلك فذرته تشتمل على ثمانية إلكترونات داخلية تستطيع أن تهتز . والحديد هو السادس والعشرون ، فذرته ست وعشرون إلكترونات كذلك . وآخر الذرات وأنقلها ذرة الأورانيوم ، وتبدو كأنها التسعون في الكشف ، ولكن اهتزازاتها تدل على أنها يجب أن تكون الثانية والتسعين لأن لها نفس هذا العدد من الإلكترونات الخارجية . وسبب ذلك أنه يوجد عنصران لم يستكشفا بعد ^(١) . والكشف إلى هذا الحد كامل ينطبق

(١) يتحدث الدكتور أندريد D. Andrade أستاذ الفيزياء في جامعة لندن في كل من كتابيه « ميكانيكية الطليعة » و « الكيمياء الجديدة » عن عناصر مشعة استعدها بالطرق الصناعية ، ومنها ما ترتبه في الكشف الثالث والتسعون ثم لم يخطئ القول الأخير بظاهرة تلقى الأورانيوم . ولعلمه عاثرون يوماً على العنصرين اللذين لم يستكشفا بعد

على قاعدة موزلي كل الانطباق ، وليس ثمة أدنى شك في أنه في بعض الحالات التي تدل فيها الاهتزازات على رقم ما ، ويدل مكان الانعصر في الكشف على رقم آخر ، يكون الكشف عندئذ ناقصاً ، وقد سدت فعلاً الثغرات التي كشفتها القاعدة الجديدة بأن وضعت فيها العناصر الجديدة المستكشفة التي تنطبق عليها القاعدة بالضبط

والفضل في ذلك كله يرجع إلى سير ج. ج. طمسن وإلى من تلامه في جامعة كمبريدج وهو سير إرنست رذرفورد Sir Ernest Rutherford ، فملى أساس بحوثها بنجحت بحوث موزلي وانتهى الأمر عندئذ إلى أن الذرة لا تشتمل على غير بروتونات وإلكترونات . فذرة الايدروجين تحتوي على بروتون واحد وإلكترون واحد ، ونجني بعدها ذرة الهليوم التي لا تحتوي على اثنين من كل وإلا لما بلغ وزنها حوالي أربعة أمثال ذرة الايدروجين كما هو الواقع فلا بد إذن من وجود أربعة بروتونات في ذرة الهليوم حتى يكون وزنها صحيحاً ، وإذن لا بد من وجود أربعة إلكترونات ^(١) حتى يكون المجموع الكلي للشحنة الكهربائية الموجودة في كل ذرة يساوي صفراً . وهذه الإلكترونات الأربعة لا يمكنها كلها أن تهتز لأن اثنين منها مقيدان باحكام مع البروتونات في جزء داخلي من الذرة يسمى النواة . ربما بدت صورة الذرة هذه مقعدة لأول وهلة ولكن أمرها بسيط في الحقيقة ، فالمنصر الثاني تتألف نواته من أربعة بروتونات وإلكترونات ، أما الإلكترونات الأخرى فيهتران في الأجزاء الخارجية من الذرة والمنصر الثالث في الترتيب ستة بروتونات وثلاثة إلكترونات في النواة ، أما الثلاثة الأخرى في الأجزاء الخارجية وهكذا . وفي حالة العناصر الأثقل توجد بعض تعديلات لطيفة لهذه القاعدة ، وإلما يكون أكثر من نصف الإلكترونات في الجملة مبعاً في النواة مع البروتونات . فذرة الحديد مثلاً يوجد فيها ست وخمسون بروتوناً وثلاثون إلكترونات في النواة وست وعشرون إلكترونات تسبح في الأجزاء الخارجية . وفي ذرة الرصاص يوجد ٨٠ من البروتونات و١٢٦ إلكترونات في النواة واثنان وثمانون إلكترونات خارجها

فالذرة إذن تتألف من كهربائية وفضاء خال ، وهذا الخلاء أكبر كثيراً من الكهربائية ولو أننا كبرنا ذرة بليون مرة لبلغ عرض نواتها نصف بوصة ، وبلغت إلكتروناتها عشر هذا المقدار . وعلى الرغم من أن هذا الرأي يبدو كأن به تناقضاً لأن النواة قد تحتوي على عدد كبير من كل من الإلكترونات والبروتونات فأننا نقبله لحوازه لأن التجارب لا تؤيد أي تفسير آخر حتى الآن . وقد يكون قطر الذرة المسكرة مائة ياردة ومع ذلك فلا تشغل الإلكترونات

(١) وزن الإلكترونات ضئيل جداً بحيث يمكن إهماله عند حساب عدد البروتونات اللازمة لتكوين الوزن الذري

والبروتونات التي بداخلها إلا جزءاً صغيراً من حجمها ما دمتا محتفظتان بنفس مقياس الرسم . فلماذا إذن لا يمكن أن تضغط الذرة إلى حجم أصغر ما دامت تشتمل على ثلاثة ؟ ولكن لماذا السؤال جواباً بسيطاً هو : لأنه يوجد في الطبيعة مثل مشابه لذلك . ونحن كلنا نعرفه . فالشمس وسياراتها مبعثرة في فضاء أكبر كثيراً من حجمها على الرغم من أنها دائمة التجاذب . وسبب ذلك حركتها . فالقمر مثلاً قد انطلق من الأرض في يوم ما بسرعة هائلة ، وعلى الرغم من أن قوة الجاذبية تمنعه من الاقالات إلا أنها غير كافية لارجاعه إليها . وكذلك لا يمكن أن تعود السيارات إلى الشمس بسبب سرعاتها العظيمة التي تسير هي بها في أفلاكها حول الشمس . والنظرية العلمية الخاصة بالذرة مبنية على نفس الفكرة ، إذ المفروض أن الالكترونات تدور حول النواة بسرعات كبيرة جداً بحيث لا يمكن لقوة آدمية ان تضغطها في النواة . إنها جميعها ليست داخل قرص منبسط كما هو الحال في السيارات والشمس ، ولكنها تدور في جميع الاتجاهات ، وبذلك تشغل جزءاً كبيراً أو شيئاً مثله . وهي غير قابلة للضغط بتاتاً لأنه في حالة البلورات التي تبدو كأنها تامة الاندماج يكون تأثير الضغط العظيم جداً منحصراً في تغيير الحجم تغييراً طفيفاً جداً . وهناك نوع واحد من الذرات تستطيع أن تحسب سرعة إلكتروناتها حساباً موثقاً منه ، وتلك هي ذرات الايدروجين التي تشتمل الواحدة منها على بروتون واحد وإلكترون واحد ، فهذا الإلكترون يندفع كالكوكب السيارة حول شمس ، فيدور حول البروتون ٦٦٠٠ بليون مرة في الثانية ، سائراً بسرعة ١٣٠٠ ميل في الثانية . وعند ما يحول بالخطر ذلك الأمر الغريب ، وهو كيف أن ذرة خالية خاوية تستطيع أن تكون جامدة ككرة الرخام ، فلندكر أحجية الحصة والجامع الكبير . وهي إنه إذا استقرت حصة في مثل جامع الرفاعي الواسع الأرجاء فلن يشعر بوجودها أحد ، ولكنها إذا خضت بسرعة عظيمة تكاد تكون لانهاية ، ثم طارت بهذه السرعة بحيث تكاد تكون في كل مكان داخل الجامع في آن واحد فانه يكون من المستحيل أن يفتح باب ذلك الجامع بسبب توالي ضغوط صدماتها عليه ! إن وزن الذرة هو وزن بروتوناتها ، لأن الالكترونات في الواقع أخف كثيراً جداً من البروتونات . ولما كانت البروتونات مبعأة في فضاء مركزي صغير فإن مركز الذرة يكون أكثر كثافة كثيراً من أي أنواع المادة التي نعرفها . ولو صحت التفدرجات المقول بها عن حجم البروتون لأمكن وضع دنيانا هذه في قطر صغير . وأما السبب في أن قطرها ثمانية آلاف ميل فيرجع إلى أن مدارات الالكترونات تشغل حيزها هذا . ولو أنها سخضت إلى درجة شديدة لسكان تصادم الجزيمات شديداً بطرد الالكترونات من أفلاكها فنصير الذرات أصغر . ويحدث مثل ذلك في بعض النجوم . وكان العلامة إدنجتون Eddington السكبرديجي أول من أشار

إلى أن الحرارة كانت مرتفعة جداً في زميل نجم الشعري البتائية فقدت جميع الذرات إلكتروناتها، ثم تجمعت النويات الثقيلة لزاواً فصارت مادة النجم أكثر من الماء خمسين ألف مرة، أي أن السنتيمتر المكعب منها وزن خمسين كيلوجراماً، أو أن البوصة المكعبة منها وزن طنناً تقريباً. ولقد حسبوا بعد هذه النبوءة وزن هذا النجم وحجمه فمحقق هذا التقدير، وبذلك أضيف إلى سلسلة البيانات حلقة اتصال أخرى تعتمد عليها في رسم صورة لبناء الذرة. وشم اعتراض آخر قد ينهض ضد هذه النظرية وهو: إذا فرضنا أنه لا يوجد للبروتون أجزاء فإن كل ذرة يجب أن وزن قدر البروتون الواحد، أو قدر ذرة الأيدروجين الواحدة عدة مرات صحيحة كاملة لأنها تشتمل دائماً على عدد صحيح من البروتونات. وقد قاس الكيميائيون منذ قرن أوزان الذرات بالنسبة لوزن ذرة الأيدروجين، فوجدوا في كثير من العناصر أن النسبة عدد صحيح، مثال ذلك وزن ذرة الكربون قدر وزن ذرة الأيدروجين اثنتي عشرة مرة، وذرة الفضة ١٠٨ من المرات تقريباً، ولكن توجد عدا ذلك شواذ كالكلور الذي وزن ذرته قدر وزن الأيدروجين $35\frac{1}{2}$ من المرات. فمن المستحيل أن تصور ذرة الكلور بأنها تشتمل على $35\frac{1}{2}$ من البروتونات. وكان ذلك عقبة عسيرة اعترضت نظرية البروتون، وظلت هذه العقبة قائمة سنين طويلة، ولكن الدكتور أستون Dr. Aston الأستاذ في جامعة برمنجهام وكمبريدج وجد طريقاً للخروج من هذا المأزق، وذلك بابتكاره طريقة جديدة لوزن الذرات. فبدلاً من استخدام الانحادات الكيميائية للعناصر، والقول بأن $35\frac{1}{2}$ من جرارات الكلور تتحد دائماً مع جرام واحد من الأيدروجين، نراه طبق الطريقة عنها التي اتبها ج. ج. طمس في وزن الإلكترونات. وذلك أنه أوجد سيلاً سريعاً من الذرات بعد أن سلب كلاً منها إلكتروناتاً فصارت كلها مشحونة بالكهربائية الموجبة، ثم جعل السيل ينحرف داخل أنبوبة مفرغة بأن سُلط عليه مغناطيساً أو قوة كهربائية. ومن مقادير الانحرافات استطاع أن يحسب أوزان الذرات. ومع أن قياس الانحراف بالضبط عمل من الصعوبة يمكن إذ يستلزم الأمر أخذ صورة فوتوغرافية فوق لوح شديد الحساسية فإن مهارة الرجل وأداته كانتا خير معاون على نجاحه. وقد أدى به البحث إلى استكشاف نوعين من ذرات الكلور بدلاً من نوع واحد كما كان يظن، وزن أحدهما قدر وزن ذرة الأيدروجين ٣٥ مرة ووزن الآخر قدر وزنها ٣٧ مرة، وأنه يوجد ثلاث ذرات من النوع الخفيف مقابل كل ذرة من النوع الثقيل، وبذلك يكون متوسط الوزن الذري للكلور الموجود في العالم هو $35\frac{1}{2}$. أما لماذا يمتزج النوعان بهذه النسبة فلا يزال لغزاً في الوقت الحاضر. ولقد بذلت جهود استمرت سنين في سبيل إيجاد كلور تكون فيه النسب مخالفة لذلك ولكن دون أدنى نجاح. وبسبل

علينا فهم السبب الذي من أجله لم يمكن تمييز النوعين فيما مضى ، وذلك متى علمنا أن الخواص الهامة للذرة تتوقف على الإلكترونات الكاثنة خارج النواة وليست على البروتونات . وسنذكر فيما سيجيء بعضه أخرى تدعم هذا الزعم . على أنه إذا قبل فلا بد من افتراض أنه في إحدى ذرتي الكلور يوجد ٣٥ بروتوناً مع ١٨ إلكترونات في النواة و ١٧ إلكترونات خارجاً عنها . وفي الذرة الأخرى يوجد ٣٧ بروتوناً مع ٢٠ إلكترونات في النواة و ١٧ إلكترونات خارجاً عنها . ولكل من هاتين الذرتين وزن بخلاف وزن الأخرى ، أما الخواص الكيميائية فواحدة . وقد ثبت لأسباب أخرى كثيرة أن هذا الوضع هو الوضع الحقيقي . أما كشف العناصر التي قام الدكتور أستون بوزنها فكثير ، وفي كل حالة يكون وزن الذرة فيها عدداً كسرياً كما وجدته الكيميائيون أثبتت صور أستون الفوتوغرافية أنها مزيج من نوعين أو أكثر من الذرات ، وأن وزن كل منها عدد صحيح في ذاته . وهذه السكور إنما تنشأ لأن الذرات تخرج بنسب معينة . وقد أدى هذا الاستكشاف إلى وضع اسم جديد لهذه الذرات المتشابهة ، واختير لهذا الاسم لفظ «النظير» فللكلور نظيران وكلاهما موجود في غاز الكلور الأخضر العادي ، وكلاهما موجود في مركباته كملح الطعام : ويوجدان دائماً بنسبة ثلاث ذرات من النوع الخفيف إلى ذرة من النوع الثقيل . وتوجد ثلاثة نظائر للسكك وأربعة للخارصين وستة للزئبق واثنا عشر للفضة . وقد أمكن فصل بعض نظائر الزئبق ، ولكن الخاليط الأخرى جميعها قد قاومت كل الجهود التي بذلها الكيميائيون لتغيير نسب وجودها في الطبيعة . ومن بين الذرات الثقيلة جداً ، وهي الذرات المشعة أو الفعالة كيميائياً ، توجد حالات كثيرة للنظائر كانت هي التي استكشفت أولاً فأنارت مسائل أخرى سنجىء على ذكرها في الفصول القادمة . والنتيجة المباشرة لكل ذلك هي أنه صار في الامكان الآن صنع نماذج للذرة صحيحة الوزن

بعد ذلك فلننكر في مدى ما تذهب إليه هذه النماذج في إظهار المشابهات الكاثنة بين أنواع الذرات المختلفة . توجد مشابهات هائلة واضحة جداً بين كثير من العناصر المختلفة . فمثلاً غازات الفلور والكلور والبروم متشابهة جداً في خواصها وخصوصاً في طرق اتحادها بالعناصر الأخرى وكذلك الصوديوم والبوتاسيوم مقشبان جداً في الخواص . والزرنيخ والأنتيمون والبرموت مثل آخر . وربما كان خير مثال هو عائلة الغازات النادرة وهي الهليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والثنتون . فغير ممكن بأي حال أن يتحد أي واحد منها بأي عنصر آخر ولا بد أن ترتب الإلكترونات والبروتونات في الغازات يكشف الستار عن مدى هذه العلاقات إذ يتحتم علينا أن نبني نماذجنا بلبنات تؤلف فيما بينها طائفة متميزة كل التميز . على أن الأمر أصبح مستحيلاً تقريباً لسبب واحد هو أن الإلكترونات تسبح طيلة الوقت فلا يمكن أن تلام

النماذج الحقائق وعلى هذا الأساس بنى لانجموير Langmuir نموذج الذري ، فكان على الرغم من خطائه الأساسي متفقاً وبعض وجوه الحقيقة على الأقل . والبك فيما يلي رأي لانجموير باحتصار جوهر هذا النموذج هو أن الإلكترونات الخارجية تتجمع نفسها في حلقات أو طباق تكون النواة في مركزها . فأما الإلكترونات الأولان فيكونان قريبين دائماً من النواة ، ثم بعد ذلك تأتي طبقة مكونة من ثمانية ، تليها طبقة أخرى مثلها ، وتجيء أخيراً طبقتان أو أكثر من نوع أكبر . والطباق الداخلية تكتنل أولاً ، فإذا لم يبق من الإلكترونات ما يكفي للملء الطباق الخارجية فإن هذه تبقى ناقصة . فمثلاً يوجد للصوديوم أحد عشر إلكترونات خارجياً تجمعها ثلاث طباق : الأولى صغيرة ذات إلكترونين ، والثانية كبيرة بها ثمانية ، والثالثة وهي الخارجية القصوى تحتوي على إلكترون واحد . وللبوتاسيوم ١٩ إلكترونات خارجية مرتبة كالآتي : اثنان من الداخل نيهما إلى الخارج طبقتان بكل منهما ثمانية ، ثم إلكترون واحد في الطبقة الخارجية . أما الذرات الثقيلة فأكثر تعقيداً ، ولكنها مبنية على أساس مشابه لذلك . فمثلاً غاز النيتون الذي يقبض من الراديوم يحتوي على ٨٦ إلكترونات خارجياً مرتبة كالآتي : اثنان أولاً ثم طبقتان بكل منهما ثمانية ، وأخريان بكل منهما ثمانية عشر ، ثم طبقة ذات اثنين وثلاثين . وكلما مضينا في جدول العناصر وجدنا أن الطبقة الخارجية تزايد بهذه الطريقة المنتظمة ، وفي نفس الوقت نجد مركز الذرة — وهو النواة — يتزايد ثقله . وهذه النواة تزايد عادة ببروتونين اثنين وإلكترون واحد لكل إلكترون يضاف إلى الطبقات الخارجية . وقد فصل يوماً إلى اعتبار أن هذا المركز الصغير المعبأ قد يكون مبنياً هو أيضاً على نمط خاص ، أما في الوقت الحاضر فلا نعلم شيئاً البتة عن تفصيلاته . ويمكن تطبيق نظام الطباق الخارجية هذا على جميع ذرات العناصر التسعين المعروفة . ونجد في آخر الكتاب جدولاً يتضمن جميع البيانات في هذا الصدد . وقد ترك فيه بياض في مواضع العناصر التي لم تستكشف بعد . وهذا الجدول موضوع في أبسط صيغة ممكنة ، ويمكن تعديله بحمل الطبقات طوائف طوائف . وربما كان من الأفضل وضع الطبقات ذات الثمانية عشر على صورة ثلاث مجموعات كل منها ذات ستة . غير أن هذه تفصيلات لا تزال غير مؤكدة

وجمال هذا النموذج واضح في الطريقة التي تظهر بها أوجه الشبه بين ذرات العائلة الواحدة . ولقد ذكرنا عائلة الفلور والكور والبروم ، وبصح هنا أن نقول إن في ذراتها مكاناً خالياً لإلكترون واحد في الطبقة الخارجية . فلفلور طبقتان إحداها ذات اثنين والثانية ذات سبعة ، وللكور ثلاث طبقات إحداها ذات اثنين والثانية ذات ثمانية والثالثة ذات سبعة ، والبروم أربع طبقات إحداها ذات اثنين والثانية ذات ثمانية والثالثة ذات ثمانية عشر والرابعة ذات سبعة . والصوديوم

والبوتاسيوم متشابهان كذلك من حيث احتوائهما على إلكترون واحد في الطبقة الخارجية . وكذلك لكل من الزرنيخ والأتيمون والبرموت ثلاث أمكنة خالية في طبقاتها الخارجية . والغازات النادرة التي تولف فيما بينها أكل وأتم هائلة متشابهة في هذا أيضاً ، إذ أن طبقاتها الخارجية جميعها كاملة . وتلقى هذه الحالة الأخيرة بصيصاً من النور بين لنا وجهة نظر أخرى قيمة لهذا النموذج ، وذلك أن الغازات النادرة تأتي أن تتحد مع أي عنصر آخر . ألا يصح أن ننسب ذلك إلى أن طبقاتها الخارجية القصوى تامة لا ينفصها شيء ؟ ثم هو أيضاً يدل على أن الطبقة التامة أقوى وأثبت من الطبقة الناقصة ، وعلى أن اتحاد ذرتين أو عدمه إنما يتوقف على ما إذا كانت طبقاتها الخارجيةان يمكنهما أن يكلا بالانحداء أم لا ، ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً ذرة الايدروجين ، فهل ينبغي أن تتحد بذرة أكسجين ؟ لذرة الايدروجين إلكترون واحد ولذرة الاكسجين ستة إلكترونات خارجية ، وإذن فلأثنين معاً سبع إلكترونات خارجية لا تكون طبقة تامة ذات ثمانية إلكترونات ، وإذن فلن يكن هناك اتحاد قوي إذا كانت القاعدة صحيحة وإذن فلا بد من ذرة إيدروجين أخرى لكي تكمل الطبقة وتوجد جزيئات ثابتة — وهذا صحيح لأن المعروف أن جزيء الماء يحتوي على ذرة أكسجين واحدة وذرتي إيدروجين وكثير من الأشياء المعروفة تتحد عناصرها بنسب تنطبق على هذه القاعدة . ففي الجليد مثلاً توجد ذرة أكسجين مقابل ذرة كلسيوم ، وذلك لأن لهذا الإلكترونين خارجيين وللاكسجين ستة فباتحادها تكمل الحلقة ذات الثمانية إلكترونات . والمالح العادي يتألف من عدد واحد من كل من ذرات الكلور والصوديوم ، وذلك لأن الأول يقدم للحلقة الأخيرة سبع إلكترونات ويقدم الثاني لها إلكترونات واحداً . والبوتاسا فيها ذرة من كل من الاكسجين والايدروجين والبوتاسيوم ، لأن كلا من هذين الأخيرين في هذا الثالوث يضيف إلكترونات إلى إلكترونات الاكسجين الستة . والنشادر يتألف من ثلاث ذرات من الايدروجين لكل ذرة من النيتروجين ، وذلك لأن لذرة هذا الأخير خمس إلكترونات خارجية ، وهذه تحتاج إلى ثلاثة أخرى لكي تكملها وتصبح ثابتة

تلك أمثلة بسيطة تبين صحة قانون بسيط جداً ومدهش جداً يخضع له الكون كله في البناء والتكوين . وأحياناً تكون جزيئات المواد كبيرة معقدة فلا يمكن تقصي ذلك القانون فيها . وكثيراً ما توجد جزيئات تكون الحلقة الخارجية فيها ناقصة ومع ذلك تثبت على حالها فلا تتحلل . مثال ذلك : غاز أول أكسيد الكربون فيه أربعة إلكترونات في ذرة الكربون وستة في ذرة الاكسجين ، ويحتاج جزيئه لذرة أكسجين أخرى لكي تم بذلك حلقتان ، ومع ذلك فهو باقٍ دون انحلال . وهو يكون أقل تسميةً لو أن ذيله الالكتروني يتم ، إذ أنه في هذه الحالة يكون

أقل إنفالا على الاتحاد بالمواد الأخرى الموجودة في منسوجات الجسم فلا يسمها لا بد أن يكون في هذا الشرح الدقيق للذرات والجزيئات قسط كبير من الصدق ، لأنه ينطبق على كثير من الحقائق ، وكان من وجهة علم الكيمياء رأياً جديداً عظيم الخطر . ولكن هذا التفسير لا يمكن أن يكون سليماً إلى النهاية ، لأنه إذا كانت الالكترونات ساكنة في داخل الذرة فاتها لا بد منجذبة نحو مركزها على الفور . وظاهر أنه لا توجد طريقة لمنع هذا التجاذب الحادث بين السكهربائيتين السالبة والموجبة إلا أن تكون إحداها دائرة بسرعة حول الأخرى . وظاهر أيضاً أن الالكترونات هو الذي يدور حول البروتون لأن هذا ثقيل الوزن نسبياً فلا يمكن للالكترونات الخفيف الوزن أن يحتفظ به دائراً حوله في فلك ما . وعلى ذلك يتعجم علينا أن نقول بأن الالكترونات الموجودة في طباق من ثمانية أو أكثر تدور حول المركز الذري . ويفقد النموذج على الفور بساطته لدى العالم وغير العالم ، لأن الجهود المبذولة في سبيل تقدير ثبوته أدت إلى مصادلات رياضية لم يصلوا بعد إلى حلها . غير أنه قد وصل العلم في حالات بسيطة قليلة إلى نتائج لم تكن متوقعة أبداً وسندكرها فيما يلي :

توصل العالم الدانمركي الفزي نيلز بوهر Nils Bohr ، أستاذ الفيزياء في جامعة كوبنهاجن إلى استكشاف نموذج للذرة بين اهتزازاتها ، أو بمسألة أدق الاهتزازات التي تحدثها الذرة في الفضاء المحيط بها . ولقد أشرنا فيما مضى إلى الاسبيكتروسكوب وإلى أقيسته البالغة غاية الدقة والتي كانت في مبدأ الأمر وفقاً على موجات الضوء المنظورة التي تبعث بها الذرة حين تثار الأنارة الملائمة . ولكنهم في السنين الأخيرة عمموا استعماله فشمّل قياس موجات أخرى أكثر تردداً من الموجات الضوئية المنظورة . فمثلاً يتألف طيف ذرة الحديد من عشرة آلاف موجة كلها ذات أطوال مختلفة ، وبعضها من الموجات دون الحمراء غير المنظورة ، وبعضها موجات ضوئية منظورة وبعضها موجات فوق بنفسجية ، وبعضها أشعة إكس

وقد قيست الأطوال الموجية بدقة عظيمة ، وقيس كثير منها إلى أقرب جزء من مليون . وصيغت من الأقيسة جداول تحتوي على أرقام طويلة وصادقة شكل عنصر من العناصر . ففي هذه الأرقام لا بد أن يوجد البيان الوافي المفسر للفرز بناء الذرة . وقضى العلماء سنين وهم يبحثون في هذه الأرقام الاسبيكتروسكوبية فلم يهتدوا لأكثر من معرفة بضع صلات وعلاقات تربطها ببعضها بعض . فلما تولوا بوهر توصّل إلى استكشافه ، ونضجت من ثم المعلومات . وحجى من تبعه من البحوث الذين اقتفوا أثره في التفكير والدرس ثماراً لم تكن منتظرة

وإليك رأي بوهر باختصار : الفروض في الالكترونات الذي بداخل الذرة أنه يسير في

فلنك حول النواة . فإذا أثبتت الذرة وشحنات بطاقة ما من مصدر خارجي فإن الإلكترون يعتمد خارجياً إلى فلك أبعد . وهناك يستمر في حركته حول النواة في مدار أوسع وإنما بسرعة أبسطاً . فإذا ما زال ذلك المؤثر الخارجي عاد إلى فلكه الأول ، لا بالتدريج بل بقفزة فجائية ، فكأنما هو لولب انكش بعد شد . فعندما يرتد يسترد الطاقة المستمارة ، وتسري على صيغة كهربائية في الأفضية المحيطة ، ثم تنطلق على شكل موجة ضوئية . أما طول هذه الموجة فيتوقف على مدى هذه القفزة الفجائية . فإذا كانت القفزة طويلة تستلزم طاقة كبيرة كانت الموجة قصيرة — كأن تكون ضوءاً بنفسجياً في حالة ذرة الايدروجين . وإذا كانت القفزة صغيرة انبعثت موجات الضوء الأحمر الطويلة . ولا يمكن للذرة أن تشع ضوءاً من كل لون ، وإنما تستطيع أن تبعث سلسلة من الألوان المنفصلة الواضحة ، وذلك لأن إلكتروناتها لا يستطيع أن يتحرك حول النواة على أي بعد يريده ، بل لا بد أن يتحرك في واحد من مجموعة أفلاك معينة . وأقرب مثل توضيحي لذلك أن تصور أن أرضاً قد استطاعت أن تعتمد عن الشمس ، وأنها قد استقرت في فلك المريخ أو المشتري أو أي سيار آخر . فهي إذا ما أطلق سراحها عادت فجأة إلى فلكها القديم . تلك هي صورة ما يعملها الإلكترون داخل الذرة التي تحدث ضوءاً

هذا الرأي الجديد قد طبق على أبسط ذرة ، أي الذرة التي يوجد فيها إلكترون واحد فقط يتنقل في هذه الأفلاك المنفصلة . فلما عمل الحساب الدقيق وجد أنه ينطبق تماماً على أقيسة الاسبيكتروسكوب . وصححت سلسلة «الألغام الضوئية» كلها . فال موجة الحمراء تنذب ٤٥٧ بليون مرة في الثانية ، وتليها الموجة الزرقاء وعدد ذبذباتها ٦٦٧ بليون في الثانية ، وهكذا حتى نصل إلى المنطقة غير المنظورة وإلى تردد فيها قدره ٨٢٣ بليون مرة في الثانية . وهذا أحرز ذرة بوهر نجاحاً عظيماً لا يقدره قدره إلا أخباراء من علماء الفيزياء . والحق إن من السهل أن نضع نظرية فنبدو كأنها أحسن وأصح تفسير للحقائق التجريبية ، ولكن من الصعب جداً أن نجد نظرية تصمد للاختبارات الحسابية الدقيقة الفاسية ثم تمر منها بنجاح . على أن اختبار الأقيسة الدقيقة قد كان له أثره خلال القرون الثلاثة الماضية إذ كان خير وسيلة لتبين الخطأ من الصواب وقد صرنا الآن نلصق بكل رأي جديد تنطبق اختباراته التجريبية وأقيستها على نتائج الحساب النظري الدقيق

أما في الذرات الأعقد من ذلك فيوجد كثير من الإلكترونات السائرة في أفلاك دائرية أو أهليلجية ، ولكنها تتداخل في حركاتها بعضها مع بعض . فصار من الصعب جداً بسبب هذا التداخل أن نحسب تماماً ترددات الموجات التي تنبعث من هذه الذرات . غير أن العلماء بصالون شيئاً فشيئاً إلى الحلول المطلوبة ، حتى امتلأت جعبتهم واكتظت . وإن توالي تهديم الحقائق

ليدل على أن سيكون لقنصهم هذا شأن عظيم في تاريخ العلوم وبعد أن ترى العلماء قد وقفوا عند هذا الحد مقتنعين بأن الإلكترون هو نهاية ما يمكن أن يصلوا إليه؟ كلاً فلا يمكن أن يوقف تكوين هذه الدنيا الجديدة عند هذا الحد، ولن يكون الإلكترون آخر كلمات علم الفيزياء الحديثة في هذا الصدد. وهنا نحن نرى العلامة سير. ج. طمس الذي إلى عبقريته يرجع الفضل فيها وصل إليه القرن العشرون من تصوير بناء الذرة — نراه يكتب ويحاضر في موضوع «ما وراء الإلكترون». وقد وصل إلى أن الإلكترون بدوره مكون من أجزاء أخرى أصغر منه، وكان ذلك سنة ١٩٣٩. والحق إن طبيعة الإلكترون قد صارت الآن ميدان بحث هام في الفيزياء الحديثة، وأن تجزئته إلى موجات هي أهم ما يتطلع إليه العالمون اليوم، فتكون المادة إذن نوعاً من اهتزاز أثيري أو دورة أثيرية في الفضاء، وهو رأي الروحانيين كما سيجيء.

ويذهب شرودنجر Schrodinger إلى أن الكون لا يتألف من الإلكترونات بل من موجات، وأن الذرة لا بد أن تعتبر مجموعة موجات كهربائية، وما الإلكترونات إلا طريقة غير دقيقة لوصف بعض خواص هذه الموجات. على أننا سنسلم جدلاً بصحة هذا التصور إلى أن يصل البحث العلمي إلى وصف آخر للذرة أحسن من هذا تبدو فيه الخواص الموجية والدقيقة للذرات كأنها أوجه خاصة فيزيقية أخرى أعمق غوراً، وسنبسط هذا التصور الموجي في الفصل الرابع عشر عند الكلام على الميكانيكا الجديدة وهي الميكانيكا الموجية.

بقيت وجهة نظر واحدة هي الخاصة بالأشعاع. فالإشعاع قد تستجيب إشعاعاً، وقد يستجيب الإشعاع مادة ولو من الوجهة النظرية على الأقل. وليس معنى هذا بالطبع أن المادة والأشعاع شيء واحد، ولكنهما كما يقول العلامة جينز Jeans نوعان من الموجات: نوع ينتشر على شكل دوار، وآخر يسير في خطوط مستقيمة. وهذه الموجات الأخيرة تفسر بمرعة الضوء، أما تلك المكوّنة للمادة فأنها بطبيعة السير

ومنذ أكثر من عشرين سنة لفت جينز الأنظار إلى مستودع الطاقة الهائل الذي يمكن الحصول عليه من إعادة المادة. فحينما تصادم البروتونات الموجية الكهربائية مع الإلكترونات السالبة الكهربائية ممحو بعضها بعضاً، وبذلك تطلق طاقتها الذاتية الداخلية على صورة إشعاع. وعلى هذا لا يكون للطاقة ولا المادة وجود دائم، بل الذي يوجد هو مجموعهما إن صح التعبير. فكل من المادة والطاقة تستطيع من الوجهة النظرية على الأقل أن تستجيب الأخرى. وحينما قدم جينز هذا الرأي كان بظن أنه وصل إلى رأي جديد انقلابي لم يحج به أحد قط. ولكنه هو نفسه وجد أن نيوتن كان قد سبقه منذ قرنين ما يشبه ذلك كثيراً. ففي كتاب

نيوتن المسمى « البصريات » الذي كتبه سنة ١٧٠٤ نجد : —

« سؤال ٣٠ — ألا يمكن للأجسام والضوء أن يستحيل كل منهما الآخر ؟ وهل لا يتكسب الأجسام كثيراً من فاعليتها من جسيمات الضوء التي تدخل في تركيبها ؟

« إن استحالة الأجسام ضوءاً واستحالة الضوء أجساماً يباقي جداً أسلوب الطبيعة التي تبدو كأنها تمر بالتحويلات . فالماء الذي هو ملح (كذا) مانع لاطم له يتغير بالحرارة فيصير بخاراً أي نوعاً من الهواء ، وبالبرودة فيصير ملحاً أي حبيراً صلباً شفافاً لامعاً قابلاً للانصهار ، وهذا الحجر يستحيل بالتسخين ماء ، ويستحيل البخار ماء بالتبريد . والبيض يمتزج من مراتب عديدة اللحم ثم يستحيل حيوانات تحس وتشعر والدعائم تستحيل ضفادع ، والديدان تستحيل ذباباً ، وجسيم الطيور والدواب والأسماك والحشرات والأشجار والنباتات الأخرى بأجزائها العديدة تخرج من الماء ومن المحلولات المائية والأملاح . وبالتفن تستحيل ثمانية مواد مائة . والماء الراكد في الهواء الطلق يأسن بعد بضعة أيام ، ويمطينا صبغة (كذا) أو محلولاً ، فإذا ظلّ أمداً آخر أعطانا راسباً وروحاً (كذا) . ولكن الماء قبل النفث ينفس النبات والحيوان فبين أمثال هذه التحويلات المتعددة الغريبة لماذا لا تحيل الطبيعة الأجسام ضوءاً والضوء أجساماً ؟ »

ويميل جينز إلى تعزيز الرأي القائل باستحالة المادة ضوءاً ، لأن اجتماع التواء الموجية التكهرب بالالكترونات سالبة التكهرب يعدنا بنظام آلي ظاهر به تتحول المادة إلى طاقة . وينتهي جينز إلى أن الكون يذوب على شكل إشعاع ، مستنداً في ذلك على مشاهدات وأرصاء فلكية ليس هذا مكانها . ثم هو من جهة أخرى يستمد حدوث الضد ، ويقول إن استحالة الضوء يوماً ما مادة بعيدة الاحتمال جداً وإن تكن من الوجهة النظرية البحتة ممكنة .

فالتبعية التي يستخلصها جينز هي أن الكون المادي كله يتألف من موجات ولا شيء غير الموجات » وهذه الموجات نوتان : معبأة وهي تلك المادة التي نسميها مادة ، وأخرى غير معبأة وهي تلك التي نسميها إشعاعاً أو ضوءاً . وما إبادة المادة — إن تمت هذه الإبادة — إلا عملية فك إسار هذه الطاقة الموجية المختزنة فتنتقل في الفضاء . ويعود هذا الرأي بالكون كله إلى أنه عالم من الضوء . وتكون قصة خلق هذا العالم محصورة في أن الله تبارك وتعالى قال ليكن نور فكان نور »

وللدكتور مشرفة بك أستاذ الرياضة التطبيقية في الجامعة المصرية وعميد كلية العلوم فيها رأي كان قد عرضه في النشرة المسماة « محاضر إجراءات الجمعية المسكية » الصادرة في ديسمبر سنة ١٩٢٩ تحت عنوان « الميكانيكا الموجية والوجهة المزدوجة للمادة والأشعاع » وقد أشار جينز إلى هذا الرأي في كتابه « الكون الخفي » وأشار إليه العلامة لودج في كتابه « فيما وراء الفيزياء »

وهذا الرأي في الحقيقة تعديل لرأي نيوتن وحينئذ بخصوصي المادة والأشعاع ، وهو مبني على أساس أن جميع الظواهر التي تمر بنا بسرعة الضوء اعتدنا أن نسميها إشعاعاً ، في حين أن الأحداث المجسمة التي تسير ببطء شديد أو التي لا تسير بتأثراً قد اعتدنا أن نسميها مادة . وهنا يتساءل الدكتور مشرفة كيف تبدو الأشياء لراصد يسير بسرعة الضوء ، ويحجب عن ذلك بأن الإشعاع الذي يصحب هذا الراصد ويسير معه جنباً إلى جنب يبدو كأنه مادة ، أما الأشياء المادية التي تمر به عندئذ بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً . والفكرة في حد ذاتها بارعة جداً ، وعلى الرغم من أنها ظنية فهي وليدة بحث رياضي صحيح قيم

وأما عن العلم الروحي الحديث وما يقوله في المادة فتسكن في باثبات ما ذكره العلامة ج. آرثر فندلاي رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن في كتابه القيم « على حافة العالم الأثيري » فهو يقول ضمن كلامه على « الكون الأثيري » ما يأتي :

« إن المادة أصبحت تعتبر هذا الأثير نفسه ، وإنما في حالات اهتزاز محدودة خاصة . والالكترونات في الذرة جسيمات من كهربائية سالبة ، والبروتونات دون شك كهربائية في طبيعتها ، وكلاهما أثيري . وما المادة إلا أثير في حالة خاصة . والأثير كله مادة فعلاً ، والمادة كلها أثير فعلاً . أما المادة الفيزيكية التي تدركها حواسنا فهي ذلك الجزء من الأثير الذي بهتز في دائرة معينة ، وفي هذا الكتاب قد فرقت بين المادتين : المادة الفيزيكية من جهة وهي المادة التي نخس بها ، والمادة الأثيرية من جهة أخرى وهي المادة التي لا تدركها حواسنا . ولكنها على الرغم من أن حواسنا لا تدركها ليست بعيدة عن متناول أفهامنا لدرجة ما على الأقل . والواقع أن فهمنا إياها قد تزايد كثيراً في السنين الأخيرة حتى لقد أصبح العلم الفيزيقي اليوم يتجه بكلياته إلى القول بأن الأساس البنائي للكون هو هذه المادة الأثيرية لا تلك المادة الفيزيكية

« ويمكن الآن اعتبار أثير الفضاء حلقة الاتصال الكبرى التي توحد ما بين عالم المادة وعالم الروح ، لأنه المادة المشتركة بين العالمين . وكلاهما محصور داخل هذه المادة ، وكلاهما جزء منها وكلاهما مكون منها . والعالمان جزء من كون واحد ، والحياة في كليهما مقيدة به . فهنا في هذا العالم المادي الذي نعيش فيه إنما نخس فقط بنوع من الاهتزازات المنخفضة الدرجة ، أما في عالم الروح حيث تؤدي الحياة وظائفها أيضاً فإن الوعي يتأثر بنوع من اهتزازات أعلى درجة » يجب أن نعلم أن الكون ما هو إلا أثير — لا أكثر ولا أقل — وإنما في حالات اهتزاز مختلفة »

وزاء يقول في باب « المادة والمقل » ما يأتي :

« إن الكون مكون من درجات مختلفة من الحركة ، بعضها نخس به نحن الكائنات الفيزيكية

ويسمى هذا البض مادة فيزيقية ، على حين توجد حركات كثيرة غير هذه ثم بنا فلا تثير حواسنا ولا بد من وجود تحول مطرد خلال هذه المنطقة الشاسعة ، فالمادة الفيزيقية تشع نفسها مستحيلة مادة غير منظورة ، وهذا إذا نحن أطلقنا كلمة مادة على الأثر الذي تحدثه هذه الحركة في العقل . والعقل هو أعلى ما نعرف من مجالات الاهتزاز ودرجاته

وهؤلاء الذين ينظرون إلى السكون كأنه مكون من المادة الفيزيقية فقط ولا شيء سواها يظنون أنه سائر إلى ذهاب وأن المادة الفيزيقية ستفنى يوماً ما ، ولكن وجهة النظر هذه محدودة جداً . وإني من تجاربي الروحية أفضل أن أعتبر المادة الفيزيقية جزءاً من السكون فقط ، وكما أن الشمس مثلاً تشع نفسها ببطء حتى تختفي عن الأنظار كذلك تتكون عوالم أخرى عن طريق إبطاء الحركة . وعلى هذا تظهر ببطء عوالم فيزيقية جديدة للعين الفيزيقية . والسكون يتغير باستمرار فالعوالم الفيزيقية كالسدم مثلاً تتولد ببطء فتراها نحن الفيزيقيين ، على حين تعود عوالم أخرى كالشمس مرة ثانية إلى المادة التي منها صدرت

«ومن الصعب أن تناقش موضوعاً يحلل نفسه إلى حركة ، أي إلى شيء لا يحس به باللسن ولكن المادة حركة والحركة مادة . فالمادة إذن هي السكون ، منها يتكون ، وهي في كل مكان فيه ، ولا يوجد مكان في أية جهة ما بخلو منها ، وهي ليس لها أول وان يكون لها آخر ، وهي تتحرك باستمرار حركة انتقال أو حركة انتقال حسب وجهة نظرنا . وليس في السكون فضاء خلاء . وهذه المادة التي وهي في حالات خاصة من الحركة نحس بها مادة فيزيقية — هذه المادة في حالات أخرى من الحركة يحس بها أهل العالم الأثيري كما نحس نحن بالمادة الفيزيقية . وإذن يكون لهم عالمهم المأموس كما لنا عالمنا المأموس وهكذا . أما كم علماً مختلفاً أو كم مكاناً مأهولاً توجد فتوقف على العقل ، فبدون العقل لا يوجد شيء ، وإن يحس بالمادة — فيزيقية كانت أم أثيرية — إلا إذا وجد العقل

« وعلى ذلك يكون منطقياً قولك إنه لا مادة حيث لا عقل ، وإن السكون يمكن أن يحتزل إلى شيء واحد هو الذي نسميه العقل ، ولكن هل نستطيع أن نتصور العقل بدون شيء يؤثر فيه هذا العقل ؟ إنما نحن نقدر وجود العقل وهو يؤثر في المادة ، فالعقل والمادة لا بد أن يكونا متلازمين على الرغم من تباينهما — إذ أن أحدهما إيجابي والآخر سلبي . وعلى ذلك فالاسم الذي أطلقناه على الشيء الذي يتكون السكون منه ، وهو المادة ، لا بد أن يتضمن هاتين الحالتين الإيجابية والسلبية ، يجب أن يكون اثنيهما في طبيعته إذ أن الواحد بدون الآخر لا يمكن تصوره . »

الفصل الرابع

عجينة الراديوم

وددت لو أن أولئك الآباء أهل الحجا والحزم فكروا جدياً في الفرق بين التعاليم الظنية العقيدة والتعاليم التجريبية لكي يستوفوا بأنفسهم من أنه ليس في طاقة أساتذة العلوم البقية التجريبية أن يشعروا بأنهم بحسب الهوى

« غاليلى »

لو أنك رأيت بضع حبات من الراديوم لبدت لك في مظهرها عديمة الرجاء كغيرها من ألوف الأشياء . ومع ذلك فقصة الراديوم يمر فيها كثيرون منا . فاستكشافه من بين أطنان من مادة لا رجاء فيها بوساطة تلك السيدة الموهوبة التي ما كان ينفذ لها صبر ، وهي مدام كوري Curie التي توفيت في صيف سنة ١٩٣٤ وهي تواصل أبحاثها ، وكذلك ثمنه الخيالي وقدرته العجيبة الشافية — كل هذه أشياء معروفة . ولكننا سنبعث فيه من حيث استجلائه طبيعة المادة . ولقد شرحنا النظريات الخاصة بالبناء الذري دون الإشارة إلى الراديوم وأشقاؤه من العناصر ، مع أن هذه النظريات في الحقيقة لم تعرف إلا عن طريق المعلومات التي حصل العلماء عليها من هذه المواد المشعة

وخاصية الراديوم الجوهرية أنه مادة تتغير ، فهو إذن ليس كالذهب أو السناج أو الزجاج أو الماس . إنه يخضع باستمرار بسرعة بطيئة جداً ولا يمكن أن يمنع اختفائه شيء . وذراته تنفجر واحدة بعد أخرى فيخرج منها غاز الهليوم تاركاً غاز الرادون radon الذي يتغير بدوره أيضاً وتتوالى التغيرات فتشمل سلسلة من ذرات مختلفة الأنواع ، وأخيراً يتغير الراديوم كله ويستحيل رصاً . وعندئذ تقف سلسلة التغيرات الطويلة هذه لأن ذرة الرصاص ثابتة لا تتغير . ويمكن تشبيه الراديوم ببناء سقف يقطع من الورق المقوي ، فالسقف لا يمكن أن يعمر طويلاً لأنه إذا ما سقطت ورقة منه تساقطت الأوراق تبعاً إلى أن تصل إلى البناء المتين السليم فيبقى ويستقر . ولكن الأوراق في ذرة الراديوم ليست هادئة ولا خاملة ، بل هي جسيمات دقيقة كهربائية دوارة تنطلق من قلب الذرة ومن أجزائها الخارجية . وتستطيع أن تخدع نفسك على سرعتها بمشاهدة بسيطة . خذ ساعة صنعت أرقام ميناها من الدهان الراديومي العادي

المضي ثم انخفض بدقة هذه الأرقام بمدة مكبرة في حجرة مظلمة بعد أن تكون دكرت عينيك عليها تماماً . إنك ترى الدهان يتألاً فيه نقط صغيرة ضوئية دائية التغير يتطاير شررها باستمرار (١) وتدل كل شرارة من هذا الشرر الضوئي على عرق إحدى ذرات الراديوم . فإذا ذكرنا أن الذرة صغيرة وخفيفة أمكننا أن ندرك شيئاً عن القوة التي تحدث بها هذه الانفجارات الذرية وليس الراديوم المادة الوحيدة الخاضعة لهذا التفكك المستمر ، ولكنه يختلف عن غيره في قوة انفجاره . فالعناصر الأثقل من البرزوت والرصاص غير ثابتة ، وهي تنفجر بنفس الطريقة . واليورانيوم ، وهو أثقل العناصر ، ٢٣٨ إلكترونات ومثلها من البروتونات في كل ذرة وهذا كثير جداً على البناء الثابت الذي يراد منه ألا يتفكك . وعنصر الثوريوم الذي يوجد بذرته ٢٣٢ إلكترونات و ٢٣٧ بروتوناً أيضاً مثل آخر أكثر شوعاً إذ أنه يوجد في شبكة الصباح الغازي العادي . ويمكن إثبات وجوده بسهولة ، وذلك بأن تضع قطعة من الشبكة فوق لوحة فوتوغرافية حساسة ، ثم تتركها أسبوعاً بعد أن تكون خباثتها حتى لا يصلها ضوء . فتري اللوحة تأثرت بعد هذا الوقت وتظهر فوقها صورة للنسيج . وسبب ذلك أن الأجزاء المنطلقة من ذرات الثوريوم عند إصابتها اللوحة تغيرها كما يغيرها الضوء . واستكشفت هذه المواد المشعة سنة ١٨٩٦ حينما وجد هنري بكريل H. Becquerel أن لوحاته الفوتوغرافية قد تلفت من جراء وضعها قريبة من بعض خام الأورانيوم

والراديوم نادر الوجود جداً في بعض الخامات ، واستخلاصه منها بمجد وبكثافة كثيراً ويحيي معظم إرادته في العالم من عصر الكارنوتيت الذي يوجد في الولايات المتحدة . ويوجد الراديوم بنسبة قسمة اسكن عشرة أطنان من هذا الصخر . وثمة غالباً جداً إذ أن ثمن الأوقية الواحدة منه نصف مليون من الجنيهات والمعامل التي تحرزه قليلة جداً فضلاً عن أن ما يحرزه المعمل الواحد منه لا يتعدى جزءاً من مائة جزء من الأوقية . ومن حسن الحظ أنه توجد وسيلة دقيقة جداً لوزن مقاديره المتناهية في الصغر ، وذلك باستعمال جهاز الالكتروسكوب أي الكشاف الكهربائي . فهذا الكشاف إذا لمس قلم أنبوس مدلولك بقطعة من الصوف أي مشحون بالكهربائية فإن ورقته الذهبيتين الرقيقتين تتفرجان بزاوية ما ، وكل ورقة تميل بزاوية ما على الاتجاه الرأسي . وتظل الورقة كذلك إلا إذا فقدت بعض جزيئات الهواء إلكتروناتها (٢) . فإذا وجدت أية مادة مشعة بالقرب من الكشاف فإن الجسيمات المتطايرة من ذراتها المتفككة تصطدم بجزيئات الهواء ، وتطرد بعض إلكترونات هذه الجزيئات من أماكنها ، فتبدأ الورقة الذهبية في الهبوط . وبقياس

(١) يرى ذلك بشكل أم وأجل في منظار الشرر spinthariscopes الصغير الذي اخترعه سيد ولهم كروكس (٢) عندما يحدث هذا يقال للهواء أنه متأين ionized

سرعة حيويتها يمكن وزن مقدار الراديوم أو غيره من المواد التي تشبهه . وهذه الطريقة بالغة الحذر في الحساسية والدقة ، وبها يمكن قياس الوزن لفاية جزء من مائة بليون جزء من جرام الراديوم . ومعلوم أن هذا القدر لا يمكن وزنه بأدق الموازين الموجودة .

فما الذي يشبه السكشاف الكهربائي إذ ذك من أسرار هذه الجسيمات المتطايرة من ذرة الراديوم المتفجرة ؟ ألجواب على هذا السؤال يتكامل سنة بعد أخرى ، ويصح أن نشير إلى أن معامل باريس وفينا وكبرديج لها القدر المعلى في هذا الصدد . ولقد وجدت إلكترونات تنطلق بسرعات مختلفة تمتد إلى ١٦٠٠٠٠ ميل في الثانية ، وهذه هي المعروفة بجسيمات بيتا *beta particles* وكذلك وجدت جسيمات ألفا *alpha* الثقيلة الوزن التي تتألف من أربعة بروتونات وإلكترونين والتي تنطلق بسرعة ٩٦٠٠ ميل في الثانية . ويلاحظ هنا بوجه خاص أن البروتونات المفردة لا تظهر ، وذلك لأن وزن جسيم ألفا يعادل دائماً وزن أربعة بروتونات ، وقد قيس هذا الوزن عن طريق الانحرافات المغناطيسية الكهربائية كما هو الحال مع الأشعة المهبطية . ويكون وزن هذا الجسيم إذن معادلاً لوزن ذرة هليوم ، فإذا ما حصل على إلكترونين استحالت ذرة هليوم ويستغرق الجرام الواحد من الراديوم ستاً وتسعين سنة لكي ينتج بوصة مكعبة واحدة من غاز الهليوم الذي يعادل ضغطه الضغط الجوي العادي . ولكن رذرفورد استطاع مع هذا أن يحصل من الراديوم على قدر من الهليوم كافٍ لأن يدركه الاسكتروسكوب ويميزه . ومعنى هذا أن البروتونات وهي مستقرة في نواة ذرة الراديوم قبل انفجارها متراصة في إضمات مكونة من أربعة يضاف لكل إضمات إلكترونان . ومن الجائز أن تكون البروتونات كلها تقريباً في نويات العناصر الأخرى جميعها على هذه الصورة ، أي على شكل جسيمات ألفا . ويوجد بالفعل في نواة الراديوم ٢٢٦ بروتوناً ، أي أنه يوجد ست وخمسون إضمات ذات أربعة بروتونات ثم بروتونان اثنان . وهذان لا يظهر لهما بتاتاً أثر في الانفجارات ، ولعل ذلك راجع لتعمقهما في النواة

قد يدعش القارئ لهذه السرعات الهائلة التي تسير بها الجسيمات ، فالإلكترونات تكاد تسير بسرعة الضوء ، أما البروتونات فسرعتها أقل ولكنها تحتوي على طاقة أكبر كثيراً من طاقة الإلكترونات لأنها أثقل منها ألوف المرات . وطاقة البترول المحترق في آلة إحدى الطائرات القوية ليست شيئاً مذكوراً إذا قيسست بطاقة هذه الجسيمات الطائرة ، على شريطة أن تكون المقارنة بين مقادير متساوية من المادتين . فأولية الراديوم تعطي طاقة تعادل الطاقة التي تعطيها سبعة أطنان من الفحم — غير أن طاقة الراديوم هذه لا يمكن الحصول عليها بسرعة بل يجب أن

تمضي بضعة آلاف من السنين قبل الحصول عليها . والطاقة كائنة في حركة الجسيمات المنطلقة وتظهر على شكل حرارة إذا أُعقيت هذه الجسيمات عن الحركة . وعلى ذلك فقليل الراديوم الموضوع في أنبوبة يكون دائماً أسخن مما يحيط به من الأشياء بضع درجات . وبمقدار جرام الراديوم وهو في حالته العادية كل ساعة بمائة وخمسة وثلاثين سعراً . ولو أن الجسيمات المنطلقة من بضع حبات من الراديوم تحبس في مقدار من الماء يماثلها وزناً لعل هذا الماء في ظرف أربعين دقيقة تقريباً . ويوجد قليل جداً من الراديوم في أرضنا هذه ، وهو وغيره من المواد المشعة يرفع من درجة حرارة الأرض كما أثبتت ذلك الأقيسة والتقدير الدقيق المعقولة . وما كانت طاقة ذرة الراديوم مجرد منفعة علمية ، بل هي مفيدة أيضاً لحياة الانسان . وسنعود الى هذه النقطة فيما سيجيء

هذه الاشعاعات الفعالة للمشعات الكهربائية لا يمكن أن تمضي دون إحداث نبضات قوية جداً من القوة الكهربائية . وهذه النبضات تليق في الوقت عينه إلى جميع أنحاء الفضاء المجاور وتستطيع هذه الموجات الأثيرية أن تنفذ خلال المواد الحاجبة ذات السمك الكبير غير العادي فهي في الحقيقة نوع من أشعة إكس . وهي تسمى أشعة جاما gamma وتبلغ أطوالها الموجية في المتوسط حوالي جزء من عشرين بليون جزء من البوصة ، وتكون طيفاً واضحاً هو أحد الخواص المميزة للمادة المشعة لها . وتستطيع أن تخترق الحديد الصلب الذي سمكه ١٦ بوصة ، وهذا يزيد عما تستطيعه أشعة إكس المعروفة الأطول موجة . على أننا لو أردنا إحداث أشعة إكس من التي لها هذا الجهد لا نحتاجنا إلى ضغط كهربائي قدره مليون فولط . وقد أمكن حديثاً لحسن الحظ الحصول على هذا القدر العظيم في أميركا ، ووجد أنه يولد في الهواء شرارة طولها تسعة أقدام

بعد هذا لم تبق حاجة إلى حجب الفلاسفة لأحداث التحول في عناصر مجموعة المواد هذه التي تشبه الراديوم . وكان قد أدى البحث الطويل بكميائي القرن التاسع عشر إلى الاعتقاد بأن الذرات ثابتة لا تتحول . ولكننا نجد الآن أن بعض العناصر يمكن أن تتغير وتستحيل عناصر أخرى ، غير أننا مع الأسف عاجزون عن ضبط هذه القوى التي نراها تعمل ، قاصرون عن مراقبتها والسيطرة عليها ، في ظرف ٢٥٠ سنة تتحول ذرة من كل عشر ذرات من الراديوم وتصبح ذرة رادون ، ولا يمكن للحرارة أو البرودة ، ولا للتفاعل الكيميائي أو الضغط الميكانيكي أن يغير هذه النسبة أدنى تغيير . وهذا البطء في التحول قاصر على الراديوم نفسه ، أما بعض العناصر الأخرى المشعة فانها تتحلل بأسرع من ذلك — في بضعة أيام أو حتى في بضع ثوان . أما عن ذرات العناصر الأخرى غير المتغيرة فيوجد فيما عرف حديثاً عن الذرة الشيء الكثير

الذي يشجع الكيميائي الحديث . فنحن نعرف الآن أن ذرة الزئبق تختلف عن ذرة الذهب في أنها تشمل على أربعة بروتونات وثلاثة إلكترونات زيادة في النواة وعلى إلكترون واحد زيادة في الأفلاك الخارجية . فإذا أمكن الوصول لأزالة هذه الجسيمات الزائدة أمكن أن يستعمل الزئبق ذهباً . ولا ندري أيلقى الناس من وراء ذلك خيراً أم شراً ؟! ويدعي البعض أنهم نجحوا في ذلك باستعمال قوى كهربائية قوية ، وإن تكن دعاواهم لم تتحقق ، ولكن من الجائز أن يصلوا الى هذا التحول المنشود (١)

وفي الوقت نفسه قد توصل رذرفورد ببعض تجارب مدهشة إلى إحداث تحولات ذرية لكنها ضيقة المدى . وطريقته في ذلك أنه أطلق جسيمات ألفا السريعة على ذرات جملة عناصر بشكل مكنه من تسجيل وجود أي ناتج جديد . ومن السهل أن تحدث اصطداماً بين الجسيمات وبين الذرات ، ولكن من النادر جداً أن تصاب نواة الذرة ، إذ المعروف أن حجم النواة صغير جداً ، وبذلك تكون فرصة إصابتها نادرة . ولكن قد يحدث أن تصاب النواة وبذلك تتحطم الذرة . واستطاع رذرفورد أن يميز ذرات الايدروجين المتولدة من الذرات المتفجرة بأية لذرات العناصر الخفيفة جميعها ما عدا الكربون والأكسجين . فهي مثلاً قد تولدت من الألومنيوم ، ولو بل إن من الثابت أيضاً أن بعض ذرات الألومنيوم قد تحولت فعلاً فصارت ذرات مغنسيوم ، ولو بصفة مؤقتة على الأقل حينما أزيل هذا الجزء الخفيف الزائد . وهذا بلا شك تحول للعناصر مدهش وممكن . غير أن مقدار المادة المتحولة صغير جداً . وقد دل الحساب على أنه إذا أطلق جرام كامل من الراديو جسيمات ألفا على الألومنيوم لمدة سنة فانتا نحصل على جزء من ألف جزء من المليمتر المكعب من الايدروجين ! وهذا المقدار صغير جداً لأن فرص إصابة النواة قليلة جداً . ويستغرق طيران الجسيم من الوقت جزءاً من مائة مليون جزء من الثانية ، وهو في غضون ذلك الوقت يخترق مائة ألف ذرة ، ومع ذلك فإن جسيمين فقط من كل مليون من هذه الجسيمات يمكن أن يصيبا نواة ذرية . والحق أن هذا البليارد الذري ليس من الألعاب السهلة وأبلغ من هذا أن يصل عالم فيزيقي آخر من كبردج اسمه ولسن C. T. R. Wilson إلى جعل لعب البليارد الذري هذا منظوراً . إنه لم يستطع في الحقيقة أن يرى ذرات فردية ، ولكنه استطاع أن يظهر الطريق الذي تسلكه ذرة بمفردها ، وأن يدوّن عدد المصادمات التي لافتها في طريقها . وأساس هذه التجارب بسيط أيضاً . فكنا نعرف أن الضباب أو الندى يتكاثف من الهواء الرطب إذا برد هذا الهواء . ونعرف أنه لا بد أن يكون لنقط الماء الصغيرة التي تكون الضباب مراكز أو نويات تتجمع حولها كل نقطة . وهذه المراكز في العادة

(١) يقول الدكتور أندريد استاذ الفيزياء في جامعة لندن في كتابه « الكيمياء الجديدة » انه يمكن تحويل الليثيوم والبورون الى هليوم والنترجين الى أكسجين

هي دقائق التراب المتناثرة في الهواء . فالذرة المشكّرة تقوم مقام مركز نقطة الماء تماماً . فإذا فقدت الذرة أو كسبت إلكترونات تكون فوقها نقطة إذا برد الهواء الرطب . وقد وصل ولسن إلى بضع وسائل مكنت هذه النقط من أن تكون وترى بغاية الوضوح . فإذا كان أحد جسيمات ألفا طائراً في الهواء سالكاً أقصر طريق فانه يترك أثراً للذرات المشكّرة ويصبح هذا الأثر منظوراً كأنه خط أبيض من نقط مائة بمجرد أن يبرد الهواء . ومدنا لمطخة الراديوم في إحدى أواني ولسن بمنظر عجيب جداً . ، فان إطلاقها باستمرار لجسيمات ألفا يظهر على شكل مروحة متألّفة من خطوط بيضاء زى مئات منها كلما أجريت التجربة . وفي النادر جداً ترى بعض الخطوط يجيد حيدة كبيرة ، وهذا يحدث حينما يلطم الجسم نواة ذرية ثم يرتد بشدة من جراء التصادم . وهناك خطوط أخرى ضئيلة متعقّلة ترى أيضاً مقفّية أثر جسيمات بيتا ، وهي تلك الإلكترونات السريعة التي تؤن هي أيضاً الذرات التي تحترقها ، والتي لحقتها تنفس اتجاهها لمركب اصطدام ذري . وتسمى خطوط النقط هذه مسارات الشعاع ، ويمكن تصويرها فوتوغرافياً ، ومن ثم نستطيع أن ندرك بسهولة أن هذه الطريقة تمدنا بوسيلة جيدة قيمة للبحث في ميكانيكا الذرة . وتؤخذ صور ولسن الفوتوغرافية هذه في كثير من المعامل وتخصص جيداً ، وكانت النتيجة أنها حققت كل التحقيق الآراء المتعلقة بالعمليات الإشعاعية التي نبحث فيها . فمثلاً حقق بلاكت Blackett الكبريتي ما روينا هنا عن ندرة الاصطدام النووي ، فقد وجد في ٢٧٠٠٠٠ صورة فوتوغرافية ثمان حالات فقط لاصطدامات مباشرة محطمة بين النويات الذرية وأخيراً نجد بنا أن تشير إلى قوة الراديوم في العلاج ، فان تأثير الأشعة في الأجسام العضوية قوي بطبيعته فإذا تعرضت بشرة الإنسان لجسيمات بيتا احترقت . ومن حسن الحظ أن البشرة المرخصة أو اللحم المريض أقل مقاومة من السليم . وعلى ذلك يمكن استخدام الراديوم بأمان في ابادة الأجزاء المرخصة الموبوءة فيبقى الجلد السليم دون أذى محسوس إلا إذا كان الراديوم قوياً جداً . ومن ثم يمكن إبراء التؤلول البسيط باشعاع قدره ٤٠ ميلي-كوري (١) ساعة مرشحاً خلال ألومنيوم سمكه مليمتران . ولداواة الفروع الأكلالة تحتاج إلى ٢٠٠٠ ميلي-كوري — ساعة . ويمكن تسليط الطاقة وتوجيهها إلى حيث يراد ، وتبقى كذلك دون وجود آلة تكلفتها كثيراً وذلك باستعمال أنابيب صغيرة تحتوي على الراديوم أو على أحد مشتقاته . والراديوم نفسه غالي الثمن جداً ، والموجود منه الآن في أحد مستشفيات لندن الكبرى هو نصف جرام مقسم إلى ٢٢٠ جزءاً ، وكل جزء موضوع في إناء خاص . ويقدر ثمن كل من هذه الأواني في الوقت الحاضر بأربعين جنيهاً

(١) الميلي كوري هو مقدار غاز الرادون الفاعل كيميائياً المعادل للجرام من الراديوم النقي

الفصل الخامس

أشعة إكس والضوء فوق البنفسجي

توجد بعد الضوء البنفسجي موجات أقصر وأسرع اهتزازاً— وهي الموجات فوق البنفسجية التي يقدرها الفوتوغرافي قدرها أما أشعة إكس فهي النهاية القصوى لسلسلة الموجات هذه أو هي أعلى جواب ضوئي . وتدل قدرتها النفاذة على أنها متناهية في الصغر ولكنها أيضاً لم تحتفظ بسرّها بل أفضت به إلى الفيزيقي الحديث « ج . آرثر طمس »

سندرس في هذا الفصل والذي يليه بعض الموجات الأثيرية في شيء من التفصيل ، وبعد ذلك نفرد إلى معاملاتنا عن المادة وبنائها فنخطو بها خطى أخرى بعض هذه الموجات يحوم حولنا باستمرار في شكل ضوء وحرارة وبعضها قد انتقنا به في السنين الأخيرة وكان أداة لهو وسرور لنا — ونقصد به الموجات اللاسلكية والأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس ، وبعضها هو تلك الأشعة الكونية التي نقتد من هذه الموجات كلها ، والتي لم تدرس إلا أخيراً ، والتي لا تزال تكتنفها الأسرار . وهذه الموجات جميعها واحدة في طبيعتها كما مرّ بنا . وليس صعباً أن نرمس لها صورة عقلية بسيطة فإذا تصورنا أن شعاعاً واحداً قد صدّ عن سبيله فوقف فجأة ثم فحسناه لوجدنا أنه توجد عند كل نقطة على طوله قوة كهربائية وأخرى مغناطيسية . وإذا بدأنا من نقطة ما وسرنا مع الشعاع فالتناجد القوة الكهربائية تتناقص شيئاً فشيئاً كلما تقدمنا إلى أن تختفي في نقطة ما ، فإذا سرنا بعد ذلك عثرنا عليها ثانية وإما في اتجاه مضاد ، وبعد ذلك تختفي ثم تظهر منعكسة مرة أخرى وهكذا . وهذه القوة لا يمكن لمسها أو الشعور بها كمثل القوة التي نحيط بالقلم الأبنوس بعد ذلك . ولكنها تقاس ، ومقاديرها المقاسة المتغيرة بتغير النقط على طول الشعاع يمكن أن تحلل وتضبط وتقيم . وقد توجد قوة في إحدى نقط الشعاع ، وعلى بعد بوصة منها على طول الشعاع توجد قوة أخرى ماثلة لها في القدر فيقال إن لهذا الشعاع طولاً موجياً قدره بوصة واحدة . وفي الموجة القصيرة قد تبلغ هذه المسافة بين النقطتين جزءاً من بلون جزء من البوصة فقط ، وقد تبلغ في الموجة الطويلة ميلاً ويزيد ولا تسير القوة الكهربائية الموجودة في أي نقطة من نقط الشعاع في اتجاه طولي بالنسبة

إليه؛ بل تكون دائماً في اتجاه مستمر، وهذا يحمل هذه الموجات تحتناف اختلافاً جوهرياً عن الموجات الصوتية، حيث تكون القوة التي تدفع جزيئات الهواء حيثةً وذهاباً طولية أي في اتجاه الموجة. وعدا هذا فالقوة الكهربائية مصحوبة دائماً أبداً بقوةً مغناطيسية، غير أنه إذا كانت الموجة الكهربائية تقطع الشعاع من جانب لآخر فإن القوة المغناطيسية تقطعه أيضاً وإنما من أعلى إلى أسفل فهي إذن موجات كهربائية مغناطيسية أو «كهربية» كما اصطلاح على تسميتها ربما أظهر هذا التصوير السريع للموجة أنها في حالة سكون. ولكن الواقع أن هناك تغيراً يحدث فيها بالفعل كلما تقدمت الموجة، وفوق هذا فإن نفس التغيرات التي توجد في الموجة الساكنة تراها تتكرر عند كل نقطة في الموجة الحقيقية. تصور موجة ماء تطفئ على قطعة فلين طافية. فقطعة الفلين ترتفع وتنخفض كلما سارت الموجة. وثق أنه لا شيء يتحرك عند ما تسير الموجة الكهربية في فضاء فارغ، ولكن القوة تتغير بانتظام عند كل نقطة. فإذا حدث أن وجد قليل من الكهرباء في إحدى النقط، كأن وجد إلكترون مثلاً، فإنه يتحرك حيثةً وذهاباً في اتجاه عمودي على اتجاه الموجة عند ما تمر به هذه الموجة. وتتغير سرعة هذه التزاوجات بتغير الموجات فتبلغ مليون مرة في الثانية أحياناً، وأحياناً تبلغ بليوناً. أما في موجة الضوء الأحمر فتبلغ ٥٠٠ بليون مرة في الثانية، وذلك هو ما يسمى تردد الموجة أي عدد ذبذباتها. أما سرعتها فما أسهل الحصول عليها إذا ما علمنا إلا أن نضرب تردد الموجة في طولها. فإذا كان طول الموجة ربع ميل وترددها ٧٤٤٠٠٠ في الثانية فإن سرعتها تساوي $\frac{1}{4} \times 744000$ أو ١٨٦٠٠٠ ميل في الثانية

وقساوي الموجات الكهربية جميعها في السرعة عبر الفضاء الحلاء، وتكون سرعتها ١٨٦٠٠٠ ميل أو ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر في الثانية. أما خلال المواد فالموجات تبطئ عن ذلك، فمثلاً إذا انطلق الضوء في الماء فإنه يسير بسرعة تعدل ثلاثة أرباع سرعته العادية، وتتوقف نسبة الإبطاء على اللون. ولو كانت الموجات تسير كلها بسرعة واحدة ما ظهرت لنا أقواس قزح البتة. ولا يفتك أن تذبذب الموجة الواحدة واحد في العدد سواء سارت في الماء أم في الفراغ، ولكن طول الموجة يكون أقصر قليلاً

وإذا نحن انتقلنا بعد ذلك إلى درس الموجات بالتفصيل فالطبيعي أن نبدأ بأقصرها، وهي تلك «الموجات النفاذة» الخفية التي كان يحسن تسميتها باسم كهرستر Kolhorster أو باسم هيس Hess الذين بحثا فيها معاً قبل الحرب في سياحات في أعالي الجو حيث طارا غير مرة في منطاد لهذا الغرض. وقد سماها الأستاذ ميليكان Millikan العالم الفيزيقي الأميركي الشهير «الأشعة الكونية» وكان قد وإلى درسه إياها مقتفياً أثر ذينك الألمانيين. وتصل هذه

الأشعة إلى الأرض قادمة من مكان مجهول في السموات . أما إدراك هذه الأشعة فلم يكن إلاّ عن طريق واحد هو قدرتها على تأيين الهواء ، أي على طرد إلكترونات من جزيئات الهواء فتتكرب من ثمّ . وتأيين الهواء هذا يحدث انخفاضاً بطيء الحركة في ورقة الكشف الذهبية . وهذه الأشعة ففازة بشكل خارق للعادة ، وهي تفقد نصف قوتها فقط في اختراقها اثني عشر قدماً من الماء أو ثمان عشرة بوصة من الحديد الصلب ، وهي تخترق من الرصاص ما سمكه خمس ياردات ، ومن أمثال هذه الأفيسة استنتجوا أن طولها الموجي حوالي جزء من بليون جزء من البوصة ! أما عن إحداث مثل هذه الموجات في المعامل فنحن عاجزون تماماً ، وكل ما وصل إليه العلماء في تفصي مصدرها السماوي هو أنها نتيجة إبادة المادة — ولقد مرّ بنا ذكر ذلك في الفصل الثالث . نحن لانستطيع أن نوجد من الدم مادة — أي إلكترونات وبروتونات — أو نبين إلى عدم أخرى فوق هذه الأرض ولكن إذا كانت هاتان العمليتان تحدثان داخل النجوم من جراء الحرارة والضغط النجميين العظيمين فقد تكون هذه الأشعة إحدى نتائجهما . ويجوز أن يصطدم إلكترون بروتون فلا يحدثان بتصادمهما شيئاً إلاّ إشعاعاً ، ويجوز أن تتحد أربع ذرات إيدروجين لتكوّن ذرة هليوم ، فتبدو الكتلة الضئيلة التي تهدم خلال هذه العملية إشعاعاً . وهذا الإشعاع الكوني يخترق جسمونا ليلاً ونهاراً ، ولا ينحينا منه انحدارنا إلى منجم أو انهارا في اليم . وهو من الشدة بحيث أنه يحلل من أجسامنا في كل ثانية ملايين الجزيئات . وقد يكون ضرورياً للحياة ، وقد يكون قاضياً عليها ، وعلم ذلك عندالله وبعد هذه الأشعة في ترتيب الطول الموجي نجيب أشعة جاما المنبعثة من الراديو ، وقد تكلمنا عنها في الفصل السابق ، وتليها أشعة إكس . وهذه تتولد في الأنايب المفرغة عند ما تصيب إلكترونات أشعة المهبط أي هدف . ولا يمكن اقتناص إلكترون من هذه الأشعة المنطلقة دون إحداث رجة في القوة الكهربائية المنتشرة في الفضاء المحيط به — وهذه الرجة هي شعاع إكس . فإذا كانت سرعة الإلكترون كبيرة وكان الهدف ثقيلًا كان الشعاع «عسراً» (١) وكان طول الموجي قصيراً — حوالي جزء من ستمائة مليون جزء من السنتيمتر . أما إذا كان الشعاع «يسراً» (١) ذا طول موجي يبلغ قدر ذلك ستين مرة فإنه يكون أسهل توليداً ، ولكنه لا يحاكي زميله في ثخانة المادة التي يستطيع أن يخترقها . وخيما يسير شعاع إكس خلال المادة يفقد طاقته بإحداث حركة في إلكتروناتها وذراتها ، وهذا الفقدان يتناسب وكثافة المادة . وعلى ذلك فإذا احتاج الأمر لحائل يوقف ففاز هذه الأشعة فيحسن صنعه من الرصاص . ولهذا يلبس المشتغلون بأنايب أشعة إكس القوية قفازين ومعاطف مصنوعة من

المطابق المنقوع في أملاح الرصاص . أما الأنبوبة نفسها فتوضع في صندوق من الحديد أو الرصاص لا تكون له إلا فتحة واحدة تخرج منها الأشعة . ومن السهل أن نطلق إلكترونات على هدف داخل أنبوبة مفرغة . وذلك في الحقيقة هو سر لأحداث أشعة إكس التي استكشفها سنة ١٨٩٥ الأستاذ رنتجن Rontgen بمهارته التي واثاقها الحظ والمصادفة . لقد كان إتلاف صندوق لوحات فوتوغرافية بأكمله للمرة الثانية بمسبب النور الذي أدنى إلى هذا الاستكشاف . وطريقة الحصول على حزمة قوية منتظمة من هذه الأشعة تدخل بنا في بعض مصاعب فنية . فالإلكترونات المنسابة هذه هي على ضالتها من القوة بحيث إذا خضعت بسرعة عظيمة أمكنها أن تصهر أشد الأجسام استمضاء على الحرارة ، وهي البلاطين والتنجستن ، ومن ثم كان من اللازم اتخاذ وسائل لتبريد الهدف . فحزبات الناز التي يجب أن تبقى في الأنبوبة لتقديم الإلكترونات اللازمة تدفع إلى الاشتراك في العملية ، فتتمصها على غير انتظام جدران الأنبوبة ، وهذا يعوق انتظام سير العمل . ولكن عبقرية الدكتور كوليدج Dr. Coolidge الاميريكي قد نقلت على هذه العقبة في أنابيبه الطريقة التي اخترعها لتوليد أشعة إكس ، حيث استغنى فيها عن الغاز وأخذ الإلكترونات اللازمة من سلك قصير يسخن إلى درجة الإيضاض بجهاز تسخين كهربائي منفصل . وعدا هذا فقد تحطم الإلكترونات الضالة الشاردة جدران الأنبوبة القوية الزجاجية بعد أن تهكمت فتودي بها على الفور . فلم يكن حينئذ إذن أن تصل الأنبوبة الحديثة إلى حال كمالها الراهنة المدهشة .

ولا يسع كل من رأى صورة فوتوغرافية لجزء من جسم الإنسان مأخوذة بأشعة إكس إلا أن يعجب بدقتها ، وإلا أن يقدر لها خطرها العظيم . فجميع تفصيلات الجزء المرسوم يسهل جداً درسها وفحصها . ومعلوم أن الفرق بين كثافة الجلد والعصل طفيف جداً ، والأشعة تخترق كلاهما بسهولة ، ولكن هذا الفرق الطفيف كاف لأحداث فرق في درجة سواد الظل الواقع على اللوحة متى كانت قوة الأشعة مناسبة . وفوق هذا فإن المشتغلين بالتصوير الفوتوغرافي بأشعة إكس يقومون بخدمة جليلة المصانع ومحال اختبار السلع حيث يوجهون أشعتهم إلى الأجزاء الخفيفة في الآلات وإلى سبائك الفلزات ووصلات الخشب فيكشفون خباياها . ولقد أدخلت الأشعة حديثاً في بعض دور الصناعات وصاروا يختبرون بها كل يوم ألتي سلمة ، فأمكنهم بذلك كشف العيوب الداخلية من شقوق وكسور . وليس تأثير أشعة إكس قاصراً على تعميم اللوحات الفوتوغرافية بل إن لهذه الأشعة أيضاً القدرة على جعل بعض المواد تضيء في الظلام وجرت المادة أن يوضع حائل مغطى بأحدى هذه المواد ^(١) ، معترضاً طريق الأشعة بعد أن

تكون قد مرت خلال الجسم المراد فحصه ، فتظهر التضييلات على الفور في الصورة الظلية الصفراء الواضحة البراقة ، ويمكن اعتبار قلب قرص من الحبن أو كرة الجوارف للتحقق من حجم الجيوب في الأول ومن انتظام الثاني . بل يمكن أيضاً كشف صورة رسمتها ريشة أحد مشاهير الرسامين القدماء وذلك لوجود الرصاص الأبيض في دهان الصورة . بل قد يرى بسهولة أثر العلاج بالبرص في الجهاز الهضمي لأي مريض — وبالاختصار قد أصبح كل فن من الفنون يستمد من أشعة إكس عوناً كبيراً

أضف لذلك أن قدرة أشعة إكس على إبراء الأمراض تضاهي قدرة أشعة الراديوم . وقد تلف منسوجات الجلد بمرور الأشعة — وما زال العلماء يذكرون التضحية الباسلة التي أقدم عليها رجال من طراز الدكتور بروس Dr. Bruce والدكتور إدوردز Dr. Edwards اللذين مضيا في استعمال الأشعة وخبرها قبل معرفتهما إتلافها الجلد فكلفهما ذلك حياتهما فكانا شهيدين من شهداء العلم . والأشعة البسرة هي التي تضر الجلد ، فإذا صدت عنه ووجهت الأشعة البسرة إلى الجزء المريض من الجسم ، كالقرحة العميقة مثلاً ، فإنها تبرئها تماماً . غير أن تفصيلات التفاعل بين شعاع إكس والحيز المضيء ما زالت خفية ، ولكن التجارب الدقيقة قد دلت على أن القواعد الجديدة لممارسة علم الأشعة تجريدياً أصبحت الآن مفهومة كل الفهم ، وتحققت للناس مقدرتها على إبراء الأسقام

ولنعد بعد ذلك إلى وجهة النظر الفيزيائية ، فترى أنه لا مندوحة لنا عن الإشارة باختصار إلى المعلومات الحديثة الخاصة بالبناء الذري وعلاقته بأشعة إكس . لقد مررنا أن شعاعاً من الضوء قد يرى حينما يضطرب أحد الالكترونات فيقادر محله ثم يسمح له بالعودة إليه . وقد وجدوا أنه كلما كان الالكترون أكثر تماسكاً في الذرة كانت اهتزازات الموجة الكهربائية التي تصحب عودته أسرع . ومن ثم كان لنا أن نتوقع صدور موجات صغيرة جداً من هذه الالكترونات القريبة من مركز الذرة القوي في كل الذرات ، لأن هذه الالكترونات شديدة الاحتفاظ بمداراتها . ولكنك إذا أثرت إلكترونات خارجياً تلا ذلك حدوث ضوء منظور ، أما إذا أثرت إلكترونات داخلياً تلا ذلك حدوث شعاع إكس . ومع ذلك فلم فصل بعد إلى إنارة الالكترونات الداخلية — وهي الالكترونات النواة — بوسائل صناعية ، ولكننا نستطيع مشاهدة أشعة جاما التي تصحب الاضطراب النووي في الذرة المشعة . وسنشرح في الفصل الثامن الخاص ببناء البلورات كيف قيس الطول الموجي لأشعة إكس . وقد وجدوا أن أقصر الموجات نجيء من أشعة الذرات حيث تكون الالكترونات الداخلية محفوظة في أفلاكها أتم

حفظ بواسطة جذب النواة الثقيلة لها . على أنه يمكن من وزن الذرة في بعض الحالات أن نحسب طول وتردد شعاع أو أشعة إكس التي قد تحدثها إحدى الذرات . وكان نصراً عظيماً لنموذج بوهر الذري ، وقد صرنا شرحه ، أن تمكن من أن يبين بهذه الطريقة أسباب أطواف العناصر جميعها سواء كانت أطوافاً ضوئية أو أطواف أشعة إكس

ويقع الضوء فوق البنفسجي بين أشعة إكس والضوء المنظور ، وذلك من حيث سرعة الذبذبات . إنه لا يختلف عن الضوء البنفسجي المنظور في أكثر من أن طول موجته أقصر قليلاً ، وأما كونه غير منظور فراجع إلى خصائص العين البشرية لا إلى الموجة نفسها . وإذن فتحنرغون على استعمال أجهزة أخرى غير العين عندما ندرس هذا الضوء فوق سطح الأرض . وأهم هذه الآلات اللوحة الفوتوغرافية ، وتلها العين الكهرضوية Photo-electric cell وهي أنبوبة مكسوة من الداخل بغشاء من الصوديوم أو البوتاسيوم أو الكالسيوم أي من فلز قلوي ، وبها عارضة معدنية ، وتستعمل في أعمال الرؤية عن بعد لتحويل الأشعة الضوئية إلى تيارات كهربائية . وأساس هذه العين ذلك الاستكشاف الذي اشترك فيه كل من هرتز Hertz سنة ١٨٨٧ وهلواكس Hallwachs سنة ١٨٨٨ ، ومؤداه أنه إذا سقطت الأشعة على بعض مواد كالخارصين مثلاً فإنها حينما تصيبها تقطع منها إلكترونات . ويستطيع كشف كهربائي دقيق إيجاد عدد هذه الإلكترونات ، ومن ثم يمكن قياس شدة هذه الأشعة . واللوحة الفوتوغرافية أسهل في الاستعمال ، وتستطيع تسجيل جملة أنواع من الموجات فوق البنفسجية ، أي من آخر الموجات الضوئية المنظورة التي طول الواحدة منها جزء من ستة عشر مليون جزء من البوصة إلى موجات أخرى لها ربع هذا الطول الموجي . وفي الحقيقة كان الدكتور رتر Dr. Ritter أول من استكشف هذه الأشعة سنة ١٨٠١ عن طريق الفوتوغرافيا . ويمكن فصلها من الضوء بواسطة لوحة من زجاج أسود اللون يحجب الضوء ولا يحجب الأشعة فوق البنفسجية . وضوء الشمس والمصابيح الزيتية والمصابيح القوسية الأخرى غني بهذه الأشعة ، ولكنها لا توجد عادة داخل منازلنا إلا إذا كان زجاج النوافذ مفتوحاً لأن الزجاج يحجب الموجود منها في ضوء الشمس وكذلك يحجب معظمها في تلك المصابيح

ومن خواصها المدهشة جداً أن بعض المواد تشع ضوءاً منظوراً إذا سقطت عليها هذه الأشعة غير المنظورة . فزجاجة من زيت البرافين تضيء بتأثير هذه الأشعة في حجرة مظلمة بضوء أزرق متلألئ . ويعطي اللداد الأحمر الباهت تأثيرها ضوءاً برتقالياً ، ويعطي الزجاج الأورانيومي الأصفر ضوءاً أخضر ، وتبدو بعض أنواع الأشرطة المصبوغة بالأصفر كأنها ذات لون برتقالي ، وبها يشع سليق ورق السبانخ ضوءاً أخضر ، أما المادة الخاصة التي تصنع منها

حواحز أشعة إكس فهي سياتور الباريوم البلايني وهي تضيء أكثر من هذه كلها دائماً بلون أخضر مصفر . وقد استعملوا ذلك زمن الحرب لأعطاء إشارات غير منظورة . وطريقة ذلك أن ترسل الإشارات في ضوءه فوق البنفسجي حسب قانون مورس ، وتظل هذه الإشارات سراً مكتوماً لا يعرف حله إلا ذلك الراصد الذي جهز منظاره بقطعة صغيرة من الزجاج الأورانيومي فهو وحده الذي يستطيع أن يرى ضوءاً صغيراً يظهر عينه لحظة بعد أخرى ، إذا ما كان منظاره موجهاً صوب محطة الأرسال فيستطيع وحده أن يقرأ الإشارة المرسلة

وفي الطب الحديث تستعمل الأشعة فوق البنفسجية بنجاح عظيم . وكانت الملكة ألكسندرا الأولى بين من أدخلوا هذه الأشعة في إنجلترا منذ أكثر من ثلاثين سنة بعد أن نجح استعمالها في بلاد الدنمرك ، وكان النوع المستعمل منها إذ ذاك هو ضوء فنسن Finsen . وقد عم استعمالها الآن بعد أن صارت نفقات توليدها قليلة ، وصارنا نرى في جميع المستشفيات المصرية تقريباً حجرات خاصة لهذه الأشعة ، بل في كثير من مستوصفات الأطباء نرى أجهزتها كاملة ومعدة للاستعمال في كل وقت . وعلى الرغم من ذبوع استعمالها فإن طبيعة فعل هذه الأشعة لم تفهم بعد . أما مفعولها فيظهر أثره في تبيبه الجلد وتلوينه . وحينما تدبغ الشمس بشرتها فتصير سمراء تكون تلك الأشعة غير المنظورة العامل الأول في ذلك . ولا أحد شك عن أثرها العظيم في حالات التدرن ، فقد ظهر نفعها في أعمال العلاج التي قام بها مستشفى الدكتور رولير Dr. Rollier في سويسرا ، حيث تحتوي أشعة الشمس الشديدة على هذه الأشعة ، وحيث يسمح لها الجو الرقيق غير المتكاثف بالمرور . ومصحات حلوان لها في هذا الصدد القدر المأملي . وتدين نباتات الجبال والحقول بألوانها الزاهية الجميلة إلى هذه الأشعة التي تنبها فتحسن الأتفاع بمواد التربة المغذية عن طريق السكروفلو ، فيطر من ثم نموها ويقوى . أما في إنجلترا فأهم مصدر لهذه الأشعة هو المصباح الزئبقي ، وإن تكن أشعة الشمس هناك أيضاً مصدراً لها وإنما على شريطة أن يكون زجاج النوافذ من النوع المنفذ لهذه الأشعة . ويزيد من آن لآخر عدد الأمراض التي تبرا بهذه الأشعة . فالكساح والزال والروماتزم في مراتبه الأولى والقوباء وعدة أمراض جلدية أخرى أمكن علاجها . على أنه من جهة أخرى إذا تداوات هذه الأشعة أبدت غير مجربة فإنها تكون خطرة جداً ، فتسبب للعين رمداً خطراً (التهاب الملتحمة) إذا لم توضع على العين نظارة سوداء ، وتسبب للجلد بثوراً كبيرة إذا سلط منها مقدار قوي

ويمكن استعمال هذه الأشعة في الميكروسكوب بدل أشعة الضوء العادي ، فيسهل من ثم فحص أجسام أصغر . وحديثاً استطاع برنارد Bernard أن يتقن بها ما يعرف الآن بأنه مصدر توالد السرطان حيث استطاع تكثيره ٣٦٠٠ مرة . وتستعمل في أمثال ذلك عدسات من

الكوارتز بدل العدسات الزجاجية ، ويجب أن تكون اللوحات الفوتوغرافية من النوع البطيء ، أي التي يكون جعلها أصفر ما يمكن من الجلاتين وأكبر ما يمكن من الفضة . وكذلك يزداد قدر الميكروسكوب العادي ذي العدسات الزجاجية إذا أُضِيَتْ الأشياء المروضة للفحص بهذا الضوء غير المنظور ، وذلك لأن للمنسوجات الحيوانية جميعها خاصية التوهج بضوء منظور إذا تعرضت لهذه الأشعة غير المنظورة ، فتضيء العضلات بضوء أخضر ، والمظام بضوء أزرق ، والشعر الخفيف السواد بضوء أصفر — ولا يضيء البنية الشعر الأسود . أما الكائنات الحية الدقيقة من أمثال الباشلسات والجراثيم فإن تفصيلاتها تتضح أكثر إذا هي خُصِتْ بهذه الطريقة .

ويقول الدكتور هيريوارد كارنجتون Dr. Hereward Carrington في أحدث كتاب له وقد ظهر هذا العام (١٩٤٠) وهو كتاب « بحوث معمّلة في الظواهر الروحية » بصدد الفوتوغرافيا الروحية « إن الضوء فوق البنفسجي قد اختبر مرات في النقاط صور فوتوغرافية أثناء الجلسات الروحية باستخدام عدسات من الكوارتز ، وقد أسفرت التجارب عن بعض نتائج مذهشة » .



الفصل السادس

الموجات الكهربائية الطويلة

تبدو الموجات اللاسلكية والأشعة تحت الحمراء والضوء المنظور وتلك الأشعة الفعالة كيميائياً ، وهي أشعة اكس والأشعة فوق البنفسجية من الوجهة الوصفية على شكل ظواهر متباينة الصفات ، أما من حيث الجوهر فهي كلها شيء واحد أعني موجات كهربية لا تباين من الوجهة الكمية إلا في مدة الذبذبة فقط
« الدكتور آرثر هاس »

كنا نبحث في الضوء غير المنظور الذي يمتد فيما بعد الأشعة البنفسجية داخل قوس قزح . ولكن هناك سلسلة أخرى مشابهة من موجات كهربية خارج القوس ، أي فيما بعد الضوء الأحمر الذي به تنتهي حافة القوس المنظورة . فهذه الأشعة «دون الحمراء» أو «تحت الحمراء» أطول من الحمراء وذبذباتها أبطأ لأنها تنشأ عادةً من اهتزازات الأجزاء الثقيلة في الذرات والجزيئات لا من اهتزازات الإلكترونات . ولما كانت الذرات في أية مادة لا تستقر أبداً فإن هذه الموجات تتكوّن باستمرار . ويعطى كل جسم من الأجسام المحيطة بنا موجات طويلة غير منظورة — والحق ان ديانا كانت قبل أن نعرف «الأذاعة اللاسلكية» غدقة كما هي الآن بالموجات الكهربية . وتستقبل جسامنا هذه الأشعة وتقنمها ، وعلى قدر ما نستقبل منها يتوقف شعورنا بالدفع المنعش أو بالبرد المرعش . ويعمل الضوء المنظور على تدفئتنا أيضاً ، فليس حسناً منا إذن أن نطلق اسم «أشعة حرارية» على تلك الأشعة غير المنظورة دون غيرها إذ أن ذلك خطأ كبير الشيع لأن الضوء وحده يجلب لنا أيضاً قليلاً من الدفع . وكانت تجربة سير وليم هرشل Sir W. Herschel التي أجراها سنة ١٨٠٠ حينما استكشف هذه الأشعة محاولة أريد بها قياس التأثير الحراري لألوان قوس قزح . ولقد اتبع الرجل طريقة نيوتن في فصل ضوء الشمس ، إلى طيفه الكامل ذي ألوان قوس قزح ، ثم جاء بترموتر طلي بالسواد ووضعه في كل لون على حدة . فأظهرت النهاية الحمراء للعزمة حرارة أعلى من النهاية البنفسجية . ولكن لما أخرج الترمومتر من المنطقة الملونة كلها وجده قد دلّ على درجة حرارة أعلى . وقد استطاع أن يمسك هذه الأشعة وأن يستنبطها ، أي يركزها في نقطة ،

بنفس المرايا المستعملة في الضوء . وهي تخضع لجميع القوانين العادية الخاصة بالضوء المنظور .
وكثيراً ما يرى صبياً يلعب بمدسته المحرقة ، ونراه يحجب ضوء الشمس بحائل خاص دون أن
يوقف ذلك احتراق الورقة التي بيده

ولا تتأثر اللوحة الفوتوغرافية العادية بالضوء الأحمر ، وهي تكون عديمة النفع إذا أريد
منها أن تتأثر بالموجات دون الحمراء فتدوّنّها . ولكنها تصلح مع بعض التعديل . فنجد أكثر
من ثلاثين سنة عمر كابتن أبي Captain Abney بعض اللوحات في بذر السكتان ، فوجد
أنه بتوافر ظروف خاصة يمكن أن تشحن جزئيات برومور الفضة بالجزئيات المضوية الكبيرة
وبذلك يمكنها أن تستجيب لاهتزازات الموجات دون الحمراء الأبطأ . ويمكن أن تتأثر لوحاته
بموجات تبلغ في الطول ضعف موجات الضوء الأحمر تقريباً ، فسهل عليه أن يأخذ في حجرة
مظلمة صورة فوتوغرافية لأبريق أسود مملوء بالماء الغالي مستعملاً فقط الأشعة غير المنظورة
وقد أمكن الحصول على صور غريبة عندما استعملت هذه اللوحات لأخذ صور فوتوغرافية هادية
وقد حجب الضوء المنظور بحائل أسود لا ينفذ إلا الأشعة دون الحمراء فقط . وبدأت أوراق
النبات والشجر الخضراء زاهية متلألئة ، في حين ظهر الجو الصافي الزرقاء أسود قائماً ، وذلك
لأن الأوراق تمتص بالجزء الأكبر من هذه الأشعة الطويلة

ويقول الدكتور كارنجتون في كتابه « بحوث معمّلة في الظواهر الروحية » عن هذه
الأشعة إنها استخدمت بنجاح في التصوير الفوتوغرافي الروحي وإثبات من بين الذين
استخدموها بنجاح في هذا الصدد الدكتور أوستي Dr. Osty في فرنسا ولورد رالي
Lord Rayleigh ولورد شارلز هوب Lord Charles Hope في انكلترا . وكذلك استخدمها
بنجاح في هذا الصدد سنة ١٩٣١ الأستاذ جوزيف سل Prof. Joseph Sell في ألمانيا (١)

وأشد الآلات حساسية في قياس الموجات دون الحمراء آلات كهربائية — هي الترمويل
والبولومتر والراديو ميكر ومتر — أساسها أنها تمتص الأشعة الحرارية فيغير التأثير الحراري
حالتها الكهربائية محدثاً تيارات كهربائية عادية . وكثيراً ما يقاس الآن الأشعاع الصادر من
أي نجم بغير واحدة من هذه الآلات . ويقول آرثر هاس إنه صار في الأمكان إدراك حرارة
لب الشمعة وهي على بعد مائة متر . والأغرب من هذا أن يدعي بعض الأميركيين أنهم يستطيعون
إدراك مقادير الحرارة الصغيرة جداً ، حتى الحرارة المنبعثة من شمعة واحدة وهي على بعد ألف

(١) اقرأ في الفوتوغرافيا الروحية كتاب « تصوير غير المنظور » مؤلفه جيمس كوتس James Coates وكتاب « تجارب في الروحية » مؤلفه واريك F.W. Warrick وقد ظهر هذا الكتاب في أواخر
سنة ١٩٣٩ وبه أكثر من ستمائة صورة فوتوغرافية إيضاحية وفي صدره كلمة قيمة كتبها سير أولفر لودج

ميل ١١١ وهذه الآلات ضرورية في التجارب التي ترمي إلى تمييز الأشعة دون الحمراء وترتيبها بحسب أطوالها الموجية المختلفة سواء جاءت من الشمس أو من أي مصدر آخر . أما المنشور الزجاجي الذي استعمله نيوتن في تحليل الضوء الشمسي فقليل الفائدة هنا ، ومن ثمّ تحمّ استعمال منشور من الكوارتز أو ملح الحجر . وأما عن الموجات الطويلة جداً فالتجارب مستعصية لأن هذه المواد نفسها ومنها الهواء تصير حاجبة لها فلا تنفذها . وقد استطاع الدكتور روبنز Dr. Rubens البرليني أن يجري أقيسة من هذا النوع سنة ١٨٩٦ ، وقد وجد أن الاشعاع المنبعث من شبكة المصباح الغازي ، أو من المصباح الزئبقي ، يشتمل على بعض موجات طولها جزء من مائة جزء من البوصة — أي قدر الطول الموجي للضوء الأحمر خمسمائة مرة . وهذه الموجات تكون عدمة النفع إذا انبثقت من مصدر يكون الفرض منه توليد الضوء فقط . ومن الغريب أنه لم يستكشف بعد مصباح تقتصر طاقته على الاضاءة فقط ، إذ الواقع أن جميع المصاييح تبدل أكبر جزء من طاقتها في إحداث إشعاع غير منظور . على أنه يوجد من الأضواء ضوء بالغ غاية الجودة في الواقع ، هو ضوء اليراعة الذي يُبذل من طاقته الكلية ما مقداره ٩٧ ٪ في صيغة ضوء منظور . وفي خير أنواع الضوء الكهربائي يصيح تسمعون في المائة على الأقل من الطاقة في إحداث حرارة . فاذا ما وصل أحد العلماء إلى اختراع « الضوء البارد » فانه لا شك مثير بعد فتر

وتصل بنا الخطوة التالية على سلم الأطوال الموجية إلى مجال جديد مختلف عن ذلك كل الاختلاف ، مع ملاحظة أن الموجات باقية كما هي من حيث طبيعتها الأصلية ، وكذلك سرعتها باقية كما هي ، ولكن تفاعلها الداخلي مع ذرات المادة وجزئياتها بخالف تفاعل الموجات الأخرى حتى ليتحمّ علينا استعمال آلات أخرى مختلفة جداً لأحداثها أولاً ثم التقاطها . وأقصر الموجات كما مرّ بنا سرية الذبذبة جداً بحيث أنها تطغى على المادة فتخرقها دون أن تحدث اضطراباً في ذراتها أو إلكتروناتها ، فلا تفقد هذه الموجات من ثمّ كثيراً من طاقتها . وأما الموجات الطويلة — من الموجات فوق البنفسجية إلى الموجات دون الحمراء — فتؤثر في الذرات والجزئيات المادية محدثة لونها وحرارة وصوراً في اللوحات الفوتوغرافية . أما الموجات التي نقصدها هنا فطويلة جداً لا تستطيع اهتزازاتها البطيئة أن تحدث اضطراباً في جزئيات المادة المترابطة المتلاصقة . ولكنها تستطيع أن تجمع الإلكترونات السائبة أثنى وجودها ، ثم تهزها كما تهز موجة الماء صفّاً من قطع الفلين الطافية . وبذلك تحدث تياراً كهربائياً ، لأن التيار ما هو إلا سيل من إلكترونات سائبة ، ولكنها لا تستطيع إحداث حرارة أو ضوء بشكل

محسوس . وتلك هي الموجات اللاسلكية . تنبأ بها سنة ١٨٦٦ كلارك مكسويل ، أكبر علماء الفيزياء الرياضيين في زمانه ، ثم عثر عليها بعد ذلك بعشرين سنة هنريك هرز Heinrich Hertz ولما كانت مركوبي وغيره قد استطاعوا تعميم استعمالها حتى صارت خواصها شائعة بين العامة والخاصة فأننا سنة تقرر على شرح بسيط لها

توجد في الحقيقة إلكترونات سائبة في كل فلز ، وحركة هذه الإلكترونات هي التيار الكهربائي العادي . ففي السلك الذي يتصل طرفاه بطارية كهربائية تنساب الإلكترونات باطراد في الجهة التي تريدها البطارية وتوجيها ، فإذا ما أخرجت البطارية من الدائرة المشتملة على هذا السلك تهتز الإلكترونات فترة قصيرة من الزمن ثم تسكن كما يهتز البندول ثم تتناقص حركته شيئاً فشيئاً إلى أن يسكن . وإذا ما زيد طول السلك ورتبت ملفاته الترتيب الملائم فإن زمن الذبذبات الالكترونية داخل السلك يزداد . ويحدث اضطراب كهربائي في الفضاء المحيط بالسلك مع كل تغير يحدث في حركة الإلكترونات . فهذه التغيرات المتتالية المتتابعة هي الموجة الكهربائية وتكون الموجة عديمة الفائدة لنا إذا لم نستطع إدراك تأثيرها في نقطة أخرى بعيدة . غير أن الموجة إذا ما غشيت فلزاً أثار ما بداخله من الإلكترونات فينشأ من ثم تيار ضعيف لا يمكن إدراكه والاتقاع به إلا بتوافر شرط واحد . فنحن نعلم أن إلكترونات الفلز ، وليكن سلكاً مثلاً ، لها بطبيعة الحال مدةذبذبة خاصة تتوقف على حجم السلك وشكله كما يتوقف زمن هزة البندول على طوله . فإذا كانت هذه المدة الطبيعية مضاهية بالضبط لمدة الموجة الكهربائية فإن الإلكترونات تكتسب على الفور الحركة من تلقاء نفسها وتبدأ رقصها وذلك هو الشرط اللازم للاستقبال ، أي أن المستقبل يجب أن يكون « متوافقاً » مع المرسل . ولتضرب لذلك مثلاً توضيحياً هو أن الشوكة الرنانة المهتزة ترغم شوكة أخرى قريبة منها على أن تهتز مثلها إذا كانت متحدة معها في النغمة . ونحن لا نجعل التيارات الكهربائية تتغير وقت العمل بتغير حجم الاسلاك وشكلها ، ولكننا نصل إلى ذلك بعملية أخرى تعادها وتزيد عنها سهولة وهي تغيير سعة الدائرة وتغيير ممانعة تأثيرها الذاتي كل على حدة

ومن حسن الحظ أن الإلكترونات صغيرة جداً وسائبة جداً في ذرات الفلز . وما كان للطاقة الصغيرة القدرة الموجودة في الموجة أن تدفع هذه الإلكترونات إلى الحركة لو كانت هذه الإلكترونات كبيرة الحجم . ولكنها في الواقع تتحرك بسرعة ، فتحدث تياراً يمكن إدراكه بالحلقات نومترات أو بالتلفونات . وقد أخفق هرز في إدراك هذه الموجات والتقاطها بهذه الطريقة عند بدء استكشافه لها ، لأن الذبذبات الطبيعية لهذه الموجات سريعة جداً فلا تستطيع تحريك الغشاء التلفوني . أما أصواتنا التي لا يتأثر التلفون إلا بها وحدها فهي اهتزازات تحدث

بضع مئات منها في الثانية الواحدة ، لا عدة ملايين كما هو الحال في الذبذبات الكهربية التي نحن بصدددها . فكيف الوصول إذن إلى سد هذه الفجوة التي تفصل ما بين الاثنين ؟ لقد وصلوا إلى ذلك بالطريقة الآتية : حسب أن تراوحات الموجة الكهربية تحدث بمعدل خمسة ملايين مرة في كل ثانية ، وأن كل موجة متممة لعشرة آلاف موجة جعلت قوتها تنكسر إلى النصف فينشأ من ثم خمسمائة موجة قوية في كل ثانية . وغشاء التلفون أو غشاء الأذن يستطيع أن يدرك هذا التردد المنخفض نسبياً ويستجيب له . وكلما كانت الذبذبة المقروضة أبطأ كانت الموجة « الحاملة » أوسع . ولكن بقيت بعد ذلك عقبة أخرى لا تزال قائمة ويجب نخطيها ، وهي أن الموجة تكون موجبة القوة ثم سالبة القوة على التبادل ، وتكون الشدة الإضافية المتباعدة للموجة المقروضة عديمة النفع إذا أبطلت القوة السالبة عمل القوة الموجبة . وإذن كان من الضروري إنقاص القوة السالبة أو محوها إن أمكن ، وهذه العملية هي المعروفة في اللاسلكي بعملية « تقويم » التيار المتبادل أي تحويله إلى تيار مستمر .

وينحصر فضل البلورة في اللاسلكي في أنها تعمل كقوّم جزئي للذبذبات التيار . والتوصيلة بين بلورة وأخرى أو بين بلورة وباحث حساسية ^(١) تسمح للالكترونات أن تسير بسهولة في اتجاه دون الآخر . ومن السهل قياس المقاومة التي تقاوم البلورة بها سير التيار الكهربائي ويكون التأثير الحادث عند ما ينعكس التيار واضحاً . ومن ثم كان من السهل جداً أن يدرك التلفون تغيرات الشدة الحادثة في الموجة الحاملة في صيغة موجة صوتية مسموعة ذات تردد منخفض ويؤدي الصمام في أبسط تطبيقاته إلى نفس النتيجة — أي السماح لتيار موجب بالمرور دون التيار السالب . وعمله سهل فهمه . فهو يتألف من سلك حراري متوهج وهارضة فلزية صغيرة موضوعين معاً في زجاجة مسدودة مفرغة أشد تفرغ . ويستطيع التيار في دائرة المستقبل أن يسري خلال الصمام محملاً على الالكترونات المنهمرة بين السلك الحراري والعارضة الفلزية وهو يسري فقط في جهة واحدة — لأن السلك الحراري الساخن ينفث إلكترونات سالبة ولا ينفث شيئاً من الوحدات الموجبة الساكنة وهي البروتونات . فلا يسري إذن إلا تيار سالب فقط من السلك الحراري إلى العارضة ، أما التيار الموجب فمستحيل حدوثه . ويرجع الفضل في الوصول إلى هذا الاستكشاف إلى الأستاذ فلنج Fleming اللندني ، وكان قد سماه الصمام التذبذبي عندما استكشفه سنة ١٩٠٥ . أما خواص البلورة المقومة فكان الدكتور دونودي Dr. Dunwoody أول من شرحها وفسر عملها ، وكان ذلك سنة ١٩٠٦

(١) باحث الحساسية أو « شارب القط » هو السلك الدقيق المستعمل للبحث عن النقاط الحساسة في بلورة التقويم ليستمد السلك منها التيار المقوم المعدل

ثم صار الصمام بعد ذلك أكثر فعّالاً أدخل فيه لي دي فورست Lee de Forrest النصب الثالث ونفني به السلك المنحكم grid وقد وضعه بين السلك الحراري والعارضة . وبهذه الأضافة أمكن استقبال الموجة اللاسلكية بالتلفون ، وعدا ذلك أمكن أن تزداد قوة التيار . على أن تراوحات القوة الكهربائية في دائرة المستقبل صغيرة جداً ، وهي توجه في الصمام إلى السلك المنحكم الذي يعمل كزناد لسيل الإلكترونات المنهمر من السلك الحراري إلى العارضة . ويلاحظ أن أي تأثير في السلك المنحكم مهما كان ضئيلاً يحدث اختلافاً عظيماً في التيار الرئيسي ، وبذلك تصير التمديلات الضعيفة في التيار المعطى للإشارة تراوحات كبيرة قوية في دائرة التلنوز ، وذلك عند ضبط الأجهزة بأحكام ودقة . ويمكن تشبيه إلكترونات الصمام بكرات فوق منضدة بليارد مائلة ، أما تغير القوة الكهربائية بالقرب من السلك المنحكم فيشبه تغير مقدار المنضدة فإن أنت أملت المنضدة قليلاً بعد ذلك انحدرت الكرات إلى أسفل ، وإن أنت رفعتها قليلاً أبطأت في سيرها أو وقفت عن السير . فالتغير الطفيف في السلك المنحكم يحدث تأثيراً كبيراً في التيار الرئيسي . وعلى هذا النمط يمكن تكبير التأثير الطفيف للموجة الصادرة من محطة تبعد آلاف الأميال فتحدث في التلفون أو في البوق أصواتاً مسموعة

بقيت نقطة واحدة وبها نتختم بحثنا في هذه الموجات الطويلة . ذلك أنها أطول جداً من الموجات التي بحثنا فيها أولاً . فقد يبلغ طول الموجة ميلاً أو يزيد ، كما أنه توجد موجات أخرى يبلغ طولها بضعة ياردات وتستعمل في بعض الأغراض ، وقد اشتغل هرتز بموجات طول الواحدة منها قدم أو قدمان . وأصغر الموجات التي من هذا النوع ، أي التي تحدث كهربائياً في جهة ما فتشعرها كهربائياً في جهة أخرى ، فيبلغ طولها جزءاً من مائة جزء من البوصة فقط . وهذه استكشفتها سنة ١٩٢٥ ماري ليفتسكي Marie Lewitsky في أحد معامل بتروغراد . ويلاحظ أنها تفصل ما بين الموجات الكهربائية وبين أطول الموجات دون الحمراء التي يمكن إدراكها

والموجة الطويلة أقل تأثيراً بالعوائق التي تعترضها في طريقها من الموجة القصيرة . وربما نكون قد لاحظنا ذلك في موجات الماء . ولنذكر أيضاً أن الموجات الصوتية تخضع للقاعدة نفسها ، وذلك لأننا نستطيع ونحن في جانب من المنزل أن نسمع الأنغام المنخفضة الدرجة الصادرة من جوقة موسيقية في الجانب الثاني منه أكثر وضوحاً من الأنغام المرتفعة الدرجة . وعلى ذلك فالموجة الكهربائية يمكنها أن تنفذ بسهولة حول حواف العائق المعترض سبيلها أكثر من موجة الضوء . إن حروف الظل في ضوء الشمس تبدو حادة قاطعة مع أن جزءاً طفيفاً من الضوء ينمر بالظل منطقة الظل . أما الموجة اللاسلكية فلا يوجد أظلمها حرف حاد

قاطع . ومن ثم لم يندعش مركوني حينما وجد أولى موجاته اللاسلكية انشئت بسهولة حول الأفق المنظور ، فأمكن استقبالها في محطة استقبال لا ترى محطة الإرسال . والمدعش مع ذلك أن تستطيع الموجات اللاسلكية الأحاطة بالكرة الأرضية ، وأن تظل كما هي ذات قوة عظيمة بعد أن تكون قد انتشرت ألوف الأميال

وتفسير ذلك أنه توجد مرآة عظيمة غير منظورة على بعد خمسين أو ستين ميلاً إلى أعلى في الهواء . فالوجة اللاسلكية تجول حول الأرض سائرة فيما يشبه روافاً أعدت لتبادل الحديث . فهي لا تنتشر خارجها فتبدد قوتها بتركها الأرض ثم سيرها مطلقة صوب الجو بل هي تنعكس ها بطة وتتركز بالقرب من سطح الأرض . وتكون هذه المرآة في هذا الارتفاع لا بالهواء المتمدد الأقل كثافة من هواء المناسيب المنخفضة فحسب ، بل بالهواء الذي هو أيضاً موصل للكهربائية . فالهواء كما قلنا سابقاً يتأين في الجهات المرتفعة ، وتتحل في الغالب جزئياته بالإشعاع الكوني ، أو بالإشعاع الشمسي ، فتوجد إذن بعض إلكترونات طاقية وبعض جزئيات مشحونة بالكهربائية الموجبة ، وغيرها مشحونة بالكهربائية السالبة . فتؤثر هذه الطبقة العليا من ثم في الموجات كما يؤثر السطح المصقول في الموجات الضوئية — أي يعكسها ولكن مع فارق هو ألا يكون الانعكاس تاماً ولا معيئاً . وتسمى هذه الطبقة طبقة هفيسيد نسبة إلى ممتكشفاها العلامة أولفر هفيسيد Oliver Heaviside الذي كان أول من تنبأ بوجودها (١) . وبلا حظ أنها غير ثابتة الارتفاع ، وذلك لأن الأيونات المنخفضة تعود فتتحد من جديد حينما تغرب الشمس ، ومن ثم ترتفع الطبقة وتكون حافتها أشد حدة . ويجري الليل ستاراً غير منظور أسفل هذه المرآة السماوية فتنعكس الاشارات البعيدة الرسالة بانتظام ، وبسمعها المنصتون واضحة بأجهزة استقبال إن كانت صوتية ، أو يراها الراؤون على بعد ظاهرة إن كانت ضوئية

(١) استكشفت طبقة أخرى غير هذه تعرف بطبقة أبلتون Appleton على بعد يتراوح من ٩٠ ميلاً إلى ٢٥٠ ميلاً فوق سطح الأرض

الفصل السابع

القوى الكائنة في داخل المادة

ان علم البولوجيا وعلم تكوين البلورات فضلا عن فتحهما أمامي مجالا أرق من مجالات المرفان والفكر قد وجها بحوثي وجهودي الى هدف أرق ويبدو لي ان الطبيعة والانسان يتناولان تفسير نفسيهما خلال مراتب تطورهما المعقدة . وعندي ان الانسان في معرفته الاشياء الطبيعية وما هي عليه على الاقل من تنوع عميق موطنه يجد خير أساس يسترشد به في معرفة نفسه ومعرفة الحياة

« فروبل »

أسهل عليك أن تحطم ساعتك وتترها قطعاً من أن تعيد بناءها ، إذ الهدم أسهل من البناء وكذلك كانت طريقة التحليل في العلم الحديث أسهل وأمضى سلاحاً في المهاجمة من طريقة التركيب . وإخال أن ذلك التحليل الذي حللنا به المادة قد ينجح إلى حد ما . أما العكس فأمر أخلف الظن وما زال يؤدي إلى فشل وخيبة . فكيف تتجمع الذرات إذن وتتماسك ؟ ليس أوفى في الرد على هذا السؤال من قول سير أولفر لودج Oliver Lodge في الجمعية العلمية البريطانية سنة ١٩٢٣ « إتنا لا نستطيع أن نعلم السبب الذي من أجله إذا أمسكنا بطرف عصا ورفعناه ارتفع الطرف الآخر »

لقد مررت بنا ثلاثة أنواع معروفة للقوة الجاذبة : الكهربائية والمغناطيسية والجاذبية . فالشحنان الكهربائيان المتضادان — إلكترون وبروتون مثلاً — تتجاذبان بقوة معينة يمكن حسابها . وأي جزئين من المادة يتجاذبان بقوة الجاذبية على النمط الذي قال به نيوتن تقريباً . كذلك تخضع قوة مجاذب مغناطيسين لقوانين بسيطة . أما الذرة — بروتوناتها وإلكتروناتها ، أي بالجزء الساكن منها والجزء الذي يدور حوله — تهذب بجوارتها بهذه القوى الجاذبة الثلاث جميعها وتكون القوة الكهربائية أشد هذه القوى وأكبرها . ومن الصعوبة بمكان أن تطبق القوانين الكهربائية البسيطة على اتحاد معقد مثل الذرة تتجمع فيه الشحنات الكهربائية المتباينة ولكن الاستاذ بورن Born وآخرون في ألمانيا قد أصابوا بعض النجاح في محاولاتهم الحديثة والينة على قوة التماسك بين جزيء وآخر ماثلة في مائة الأجسام الصلبة العادية . وكذلك

في ميل هذه الأجسام الى مقاومة أي تغيير في الشكل كما اعتدنا أن نفسه نيساً أو انضغاطاً ويكون التجاذب محسوساً مقيساً حتى في حالة ما إذا كانت الجسيمات في جسيمين صلبين مختلفين ونرى ذلك في حالة السطوحين الألمسين حينما « يماسكان » كما يقول المهندسون عند تماسك المكاس والتحامهما باسطوانتهما بسبب عدم ترليتها أو ترينتها كما يقولون . ونكتفي هنا بأن نقول إنه إذا وضع سطحان ألمسان جداً أحدهما من الزجاج والآخر من فلز ما فوق بعضهما فلهما يقاومان القوة الكبيرة التي تحاول فصلهما اذا حدث لهما هذا التماسك . ونحن لا نلاحظ قوة التماسك هذه في حالة السطوح العادية من أمثال صفحات الورق ، وذلك لأنها ليست تامة الملامسة ، ولأن سطححي الورقتين لا يكونان تامي التماس إلا في بضع نقط منها حيث تكون التجاذبات الذرية ذات أثر . أما في السوائل فوضوح هذه التجاذبات الصغيرة يكون على أتمه وإنما بشكل آخر ، وذلك في طريقة تجمع أي مقدار صغير من سائل ما من تلقاء نفسه على شكل نقطة . فقطرة الندى مستديرة ، أو هي قريبة من ذلك ، وهذا بسبب التجاذب السكاني بين أجزائها والذي يجمع هذه الأجزاء في أصغر حجم ممكن . ولعل أشد هذه القوى التجاذبية هي تلك التي تظهر في الميل السكماوي . فان اجتذاب ذرة كلور ذرة صوديوم مثلاً من الشدة بحيث يكون جزئي كلورور الصوديوم ، أي ملح الطعام ، الناتج من ذلك ثابتاً لا يتفعل . وقليلون منا رأوه يتفعل الى مكوناته . ولقد تكلمنا فيما مضى عن الاتحاد السكماوي من وجهة واحدة ، وهي مقاسمة الالكترونات الخارجية في كل ذرة . وما كانت هذه المقاسمة إلا مجموعة تجاذبات وتنافرات كهربائية تؤلف فيما بينها القوة المؤدية إلى الاتحاد . وإذن فلا يزال باقياً علينا أن نستكشف الطريقة المحككة المضبوطة التي على مقتضاها يتم هذا الاتحاد . وهم لم يصلوا بعد حتى إلى تفسير حالة احتياج أو تجاذب ذرتي إيدروجين في جزئيء الايدروجين ، أو اتحاد هاتين الذرتين مع ذرة أكسجين في جزئيء الماء

ولكننا من جهة أخرى نرى في السوائل بعض أهم نتائج القوى الجزئية . فجزئيات آية مادة أسيلت تتحرك بمرعة تكفي لفصم العرى المثينة التي كانت تربطها في مواقعها وهي في حالة الصلابة غير أن هذه السرعة لم تبلغ الحد الذي يمكنها من الانطلاق حرة مبتعدة عن الجزئيات المجاورة كما هو الحال في الغاز . إن أي جزئيء من جزئيات السائل في الحقيقة يستطيع أن يغير مكانه بسهولة ، ومن ثم لم يكن للسائل شكل معين ، ولسكن هذا الجزئيء لا يستطيع بسهولة أن يرتفع إلى سطح السائل ، وذلك لأن التجاذبات الواقعة عليه من الجزئيات المجاورة تكون غير موزعة حوله بالتساوي ، فترتد منعجباً إلى حيث هو . وبذلك يقاوم السائل أية زيادة في سطحه ، فيعمل دائماً لأن يكون له أقل سطح ممكن وتجمع قطرة المطر في ذلك كل التجاح ، لأن أصغر

سطح تكتسبه هو السطح السكري فهو أصغر الحجم سطحاً بالمقدار الواحد من المادة . ويبدو سطح السائل في العادة أفقيًا بسبب جاذبية الأرض فلا يظهر له تقوس . ولكن هناك استثناء لذلك نراه عند حافة السائل ، إذ المستاد أن يتجذب سطح السائل عند ملاقاته جوانب الأناء . وسبب ذلك جذب جزئيات الأناء الصلب لجزئيات السائل وتطفو الأبرة المطلية بالدهن فوق الماء فكأنما تملأ الماء طبقة تحمل الأبرة — ولا ينفرج في الغالب سطح الماء أسفل الأبرة ليلتصقها لأن ذلك الانفراج يحدث سطحاً جديداً للماء . وكذلك لا ينفذ الماء بسهولة من ثقب غراب مطلي بالدهن ، أو خلال ثقب للقاش غير المنفذ للماء وهو قاش أضيف الراتينج إلى خيوطه ، وذلك لنفس السبب . وتكون فقاعات الصابون مستديرة إذا هي فقعت فوق قصبة تدخين ، أما حينها تتكون الأغشية الصابونية فوق الأسلاك الملوية المفضولة فإنها تكتسب أشكالاً جميلة سببها . هذا التجمع الناجم عن القوى الجزيئية ، ويحدث هذا التجمع في الجزئيات لكي يكون السطح أصغر ما يمكن . وتسمى هذه الخاصية في السوائل « التوتر السطحي » وهي تكون قوية على غير المتعاد في الماء البارد ، وربما كان ذلك بسبب انحناء شكل الجزيء المائي . وحينها نريد سطحاً مائياً كبيراً ، كما في حالة غسل الديدن أو رش أوراق النبات ، نضيف قليلاً من الصابون بقصد تقليل « التوتر السطحي »

ولما كان الجزيء يجد صعوبة في الوصول إلى سطح السائل فيصعب عليه من باب أولى أن يغادر السطح كليةً . غير أن بعض الجزئيات تهرب بالفعل ، إذ يحدث لها أن تكتسب في لحظة ما أكثر من النصيب المخصص لها هي وزميلاتها من السرعة المشتركة ، فتغلب على القوى الجاذبة الصادرة عن الجزئيات الأخرى . والماء المتروك في جفنة يبخر كله في الوقت المناسب . ويلاحظ أيضاً أنه إذا كان السطح غير منبسط كأن كان مستديراً ، كما هو الحال في النقطة ، فإن الجزيء يستطيع الانقالات بسهولة ، لأنه توجد في هذا المنسوب جزئيات أقل عدداً فلا تستطيع جذبه إليها . وكما كان التقوس شديداً سهل على الجزيء الانقالات . وعلى ذلك فقطرة الماء الصغيرة جداً تبخر بسرعة كبيرة . وما كان يمكن لتقطرات الماء أن تتجمع أبداً لولا وجود نواة من مادة صلبة تتجمع حولها — كهواة من التراب مثلاً . ومن ثم كان الدخان والتراب حاملين على تكوين الضباب والطل ، فيزيدان في إقلاق راحة سكان المدن

أما إذا كان سطح الماء من الجهة الأخرى متقوساً إلى الداخل أي مقعراً ، فإن الجزيء لا يكون مطلق الحرية ، يعوق فراره قرب حيرانه الكثير عددهم فيقل التبخر من ثم . ويحدث مثل هذا السطح للماء إذا وضع في شق رفيع أو في أنبوبة شعرية ضيقة ، فيرتفع الماء عند الجوانب الصلبة وينخفض في الوسط . وهذا ما يوجب تهوية الملاءات والدثر بناية . فيعد اختفاء

الرطوبة من جدران الحجرة قد يستقر الماء في المسام الدقيقة الكائنة في منسوج الملاءة أو الدثار فيستلزم الأمر تدفقها طويلاً حتى يتبخر الماء منها . وفي أمثال هذه المسام أيضاً يتكاثف الماء بسهولة أكثر من تكاثفه فوق السطوح المنبسطة . ولقد استطاع لورد رالي Rayleigh ، وكان من أفذاذ العلماء عملاً وعملاً ، أن يحفظ معمله جافاً وذلك بأن يترك فيه بلابل دثاراً . فإذا جاء الصبح كان يعصر هذا الدثار فيخرج منه نحو نصف لتر من الماء الذي كان يصح أن يستقر على أجهزته . لولا أن مسام ذلك الدثار قد قدمت للماء مأوى أيسر اقتحاماً ، ومثل ذلك تعمل هذه القوى في فقاعات البخار الصغيرة بمجرد تكونها إلا إذا كانت هناك نواة أو ركن ترتكز فوقه . ولذلك توجد في المراجل وبعض الأباريق فراغ باطنية تساعد على الفليان ، إذ تمد البخار بمثل هذه الأركان ، وعدا هذا فالحواء المذاب يساعد على تكون الفقاعات . على أن الماء الذي سبق له أن غلي مرة يخلو من هذا الهواء المذاب فلا تتكون تلك الفقاعات الصغيرة بل تتكون فقاعات كبيرة تنفجر وتتلأهى مسببة ذلك النشيش المادي وهو صوت غليان الماء

وترش البرك التي يتولد فيها البومض يربت فبموت البومض ، وسبب ذلك هو التوتر السطحي ، فبرقات البومض تستطيع أن تنفخ بأن ترفع نفسها فتعلق بسطح الماء بواسطة ثلاث شميرات تتصل بقنوات التنفس عندها . فإذا ما وضع قليل من الزيت فوق سطح الماء انخفض التوتر السطحي ، وبذلك تقل قوة سطح الماء فتعجز هذه الشميرات عن أن ترفع البرقات إلى أعلى فلا تستطيع هذه أن تنفخ فتموت

ونستطيع أن تبين بسهولة في سطح الماء القوى التي تدفع الجزيئات إلى أن تهاكس أما في باطن السائل فتأثيراتها لا يمكن مشاهدتها ولا قياسها بنفس السهولة . ومن نتائج هذه التأثيرات أن أي مجهود يبذل لتغيير المسافات بين الجزيئات تقاومه قوة كبيرة جداً . وقد حاول سير فرانسيس بكون Sir Francis Bacon أن يعمل ذلك في القرن السادس عشر ، فلما كره جوعاً من الرصاص بالماء ، ثم جعل يطارقها طرفاً شديداً بمطرقة ، فأدهشه أنه لم يستطع أن يحدث فيها إلا انضغاطاً ضئيلاً جداً يكاد لا يدرك له أثر . ونراه يقول «عندما أخفق الطرق في أن يجعل الماء ينكش استعملت ضاغطة حتى ضاق الماء ذرعاً بالضغط فتفجر من الرصاص كالندى » وفي الحقيقة إن الماء لكي ينكش بمقدار واحد في المائة يحتاج إلى ضغط يزيد عن الطن لكل بوصة مربعة من سطحه . وكذلك يحتاج لمثل هذه القوى لفصل الجزيئات عن بعضها في بعض الأحيان ، ويظهر ذلك على أتمه في تجربة ابتدعها ورثنجتون Worthington لاثبات ذلك . فجاء بأنوبة مغلقة وبها ماء ملاً جزءاً منها ، ثم ثبت أحد طرفيها وأدارها ، يريد أن يجذب الماء حتى يدرك طرفها الآخر شأنه في ذلك شأن الحجر في المقلاع إذا أدير المقلاع شد الحجر

حبله واستمرَّ بجواراً نهاية الحبل . ولكن الماء قاوم هذه القوة ، وظلَّ بجواراً مركز الحركة . وحتى إذا كانت قوة الدوران سريعة بحيث تعدل قوتها المركزية الطاردة مائة باوند على كل بوصة مربعة من سطح الماء فإن الجزئيات تعلق ببعضها من جهة ثم بطرف الأنبوبة الزجاجية من جهة أخرى بوساطة تلك القوى الشديدة السكائبة بين الجزئيات . وعلى ذلك فالمثل القائل « أوهي من الماء » إنما يشير الى السائل في مجموعه

وللاحظ أن تلك الأرقام التي ذكرناها في تقدير القوى الجزيئية مبنية على أقيسة مختلفة الأنواع . ولكن أبسط هذه الأقيسة هي تلك المتعلقة بمقدار الحرارة اللازمة لتصعيد سائل . فالسوائل كلها تحتاج إلى حرارة لكي تغلي ، إذ لا بد أن تفصل جزئيات السائل لكي يتحول إلى غاز ، أما القوى المجمعة لهذه الجزئيات فيمكن تقديرها من الطاقة اللازمة للتغلب عليها . وفي حالة الماء يبدو أن هناك ضغطاً داخلياً يمدد الضغط الجوي ألوف المرات

وهذه القوى العظيمة نفسها توجد في داخل الجسم الصلب أيضاً ، ولكن متانة الجسم الصلب من الوجهة العملية أقل مما تشير إليه هذه الأرقام ، وذلك لأنه يوجد دائماً سطح خارجي للجسم الصلب يتألف من شقوق وفتحات صغيرة رقيقة هي السبب في إضعافه كله . ففي حالة الحديد الصلب مثلاً تكون قوة التماسك الداخلية أربعة ملايين باوند لكل بوصة مربعة ، في حين أن النهاية العظمى لقوة الحبل أقل من ذلك مائتي مرة وذلك من جراء الضعف السطحي الذي لا بد منه . أما الحبلط الرفيع المصنوع من الرمل المنصهر فله سطح في غاية الملاسة ، ويستطيع أن يحمل ثقلاً كبيراً دون أن ينقطع ، ومع ذلك فإن أقل لمس لسطحه يحدث فيه كشطاً أو سحجاً يضعفه فلا يقوى على حمل أي ثقل مهما كان صغيراً



الفصل الثامن

بناء البلورات

(عن آلة الاول-التلاووظ-لعمل محزوزات الحيود (١) الضوئي)
أصل أخيراً الى اعتبار ان هذه الآلة شخصية تكاد تكون مؤنثة
فهي من ثم تستلزم الملاحظة والمداراة والمصانة والتهديد أيضاً
ولكننا سنتبين في النهاية أنها شخصية لاعب حذر حريص ماهر
يشارك في لعب معقد مشكل ولكنه خلّاب ، لاعب يستفيد على
الفور من غلطات خصمه فيفاجئه بأروع ما يحيط به خطته وتدبيره ، ولا
يترك شيئاً للتهمة لجرد الصدفة . وهو مع ذلك لاعب عادل دقيق لا يجيد
قيد شعرة عن قوانين اللعب التي يحقق معرفتها ولا يقتصر لك جهلك
بها . فان أنت عرفت ما ورعيتها ومرت في اللعب على مقتضاها اتقضى
اللاعب على غير ما يجب أن يكون «ميككن»

ظهر في علم الفيزياء قبل الحرب العظمى مباشرة فصل جديد شيق للغاية ، وذلك على أثر
كشف الدكتور لاو Dr. Laue وكشف سير ولهم براج Sir W. Bragg وولده
الأستاذ لورنس براج Prof. Lawrence Bragg في سنتي ١٩١٢م و١٩١٣ . وهذا
الفصل يتعلق بأسرار الطبيعة الخاصة بتجمع الذرات وتماصها لأحداث أشكال البلورات الجلية
المنتظمة . والذين رأوا بلورات الثلج المتساقط في يوم ممطر أعجبوا بها ، وكثيراً ما رأينا
بلورات تامة التماثل ذات أوجه ملساء تميزها عن سائر الأشياء الطبيعية الأخرى الخشنة الملمس .
وربما نكون قد حددنا صادقين أن الذرات لابد أن تكون معبأة داخل كل بلورة بشكل ما منظم ،
إلى أن كان التحليل الحديث لهذا النوع من البناء فأرانا كشفاً علمياً طلياً شيقاً حقق هذا

(١) أظهر جريمالدي Grimaldi سنة ١٦٦٥ أن الضوء الداخل في حجرة مظلمة خلال شق ضيق
جداً جداً يمكن أن ينتشر في جميع الجهات ، أي أنه بعبارة أخرى ينتفي حول الاركان . فسمي انتشار
الضوء على هذا النمط «الحيود الضوئي» .

الحديد . ومضى العمل قدماً في ذلك السبيل ، مضيه في حالات الكشف العامة الأخرى ، يحوطه تعاون دولي ناجح فكان النجاح حليفه

وقد أفضت البلورة بسرهما لأن عاملاً جديداً قد استخدم في مغالبتها . وما كان هذا العامل شيئاً غير أشعة إكس . فهذه الأشعة تستطيع أن تخترق معظم البلورات بقاية السهولة ، ووصل الدكتور لاو في خصه البلورات بهذه الأشعة إلى أن الشماع إذا دخل في بلورة انشق وتجزأ فإذا دخلت حزمة من أشعة إكس ، كحزمة الضوء العادي الرفيعة ، في بلورة فإنها تخرج منها وقد ضعفت ضعفاً واضحاً يندأ ، وصحبها عدة حزم أضعف منها تنفرع بزوايا خاصة كالأشعة التي تنعكس من حجر كثير الأوجه . وتكون الصور الفوتوغرافية المأخوذة باستعمال هذه الحزم الحائذة جميلة جداً في الغالب ، وذلك من جراء ترتيبها المتماثل . غير أن لقد هذه الحزم واختلاطها يجعل من الصعب جداً تأويل الصورة وتفسيرها . ولكن الصورة مع ذلك تحمل في طياتها مفتاح البناء البلوري . وقد أدى البحث الدقيق المجهد المتأني إلى النجاح المرجو في معظم الحالات

على أن القاعدة التي ينطوي تحها شق شماع إكس وتجزئته تنطبق على جميع أنواع الموجات الأثيرية . وبالرجوع إلى الضوء المنظور تجد ما يفسر لنا ذلك بقاية الوضوح . فإذا نحن وجهنا نواظرنا صوب ضوء شديد بعيد ونظرنا إليه من خلال منديل رأينا الضوء قد أحيط بمدة أضواء أخرى ملونة ضعيفة . وكلما كانت عيون المنديل دقيقة وكان الضوء أصغر في الحجم وأكثر لمعاً كانت هذه الأضواء أكثر وضوحاً . فكل حزمة حائذة تكون لوناً . وتختلط الأضواء إذا كان الضوء الأصلي كبيراً لأن كل حزمة حائذة تكون في اتساع الحزمة الأصلية . وتجد لذلك مثلاً في الأسطورة الانجليزية الرفيعة القديمة القائلة بأن نظرة واحدة إلى القمر من خلال منديل تكشف للحسناء عن عدد السنين التي تمضي عليها قبل أن تزوج . فكيف تكونت إذن هذه الصور وتلك الأضواء ؟ الجواب أنه عندما تصل الموجة إلى مجموعة الفتحات الموجودة في نسج المنديل تصير كل واحدة منها نقطة ابتداء لجزء من الموجة في الجانب الثاني للمنديل . فننتقل هذه الموجات إلى الأمام ، وزى الضوء مباشرة خلال الفتحة . ولكن كل موجة تنتشر أيضاً بقوة أقل على شكل دوائر كما يعمل الموج في سطح الماء . فنقطع الموجات بعضها بعضاً ، وتكون كل نقطة عرضة للتأثر بكل واحدة من هذه الموجات المتقاطعة . ولما كانت بعض الموجات تبدأ من الفتحات القريبة وبعضها من الفتحات البعيدة فهي لن تصل كلها معاً في وقت واحد . فإذا اختلطت خطوة أية موجة بخطوة الموجة التي تليها ، بأن كانت إحدى الموجات في القمة والتي تليها في القرار ، محاً تأثير إحداها تأثير الأخرى وتلاشت الموجتان . وفي بعض النقط تحتفظ

الموجات كل الاحتفاظ بخطاها — ويتوقف هذا على الزاوية التي تصنعها الموجات مع خط التفتحات — فتستطبق القيم كلها على بعضها ويكون لذلك أثر محسوس . ففي هذه النقط وليس في غيرها ، تتكون حزم ضيقة من الضوء ، وواضح أن المسافة بين الفتحات وطول الموجة هما أهم مقدارين يحتاج إليهما عند حساب أي النقط هي التي احتفظت بخطاها وأياً ترك في ظلام دامس بسبب تداخل الموجات المتبادل ، فإذا كانت الموجة مختلطة أي متألقة كالضوء الأبيض من عدة ألوان فستدثر يرى لون عند بعض النقط ولون آخر عند نقط أخرى ، وهذا يتوقف بالطبع على الأطوال الموجية المختلفة المقابلة للألوان المختلفة . وهذا هو السبب في أن الصور المرئية من خلال المنديل حول الضوء الأبيض تكون ملونة . وهو أيضاً أحد أسباب رؤيتنا خطوطاً ذات ألوان زاهية من الضوء عندما تنظر إلى الشمس من خلال أهدابنا

هذه التجربة البسيطة خير وسيلة لقياس طول الموجة الضوئية . وكل ما يحتاج إليه فيها قطعة من الشاس وضوء بعيد . وليلاحظ أن عرض الفتحات يمكن إنقاظه بمجرد إمالة الشاش أي إمالة طفيفة . وقد أمكن بهذه التجربة إيجاد حجم الجسم المضيء إذا كان الطول الموجي معلوماً ، فيمكن إيجاد حجم القمر مثلاً باستعمال نظارة ميدان وقطعة من الشاش أو مشط صغير من أمشاط الجليب . فإذا أريد فصل الصور الملونة فصلاً تاماً عن الحزمة المستقيمة بحيث يصبح في الأماكن إجراء أقيسة مضبوطة ، فإن فتحات الشاش أو المنديل يجب أن تستبدل بفتحات أضيق يمكن الحصول على خير أنواعها بتخطيط لوح من الزجاج خطوطاً متوازية بقطعة حادة من الماس . وتعرف ألواح الزجاج التي من هذا النوع بعد تخطيطها باسم « محزوزات الحيود » ويجب أن يعنى عناية شديدة في صناعة هذه المحزوزات لأنها تساعد على معرفة أطوال الموجات الضوئية بالضبط . ومعرفة أطوال هذه الموجات ذات قيمة لا تقدر في بحوث التحليل الطيفي . ولقد أثقن الأستاذ رولاند Rowland الشيكاجي ، وهو من أكبر علماء الفيزيكا الذين أبحثتهم الولايات المتحدة ، صناعة هذا التخطيط . فقد استطاع بصره العجيب الممجز أن يخترع آلة لولب في إمكانها أن تخطط ٢٠٠٠ خط في فضاء مسطح عرضه بوصة ، وقد خطط فعلاً بهذا الشكل ست بوصات تخطيطاً متقناً كل الاتقان استغرق في إنجازها خمسة أيام وخمس ليالٍ ، وكان ذلك سنة ١٨٨٩ . ولا تزال محزوزاته هذه موضع إعجاب الفيزيقيين في جميع أنحاء العالم ، وهم لا يستعملون غيرها

ولكن طول موجة شعاع إكس أقصر ألف مرة من طول الموجة الضوئية ، وحجمها يقرب إذن من حجم الذرة ، ومن ثم استحال تخطيط « محزوز حيود » تكون الخطوط فيه متقاربة بهذا القدر . غير أن الدكتور لاو قد تغلب على هذه العقبة حيث هداه عقله إلى فكرة كانت

السبب في رفع ذكره بين العلماء وهي : إن الطبيعة تبنى الذرات في خطوطوط وطبقات منتظمة ، وهذه يمكنها أن تعمل عمل محزوزات حيود أدق كثيراً من أي محزوزات يستطيع الإنسان عملها بأية آلة . وإذن فكل بلورة محزوز حيود قائم بذاته ، وعدا هذا فإن حيوجم الذرات والمسافات التي تفصل ما بينها تالأم كل الملاءمة قياس الأطوال الموجية لأشعة إكس

ويلاحظ أن الذرات في البلورات ليست مع ذلك مرتبة في مجرد خطوط مستقيمة ، بل هي مرتبة بانتظام على شكل نماذج لها طول وعرض وعمق ، ومن ثم كان في كل نموذج مجموعات كثيرة لمستقيمات متوازية أو سطوح متوازية . ويمكن تشبيه البلورة بجدقة نسقت فيها الأشجار صفوفاً : فإذا ما مرنا بهذه الجدقة راكبين قطاراً بدت لنا الأشجار وهي ترتب نفسها في خطوط مستقيمة في اتجاه ما ، فإذا ما تغير اتجاه نظرنا إليها بدت مرتبة في اتجاه آخر وهكذا ، وغالباً ما تكون الاتجاهات المختلفة في البلورة أربعة أو خمسة فيجد شعاع إكس ذرات وفتحات منظمة في اتجاهات كثيرة مختلفة في داخل البلورة ، فتوجد من ثم حزم كثيرة « حادثة » منبثقة في جملة اتجاهات في الجانب الآخر . وتكون المهمة الشاقة التي تواجه فاحص البلورة بشعاع إكس أن يجد صف الذرات أو مستوياتها المحدث لكل حزمة رآها وقاسها ، فيستطيع بعدئذ أن يرسم صورة كاملة للترتيب الذري داخل البلورة . إن شعاع إكس كشاف يبعث به الباحث إلى البلورة ليجلوها ، وواجب الباحث إذن أن يفسر لنا رسالة ذلك الكشاف . هذا الشعاع يحدث الباحث بأن الذرات تباعد بعضها عن بعض في اتجاه ما بمسافة ما ، وبمسافة أخرى في اتجاه آخر وهكذا . فعلى الباحث إذن أن يتخيل توزيع الذرات الذي على مقتضاه تتكون أشكال البلورات


إن النموذج البلوري مبني كله من جملة وحدات متشابهة متطابقة ، وهو أشبه شيء بالورق الذي يلصق فوق الجدران . فهذا الورق يتألف عادة من بضع رسوم أو خطوط بسيطة تتكرر بانتظام . وتكون وحدة البناء هذه في أبسط الحالات مكعباً له في كل ركن ذرة ، فإذا ما تكرر وجود هذا المكعب في جميع الجهات والحواوب مثل لنا بناء البلورة بأكملها . وفي الغالب توجد ذرة في وسط كل وجه في المكعب المتخذ وحدة ، أما إذا اشتملت المادة على أكثر من نوع واحد من الذرات كانت الترتيبات الممكنة كثيرة ومختلفة . ويصح توضيح ذلك بمثلين بسيطين هما كلورور الصوديوم (ملح الطعام) وكلورور البوتاسيوم . فوحدة البناء في كل من هذين على شكل مكعب ويصح استنتاج ذلك من أن شكل البلورة نفسها مكعب نستطيع أن نراه بسهولة بمدسة مكبرة . ويوجد في كل مكعب ذرة كلور عند كل من أركانه ، وفي وسط كل وجه من أوجهه ، وتوجد ذرة صوديوم (أو بوتاسيوم) في منتصف كل حرف وعند مركز المكعب .

ومن هذا النموذج البسيط تعرف جميع خواص الملح ، فكتافته وقابليته للذوبان وشفافيته وقابليته للاضيق ودرجة انصهاره — هذه كلها صار يمكن استنتاجها من هذا البناء البسيط ، ولا يزال علماء الفيزيكا إلى يومنا هذا سائرين في انجاز هذا الشق من البحث وإكمالهم يسعون فيه على مهل ويرجع الفضل في تفسير الخواص البلورية الشهيرة تفسيراً مرضياً لأشعة إكس إذ بها أمكن تحليل البلورة من وجهة البناء . فأشكال بلورات الجليد والتنجع المكونة من زوايا كل منها ستون درجة نتيجة مباشرة لترتيب ذرات الايدروجين والاكسجين . كذلك انضح سبب وجود الكربون في غير صبغة واحدة كالماس والجرافيت . أما وحدة البناء البلورية في البلورات الكربونية فشكلها هو الجسم ذو الأوجه الأربعة والأركان الأربعة أي الهرم الثلاثي . ولذا كانت تعبئة هذه الأشكال أشبه شيء بمجموعة صفائح من الحديد المضلع وضعت فوق بعضها ، ويوجد فرق عظيم بين صيغتي الكربون المذكورتين ، لأنه في حالة الماس تنطبق التجميعات على بعضها مؤلفة بذلك مجموعة قوية جداً . ومعلوم أن الماس أصعب مادة عنصرية عرفت . في حين أن هذه التجميعات أو الصفائح المترجعة تتباعد في الجرافيت ، فيكون التجاذب بين الصفائح المتجاورة أضعف كثيراً منه في حالة الماس ، وبذلك يصح أن نتراق فوق بعضها . ولهذا كان الجرافيت من أحسن المزقات

وفي النوع العظيم مركبات الكربون — وهي المركبات التي تؤلف فيما بينها الكيمياء العضوية — نجد مادة خصبة لهذا السلاح الجديد ونقصد به تحليل البلورات بأشعة إكس . ففي كثير من الحالات استطاع الكيميائي أن يستنتج ترتيب الذرات من التفاعلات الكيميائية ، وقد حققت التجارب الحديثة صحة هذه الاستنتاجات . بل لقد انكشف وظهر ذلك الترتيب القوي المتين السكائن بين ذرات الكربون الستة في حلقة كيكولي ^(١) Kekulé البنزينة ، وتحقق وجود تلك السلاسل والأغلال الطويلة التي تربط ما بين الكربون والذرات الأخرى

(١) الشكل ذرة من ذرات الكربون في المركبات العضوية أربع أيد مبسوطة تمسك كل منها بذرة ايدروجين أو بذرة كربون أخرى . فلما حاول الكيميائيون تطبيق ذلك في حالة البنزين الذي قانونه C_6H_6 أخفقوا تماماً . ولكن العالم الألماني كيكولي قد حل هذا اللغز إذ قال بأن ذرات الكربون الست تكون فيما بينها حلقة تبسط فيها كل ذرة بداً إلى ذرة ويدين إلى أخرى ، بينما ذرات الايدروجين الست تمسك بالأيدي الخارجية كما

في الشكل



في جزيئات الأحماض الدهنية . ومن الشئ الذي له دلالة ملاحظة أن جذب هذه الجزيئات الطويلة الحقيقية للجسيمات الدقيقة الأخرى يكون عند أطرافها أكبر منه عند جوانبها . وعلى ذلك فحينما توضع نقطة من حامض دهني فوق سطح الماء تنفج الجزيئات على أطرافها . ويغطي غشاء الزيت الماء كما يغطي الزغب قطعة من منسوج زغي ، أي تكون الجزيئات الطويلة واقفة جنباً لجنب فوق السطح

أما حجم الفجوة الواحدة في البلورة — ونقصد بالفجوة الترفية ما بين ذرة وأخرى — فأكبر قليلاً من حجم الذرات نفسها . فإذا ما صورنا الذرات كرات صغيرة بدت متماسة في بلورات كثيرة . ويصح أن نشبه البلورة بكومة من الخردق المستدير ، فإذا ما عبئت الكرات متقاربة بقدر الأمكان مثلت نظاماً ما من الترتيب الذري ، كذرات الكربون في الماس مثلاً . أما الأنظمة الأخرى فهي نتيجة التعبئة السائبة . وقد وجدت الذرات في بلورات الثلج مرتبة تفصل ما بينها مسافات واسعة ، مكوّنة شبه بناء هيكلي دقيق يفسر لناخفة الثلج والمظهر الزغي لبلوراته . ويجب مع ذلك أن نذكر أن الذرات لا يمكن أن يكون لها سطوح مستديرة جامدة يابسة . وما تمثلها بالكرات إلا مجرد تشبيه يقرّبها الى الدهن

الفصل التاسع

الطاقة

ما أشبه النظريين بالنائب تفزل نسيجها من نفس جسمها ، وما أشبه
التجريبيين بالنمل يجمع الحامات دون انتخاب ويخزنها دون تعديل أما
العلميون الصادقون فما أشبههم بالنحل يجمع الرحيق ثم يخرج به أروياً شيئاً
« فرانسيس بيكون »

ترجع خواص المادة إلى قواها وحرركاتها الداخلية بقدر ما ترجع إلى وحدات بنائها
الحقيقية ولا يكفي أن نعرف كم بروتوناً وكم إلكتروناتاً توجد في مادة ما أو كيف تترتب فيها ،
بل يجب أن نعرف القوى التي تسيطر عليها والسرعات التي تتحرك بها قبل أن نستطيع الوقوف
على أسرار مادة السكون الكثيرة التنوع . فاما الأثير فأهميته كلها محصورة في القوى المتغيرة
التي يديها ، وأما خواص الأثير الساكن - إن كان هناك أثير ساكن - فنحن لا نعلم عنها شيئاً
البتة لذلك نحتم علينا أن نلحق بحثنا في المادة والأثير ببحث فكرة « الطاقة » التي لم تنضج
قوانينها ولا طبيعتها تماماً إلا في القرن التاسع عشر ، والتي ما زلنا تأكد يوماً بعد آخر من
أنها ذات أثر جوهري في الفلسفة الطبيعية

وأول ما يجدر بنا معرفته عن الطاقة أنها إحدى خواص الأثير والمادة ، وأنها تقيس
وتقاس وتغير صيغتها ولكن دون أن يتغير مقدارها على الإطلاق . وهي ذات صور كثيرة ،
وكثير من هذه الصور معروف لنا لأنها نشتره بالمال - نعم نحن نشترى الطاقة الكهربائية ،
والطاقة الضوئية الحرارية ، والطاقة الكيميائية للقمح أو الغاز أو الطعام ، والطاقة الميكانيكية
أو الطاقة الحيوانية التي نستخدمها في رفع الأثقال أو في جر الأحمال . ولقد مضى زمن طويل
قبل أن نستكشف القواعد البسيطة الخاصة بقياس أنواع الطاقة المختلفة هذه جميعها ، وسرى فينا
سيجيء أن هذه القواعد في الحقيقة والواقع بسيطة . فطاقة القطار المتحرك أو طاقة القذيفة
المسلسلة تعين بضرب مربع السرعة في نصف الكتلة . وتعين الطاقة اللازمة لتعلي الماء في إبريق
بضرب كتلة الماء في عدد درجات الحرارة التي زادها . وطاقة مسقط ماء النهر تعين بضرب
وزن الماء في ارتفاع المسقط ، وتقاس طاقة القمح أو الطعام الكيميائية بمقدار ما ينفقه كل منها

من الحرارة إذا احترق، وكذلك يمكن قياس طاقة الشمس عن طريق تأثيرها الحراري. والوحدة الانجليزية المستعملة في جميع هذه الأقيسة هي البوند — قدم، أي الطاقة أو الشغل اللاتين الرفع ثقل قدره باوند واحد إلى ارتفاع قدره قدم واحد. أما الوحدة العلمية العامة فهي الأرج erg وهي التي ترفع ثقلاً قدره مليجرام واحد تقريباً إلى ارتفاع قدره سنتيمتر واحد، وتوجد وحدات أخرى كالسعر والوات Watt والثرم therm وكلها يمكن التعبير عنها بما يكافئها من الباونديات قدم أو من الأرجات

واستكشف الفيزيقيون أن صيغ الطاقة هذه قابلة للتغير والتحول، وكان هذا الاستكشاف نتيجة عمل كثيرين في مقدمتهم العلامة وليام برسكوت جول W. Prescott Joule فقد كانت بحاربه الدقيقة أول رعان عملي واضح مفهوم على صحة القانون الشهير المعروف باسم قانون بقاء الطاقة. وكان قد بنى تجربته على تحريك طارة في الماء باسقاط أثقال عليها بواسطة حبال وبكرات، فوجد أن الماء قد سخن بما يتناسب بالضبط مع الشغل اللازم لرفع الأثقال ثانية. وبذلك يكون في تجربته هذه قد أحال الطاقة الميكانيكية طاقة حرارية، وكان مقدار الطاقة واحداً في الحالتين. هذه التجربة التي وصفناها بهذه البساطة تجربة صعبة في الحقيقة استغرق إنجازها سنين كثيرة، وتظهر صعوبتها في أن بعض الطاقة يستحيل حرارة بسبب احتكاك البكرات، وبعضها يستنفد في إحداث صوت وذلك عندما تلطم الأثقال الطارة، وبعض الطاقة الحرارية قد يستنفد في تسخين هواء الحجارة، وهلم جرا. وإشتمل حساب الطاقة على هذه البنود كلها وكان دقيقاً متوازناً بالضبط لأن كل جزء من الطاقة الميكانيكية قد حسب بفاية الدقة وكان البحث في هذا الصدد فضلاً عن الناحية العلمية البحتة، أحد نماذج الصناعة الدقيقة، ويرجع الفضل فيه كله إلى العلامة جول. على أن هناك علماء سبقوه في الوصول إلى ما وصل إليه، فخص منهم بالذكر الكونت رمفورد Rumford الأميركي سنة ١٧٩٦ والدكتور ماير Dr. Mayer الألماني سنة ١٨٤٠. ثم تبع جول آخرون أعادوا هذه التجارب بدقة فائقة وتوسعوا فيها، ولكن عمل جول في السنين ١٨٤٥ — ١٨٧٠ ظل المحور والأساس

والآن فلنتقارن بين صيغ الطاقة المختلفة مقدرة بأحدث وحدات الطاقة وهو الثرم المعروف لدى كثيرين منا بأنه مقياس الطاقة الجديدة المتبع في أعمال الإضاءة والتسخين بوساطة غاز الاستسباح العادي. وهو يساوي مقدار الطاقة الحرارية التي ترفع درجة حرارة ألف باوند من الماء مائة درجة على مقياس فهرنهايت. فهو إذن يساوي الوحدة الحرارية البريطانية مائة ألف مرة ويساوي السعر خمسة وعشرين مليون مرة، ويبلغ ثمنه في بعض الجهات (مستخرجاً من حرق الغاز) عشر بنسات أي حوالي أربعة قروش. ويحصل عليه كحرارة بحرق ما يقرب

من ستة باوندات من الفحم المتوسط الجودة الذي ثمن الطن منه ثلاثون شلنًا، ويكون ثمنه في هذه الحالة هو ثمن باوندات الفحم هذه أي بنس واحد تقريباً أو حوالي أربعة ملهمات. أما عن طريق الطاقة الكهربائية فالثمن يمدل خمساً وعشرين وحدة من الوحدات التجارية (كيلوات - ساعة) و ثمن الوحدة بنسان فيكون ثمنه خمسين بنساً أي حوالي عشرين قرشاً. ولكن حالون البترول يمدنا بنفس هذا المئدار من الطاقة تقريباً بثلث هذا الثمن. وإذا نحن عطفنا على الوقود اللازم للجسم الإنسان فالقيمة الحرارية للخبز تقدر عن طريق عدد الأرغفة ذات الوزن المعين التي تمد الجسم بثرم واحد، وقد وجد أن ثمانية أرغفة من ذات الباوندين وزناً تمد الجسم بهذا القدر، يقابلها ثمانية باوندات من اللحم أو خمسة من الزبدة لمد الجسم بثرم واحد. أما الطاقة الكائنة في موجات الضوء أو الصوت فضئيلة جداً، ولقد ذكرنا فيما مضى أن كثيراً من طاقة المصباح الكهربائي تضيع على شكل حرارة. فمصباح البخار الزيتي الكثيف يبعث في الثانية الواحدة ٤٠ مليون إرج من الضوء المنظور، وهذا يمدل سراً واحداً، في حين أن التيار الكهربائي الذي تكون شدته ٣ أمبيرات والذي ينتج من ضغط قدره ٢٤٠ فولطاً يستهلك ما يقرب من ١٨٠ سراً في الثانية. أما الموجات الصوتية فهي على نقيض ذلك أكثر الموجات اقتصاداً للطاقة وهذا لأن الأذن جهاز استقبال ذو حساسية مدهشة. فهي تستطيع أن تدرك موجة (تردها في الثانية ٨٠٠ ذبذبة) ينبثق منها في الثانية من الطاقة جزء واحد فقط من أربعة بلايين جزء من السعر. فلو استخدمت إذن طاقة مصباح كهربائي واحد في إحداث صوت لسمعت جلبة هذا الصوت على بعد مائة ميل. ويستطيع الثرم الواحد أن يمدنا بهذا القدر فيحفظ المصباح مشتملاً ما يقرب من أربعين ساعة. أما الطاقة الموجودة في أشعة الشمس الشديدة ف عظيمة، وحرارتها مستمدة من الموجات الضوئية المنظورة والموجات غير المنظورة معاً، ويمكن الحصول عليها بمدل قدرة حصان لكل ثلاثة أقدام مربعة - وهذا يكفي لصهر طبقة من الثلج سمكها نصف بوصة في اليوم. وتمد أشعة الشمس الشديدة كل مربع ضلعه عشرة أقدام في كل عشر ساعات بثرم واحد، وهذا يكلف حوالي أربعة قروش إذا كان مصدره حرق الغاز كما قلنا. وهناك طاقة قل أن ينتفع بها كطاقة ومضة البرق التي لو قسناها على أساس أنب شدة التيار الكهربائي الساري فيها ٢٠٠٠ أمبير، وأن زمنه وهو زمن الومضة جزء من مائة جزء من الثانية، وأن ضغطه مليون فولط، لعادلت ٢٢٠ ثرمًا. وعلى ذلك يكون ثمن الومضة على أساس هذا التقدير أربعين جنباً

بقيت لدينا الصيغة الأكثر شيوعاً وهي الطاقة الميكانيكية. ويدل الحساب البسيط على أن

الثرم الحراري يعدل طاقة الحركة لقطار زنته ثلثمائة طن وسرعته ستون ميلاً في الساعة، ويعدل طاقة الجاذبية لماء زنته ثلثمائة طن يسقط من ارتفاع قدره مائتا قدم . وأخيراً إذا نحن قدّرنا أن قدرة الجواد تساوي نصف « قدرة الحصان » المعروفة في كتب الميكانيكا فإن الثرم يمثل شغل ذلك الجواد مدة خمس وثلاثين ساعة دون انقطاع

وسبب هذه الفروق الغريبة في أثمان الطاقة وهي في مختلف صورها تلك راجع إلى الفروق في الجودة . ولعل هذه الفروق لا تربك ذهن القارئ فيما نريد أن نوكد من أن الطاقة كم يقاس ، وأنها توجد على عدة صور قابلة للتحويل فيما بينها ، وأنها لا يمكن أن توجد من عدم ولا أن تبديد وتدمر . ولم توجد شواذ هذا القانون العام المعروف بقانون بقاء الطاقة أو القانون الأول في علم الديناميكا الحرارية . ويستكشف العلماء من آن لآخر منابع جديدة للطاقة ، مثال ذلك تلك القوة المحبوسة في داخل الذرة وهي الناشئة من دوران إلكتروناتها . فهذه القوة قد يستفاد بها يوماً ما ، ولكننا لا نستطيع أبداً أن نوجد طاقة من الدمد

على أن هناك مسألة أخرى خاصة بضعف الطاقة تلبها صادي كارنو Sadi Carnot من نحو قرن تقريباً ، وهي التي نجد خلاصة لها في القانون الثاني في علم الديناميكا الحرارية ، أو قانون انحطاط الطاقة . نحن لا نستطيع أبداً أن نحول طاقة من صورة لأخرى دون إحالة بعضها حرارة ، ولا نجدي في هذا الصدد شيئاً حرارة الجسم الذي يكون دافئاً دافئاً طفيفاً إذا أريد بها أن تستحيل صورة أخرى . فمثلاً سائق القاطرة البخارية يحول طاقة الفحم الكيميائية طاقة حرارية ، ثم يحول هذه طاقة ميكانيكية . وهذه تبدل في مقاومة احتكاك الهواء والقبضان . فهل الطاقة الميكانيكية المبذولة هذه تدمر وتعدم بنائاً ؟ كلا بل هي ما زالت موجودة ولكن على شكل حرارة في الهواء والقبضان ، غير أنها تكون عديمة النفع لا تجدي شيئاً . ويوجد في الثلج أيضاً كثير من الطاقة ، لأنك إذا وضعت فوقه إبريقاً مملوءاً بالهواء المسال فإنه يغلي . فطاقة الثلج هذه يمكن نقلها إلى أشياء أخرى أبرد منه فيمكن من ثم أن يستفاد منها ، ولكنها تكون عديمة النفع إذا أريد بها غير ذلك . كذلك يوجد في مياه المحيط الاطلنطي من الطاقة ملايين الثرمات ، ولكن لا يمكن لأية باخرة تمخر عابه أن تستخدم هذه الطاقة في تسير آلاتها . ومعلوم أن دنيانا هذه تبرد بانتظام بمضي الزمن ، بل إن الكون كله يبرد كذلك ، ولا يوجد شيء يستطيع ، على ما يبدو لنا ، أن يوقف هذا الانحطاط أو التلاشي في الطاقة . فكأنما الكون ساعة أدبرت في يوم من الأيام ، وقد أبطأت الآن عن ذي قبل ، ولا بد لها أن تقف يوماً ما

وقد ذكر كاتب فرنسي مثلاً توضيحياً قريب به القانون الثاني إلى الأذهان . وهذا هو : تصور زجاجتين قد وصل بينهما بأنبوبة ، وتصور أنه قد وضع باحدهما كرة بيضاء وأخرى

سوداء . فبرجها رجياً مائلاً تستطيع أن تجعل إحداها تستقر في إحدى الزواجيتين والثانية في الأخرى . فإذا كان هناك كرتان من كل لون فانك تستغرق بلا شك وقتاً أطول في فصل البيضات في زجاجة والسوداوين في الأخرى . فإذا كان هناك ست كرات كانت عملية الفصل صعبة بلا مرء واستغرقت زمناً أطول وأطول . فإذا كان عدد الكرات عشرين فقد يستغرق فصلها ساعات كثيرة . فهل لنا أن نقول بعد ذلك إن عملية الفصل هذه تستحيل لو كان عدد الكرات مليوناً أو أكثر؟ وبعبارة أخرى لو كان لدينا مسحوق أشهب اللون فيه بياض وفيه سواد ، لوجود حبيبات سوداء وأخرى بيضاء لاعداد لها، فهل يمكن فصل هذه الحبيبات بسهولة؟ . الجواب واضح . فاقول باستحالة الفصل غير منطقي ، أما القول بأنه بعيد الاحتمال جداً فهو الأصح . وكذلك الحال مع الحركات الذرية التي تسبب الحرارة . فذرات الثلج الكثيرة العدد تنفص كلها من جراء ما بها من شتى مقادير الطاقة ، وقليل منها يكون متحركاً بسرعة تتفق ودرجة حرارة عالية نوعاً . ولكن إمكان فرز هذه الجزيئات القليلة لكي تستفيد بحرارتهما أمر بعيد الاحتمال جداً . إن الطاقة موجودة ولكن ليس في ميسورنا تناولها والأفادة بها . من هذا يمكن أن نذكر انه قد كانت هناك ثمة عملية ما تغيرت فيها الطاقة واستخدمت ، ثم استخدمت مرة أخرى ، وهكذا مع بقاء مجموعها الكلي ثابتاً دائماً . وقد أقنعت ألوف الأمثلة العلماء بأن احتمال حدوث هذا بعيد غاية البعد . فانهطاط الطاقة إذن أمر لا مفر منه

إن قانوني الطاقة هذين مهمان جداً وهما بلا نزاع من أهم وأعمق ما وصل اليه العلم من القوانين العامة . ولا يقل ثابتهما عن أولها صدقاً وقيمة ، وإن يكن إثبات صدقه غير سهل كإثبات الأول ، لا بالتجربة ولا بالمنطق البحت . ويتطاب هذان القانونان بالطبع شرحاً أوفى من هذا الشرح المختصر الذي أوردناه هنا . ولا توجد لها شواذ ولكنهما ينكران عن طريق الاستدلال إمكان وجود آلة تمدنا بمحركة مستديرة . ونحن نعرف ما أبدى المخترعون من حذق ومهارة وعبقريّة في الوصول إلى صنع مثل هذه الآلات لكي يخرقوا هذين القانونين . ولكن جهودهم في هذا الصدد قد فشلت كلها ، وما كان لها إلا أن تفشل . وبما يدعو إلى العجب أن « نظرية الكم » الجديدة الخاصة بالطاقة والتي سنعالجها في الفصل الثالث عشر قد تركت هذه النتائج التي وصل إليها العلماء كما هي دون أن تدخل فيها أدنى تغيير

الفصل العاشر

الهواء والصفخور

إذا نحن أفسجنا لأنفسنا مجال التخيل فأوجدنا لنا من ديانا دناً أخرى ، فإن هذه الدنا لا بد مخفية برماً كما تختفي بعض الآراء النظرية بظهور أخرى أحسن وأوفى . وإذا نحن من جهة أخرى اكتفينا من المشاهدات بأضافة الواحدة منها الى الأخرى دون أن نحاول استخلاص بعض الآراء التصورية منها أيضاً ، لا استخلاص بعض النتائج منها فقط ، فإننا نكون قد عملنا ضد الغرض الذي لاجل تحقيقه فقط أجريت هذه المشاهدات . على أني سأحاول الاحتفاظ بوسيلة صادقة ، فإذا ما انحرفت عن ذلك فاني بالطبع لا أرغب لنفسي الوقوع في هذا الخطأ الأخير

« هرشل »

— ٩ —

الغرض من هذا الفصل والذي يليه أن ندرس بشكل عام حالات المادة والطاقة ، أولاً على سطح الأرض ، وثانياً في جوفها ، وثالثاً في النجوم . ولقد أضافت كشف القرن الحالي إلى معلوماتنا الأولى عن هذه المناطق الثلاث زيادات عجيبة مذهمة ، توضح بما لا مزيد بعده من الأيضاح ، بحوثنا التي تضمنتها الفصول الأولى من هذا الكتاب . وهذه المناطق بعيدة عن متناول التجارب العملية ، وليكننا نستطيع مشاهدة ما يحدث فيها من التغيرات وملاحظة ذلك الحدوث . ومعروف أن الطبيعة تجري تجاربها دون أدنى تدخل من جانب الانسان ، وهذا يؤدي بالباحث العلمي إلى مواجهة مشاكل وصعاب رأيت أن أشير إليها بذكر ما قاله سير وليم هرشل Sir W. Herschel . فلا بد لنا من فرض الافتراضات إذن ثم صوغ النظريات تاركين للزم من أمر اختبارها . وعلى الرغم من أن بعض هذه الفروض والنظريات ، إن لم يكن أكثرها ، غير واضحة فيكون أ أكثر وضوحاً في حالة الخطأ منه في حالة اللبس والغموض »

إن جو الأرض قشرة رقيقة جداً من الغاز إذا هي قورنت بقطر الأرض . وهو طيفتان تبتان كل التبان . فنحن نعلم أن الهواء يصير أبرد وألطف كلما أوغلنا فيه صاعدين ، وكان

أعلى ارتفاع في الجو بلغه الإنسان بنفسه قبل المحاولات الأخيرة سبعة أميال (١). وتستمر درجة الحرارة في الهبوط خلال الأميال الثلاثة التالية التي باتسماتها فصل إلى الطبقة العليا للطبقة السفلى. ورياح الجو وأنواره وعواصفه محصورة في هذه الطبقة الضيقة. وتكون درجة الحرارة عند هذا الارتفاع (١٠ أميال) حوالي -٦٠° مئوية. وبعد هذه نحيي الطبقة الثانية وحرارتها مماثلة تقريباً لدرجة سابقتها. ولكنها لا تشمل على بخار الماء، وقد استكشفت هذه الطبقة بواسطة صعود الإنسان إليها بل بواسطة مناطيد تسجيل لسر الارتفاع من نوع المناطيد التي اخترعها سنة ١٨٩٨ الدكتور دي بور Dr. De Bort، وهي مناطيد صغيرة مصنوعة من المطاط ومملوءة بالايديروجين، وتحمل في جوفها إطاراً خفيفاً من الخشب مجهزاً بآلات دقيقة الصنع لقياس الحرارة والضغط. وبطلق المنطاد فيصعد إلى طبقات الجو العليا، وبظل يرتفع فيها حتى يصل إلى ارتفاع يكون الهواء فيه مخلخلاً بدرجة كبيرة فينتفخ المنطاد ثم ينفجر، ويسقط الأطار بما فيه من آلات للتسجيل تعمل بذاتها، فيصل إلى الأرض. وكل من يمشي على واحد من هذه الأطار الخشبية يريح خمسة شلطات إن هو أرسله بالبريد إلى محطة القواصر الجوية التي أطلقت هذه المناطيد. وبهذه الوسيلة أمكن أن يجمعوا في أناة كل ما جمعه من المعلومات الخاصة بهذه الطبقة الهوائية الخارجية الباردة المسماة الجو الطباقى. والأمل كبير في إمكان الوصول قريباً إلى معرفة سر سكن هذه الطبقة وانظامها المجهين. وهي في الحقيقة تختلف كل الاختلاف عن الهواء الذي بأسفلها والذي يكاد يكون دائماً أبداً مرتباً على شكل طبقات أفقية تختلف في درجة الحرارة وفي مقدار ما فيها من بخار الماء.

ويمكن تشبيه الجو السفلى بالآلة عظيمة تحيل طاقة الأشعة الشمسية طاقة أخرى هي طاقة الهواء الميكانيكية. وقدرة هذه الآلة ثلاثة بلايين حصان. وربما كان الأنسب وصف هذه الآلة بأنها بخارية لأن العامل المهم في حمل هذه الطاقة هو بخار الماء. وكلنا نعلم أن الهواء الساخن يرتفع، وأن جزءاً من طاقة الرياح يرجع إلى هذا السبب البسيط. ولكن الهواء الساخن

(١) كان ذلك سنة ١٩٠١ ثم أمكن الصعود بالطيارة سنة ١٩٢٦ إلى ارتفاع قدره ثمانية أميال. وجاء الاستاذ بيكارد سنة ١٩٣٣ فسجل بمنطاده رقماً قياسياً قدره ٥٢١٥١ قدماً، أي ما يزيد قليلاً على ١١ ميلاً، ثم تلاه في نهاية تلك السنة اثنتان من رجال سلاح الطيران بالولايات المتحدة بأميركا، وهما سبيل وتشستر فوري، ففصر هذا الرقم القياسي حيث بلغا ارتفاعاً قدره ١٢ ميلاً، وكان شرطهما اختبار حمل الاشعة الكونية في بعض السكائنات الحية. وقد وضع العلامة الطيب الذكر المرحوم سبرج. آرثر طيسن في كتابه The Outline of Science رسماً تخطيطياً للجو وكيفية استكشاف طبقاته. ويستدل من هذا الرسم على أن أقصى ارتفاع بلغته مناطيد التسجيل الصغيرة التي كانت تطلق وحدها في الجو ٢٢ ميلاً. ويرى العلامة البلجيكي كوزينز أن من اليسور الارتفاع بمنطاد خاص حتى ٣٠ كيلومتراً أي حوالي ١٨ ر٦ من الأميال، أما فيما وراء ذلك فيقول كوزينز أن من المستحيل الارتفاع إليه بأي نوع كان من المناطيد.

لا يستطيع الصعود كثيراً لأنه يبرد بمعدل درجة لكل مائة ياردة صعوداً ، وبعد صعود ميل أو ما يقرب منه لا يمكن الاستفادة بطاقته الحرارية في إحداث حركة أخرى فيه . ولكنه مع ذلك يشتمل على مقدار أكبر كثيراً من الطاقة الكامنة في بخار الماء الذي يحمله ، فإذا ما انخفضت درجة الحرارة بما فيه الكفاية تكاثف البخار وصار نقطاً ، وبذلك تطلق حرارته الكامنة كلها . ولذا فالهواء يستطيع أن يصعد إلى علو أكبر باستخدامه هذه الطاقة ، وقد يرتفع ثباره إلى مياين حيث تكون درجة الحرارة مماثلة لدرجة تجمد الماء ، وقد يرتفع إلى ضعف هذا القدر . وما السحب التي تراها إلا فُلاَنس منظورة لعدم غير منظورة من البخار ممتدة من الأرض إلى أعلى ، وتكون أجزاؤها السفلى في الغالب منبسطة تماماً عند المنسوب الذي تسبب درجة حرارته تكاثف البخار . وغالباً ما تكون سطوحها العليا أفقية أيضاً ، وفي حالة الكهورة ، وهي السحابة الكبيرة المتكاثفة ، قد يبلغ الارتفاع أربعة أميال أو أكثر ، وهنا تكون درجة الحرارة — ٢٠° مئوية أي تكون جميع نقط الماء متجمدة حتى الثقط الصغيرة التي تكون قد بلغت هذا الارتفاع . وتكون أعالي هذه السحب متألفة من بلورات من الثلج . وربما تكون قد رأينا في يوم طصف رزماً من السحب الريشية المسماة سماحيق السماء ، المتألفة من هذه البلورات ، والتي تخالف الكهورة ذات الكتلة الضخمة المستديرة

هذه التغيرات الواسعة المدى لا يمكن شرحها بأسهاب وتفصيل في مثل هذا الكتاب ولكننا سنختار مسألتين فقط نيسط فيهما الحديث بعض البسط . الأولى صغيرة نسبياً ، وهي خاصة بتكون البرد — ذلك التكوين الذي يتصل ببلورة الثلج التي قلنا عنها إنها ذات بناء ريشي أو زغبي خفيف ، فمقطة المطر تسقط عادة بعد تكوينها ، وما أسرع ما تصل إلى سرعة هبوط ثابتة تنوقف على حجمها . فإذا كان قطرها جزءاً من ألف جزء من البوصة هبطت بسرعة ٤ بوصات في الثانية ، وإذا كانت أكبر من ذلك ثلاث مرات هبطت بسرعة ٣ بوصات في الثانية ، أما أكبر نقطة تستطيع الهبوط دون أن تتجزأ فقطرها يبلغ ربع بوصة تقريباً وسرعة هبوطها ٨ ياردات في الثانية . ويوجد في الغالب تيار قوي من الهواء الصاعد ، كما هو الحال مع السحب الضخمة التي وصفناها ، فترتفع النقطة إلى أعلى على الرغم من وزنها حتى تصل إلى المناطق الأبرد من منطقتها وهناك تتجمد . وأحياناً تصل إلى ما بعد نقطة التجمد — قصير فوق المبردة دون أن تتجمد — وأخيراً تتجمد وتصبح كتلة بيضاء ناعمة من البلورات وقد تبدأ في الهبوط عندئذٍ ولكنها بدلاً من أن تدرك الأرض على صورة جليد قد يرفعها الهواء ثانياً مع كثير من البلل الذي يكون قد تجمّع فوقها ، فيتجمد هذا فوقها مكوناً كتلة خارجية من الجليد الصافي في المنطقة التي تكون على ارتفاع ميلين . فتستحيل من ثم كتلة أثقل وأكثر اندماجاً فلا يقوى

تيار الهواء الصاعد على حملها فيسقط خلاله إلى أن تبلغ الأرض على شكل برد . ويمكنه بسهولة أن تئين صحة هذا البناء المزدوج إذا أنت شطرت على الفور حبة برد نصفين . وعند حدوث الصواعق الجوية الشديدة في المنطقة الحارة تكون التيارات الصاعدة من القوة بحيث تحمل معها البرد ثانية إلى أعلى ، وبعدئذ يهبط مسافة ما ، ثم يرتفع وبعدها ينخفض — ويحدث ذلك جملة مرات — فهو يهبط حينما يكون كساؤه الخارجي مسترخياً خفيفاً ، ويهبط حينما يكون الثلج أملس جامداً ، وبظل كذلك إلى أن يكبر وزنه في النهاية فلا يقوى التيار الصاعد على حمله فيسقط على الأرض . فإذا ما شطرت حبة نصفين ظهرت فيها هذه الطبقات المتعددة المتبادلة ، وقد تنشق الحبة الكبيرة عادةً خلال هبوطها محدثة الحب المخروطي الشكل ذا الأطراف المدببة التي كثيراً ما نشاهدها

سبق أن أشرنا إلى وجود طبقات في الهواء تختلف في درجة الحرارة ، ولكننا لو أدخلنا في حسابنا بخار الماء الموجود في الجو لكان كلامنا أوفى ، وذلك لأن بخار الماء يمثل وجود حرارة كامنة ، ولاستطعنا من ثم أن نتفق الطبقات المتساوية الانتروبي^(١) entropy كما فعل سير نابير شو Sir Napier Shaw . ونحن دون الدخول في بحث دقيق في الانتروبي نقول ونصر على القول بوجود طبقات أفقية في الهواء تشبه الطبقات في التكون الجيولوجي . وتصدر التيارات الهوائية في النادر خلال هذه الطبقات ، وتكون الحركة الرأسية في أغلب الأحيان عبارة عن صعود مجموعة طبقات بأكملها فوق مجموعة أخرى ، فتزلق الكتلة الباردة أسفل الكتلة التي تكون أدفاً منها ، وحتى في حالة الأعصار الذي يهب في المنطقة المعتدلة على الأقل يوجد تيار هوائي قوي صاعد في مركزه ، وكان بظن سابقاً أنه هو الذي يحدث المطر في هذا المركز . ويحدث أن تتلاقى كتل الهواء البارد بكتلة الدافئة ، وذلك حينما يقابل الهواء القطبي المنهمر غرباً وإلى الخارج ، في اتجاه أنصاف الأقطار ، الهواء الأدفاً المتحرك باطراد نحو الشرق .

وهذا في خطوط العرض الشمالية هو سبب المطر وهو كثير الحدوث

أما أصل الصواعق الجوية فقد استكشفه الدكتور سيمسون Dr. Simpson ، وهذا الأصل واحد لجميع الصواعق الجوية على الرغم من أنها تختلف كثيراً في صفاتها . وهو : حينما تنجز أ نقطة صغيرة من الماء فان بعض الالكترونات تترك ذراتها الأصلية بسبب هذه التجزئة ، ومعنى هذا النقص في الالكترونات أنها تشحن كهربائية موجبة . وتكون ملايين من قطرات المطر الكبيرة حينما يندفع الهواء الرطب إلى أعلى اندفاعاً شديداً مفاجئاً ، فعندما تسقط هذه القطرات

(١) تمثل فكرة الانتروبي حالة أو خاصة في المادة تبقى ثابتة ما دامت المادة لا تتكسب من الخارج شيئاً

من الحرارة ولا تفقد منها شيئاً ، في حين أنها قد تعمل في أثناء ذلك شغلاً تتغير معه درجة حرارتها

ثم تتجزأ ترددات كهربائيتها فتبلغ جهداً مرتفعاً لا مناص منه من حدوث تفرقات عظيمة لهذه الشحنات الكهربائية ، يصحبها شرر كبير مضيء هو المعروف بالبرق . ويقال أحياناً إن الرعد يحدث الحار ، والحقيقة أن المطر هو الذي يحدث تكهرباً فيحدث الرعد من ثم .

— ٢ —

دراسة جوف الأرض فرع وارف خلافاً من فروع العلوم ، وهي تقدم لنا كثيراً من المثل التوضيحية لتفسير خواص المادة والطاقة — وقد مر بنا ذكر هذه الخواص . ومن أهمات المسائل الرئيسية في هذا الصدد مصدر حرارة الأرض . فالتغيرات التي حدثت في درجة حرارة سطحها في الزمن الماضي ، والنضال التدريجي لحركة دورانها حول نفسها ، والقوى التي لوت الصخور وفلتها ، وتوالي الزلازل — كل هذه مسائل فيزيائية تقدم لنا صوراً وأجهاً جديدة للمادة والطاقة .

كان لورد كلفن Lord Kelvin منذ أكثر من خمسين عاماً يقول عن حرارة باطن الأرض ، إنها البقية الباقية من تلك الحرارة الشمسية الهائلة التي حملتها الأرض معها حينما انفصلت عن الشمس ، وأجرى بناءً على ذلك جملة حسابات للوصول إلى معرفة عمر الأرض من تقدير سرعة تبريدها ، وقد كان الرجل حريصاً في حسابه حيث قيد النتيجة بملاحظة هامة هي : إن ظهور أي عامل مجهول يقلب حسابه رأساً على عقب ، وقد ظهر منذ ذلك الوقت عامل جديد كان مجهولاً أيام كلفن وهو أن المواد المشعة الموجودة في صخور الأرض تحدث حرارة فالراديوم مثلاً يحدث حرارة دائماً أبداً وذلك من جراء انفجاراته أو انفجار ذراته كما مر بنا . وعلى الرغم من ندرة وجود هذا العنصر على سطح الأرض فإن مقداره السكلي الموجود في قشرتها ليس ضئيلاً فيعمل . أما المواد الأقل ندرة منه ، كالثوريوم والأورانيوم ، فتفسخ الصخور أيضاً . بل إن القوى الإشعاعية لعنصر البوتاسيوم المعروف تشترك على صااتها بتسقط محسوس في الحرارة الكلية .

إن سطح الأرض كان يكون أبعد من ذلك قليلاً لو أن مصدر تدفقه كان وفقاً على الشمس وحدها . فالشمس تعطي الأرض في كل ثانية حوالي خمسة ملايين من الثمات ، وتنفث صخور الأرض حرارة تنبث إلى سطحها أيضاً بمعدل ربع مليون ثم في كل ثانية . وهذا العدد الأخير مستنتج من مدى ازدياد درجة الحرارة بالعمق كما هو ملاحظ ومقيس في المناجم والآبار العميقة المحفورة . والمعروف أن درجة الحرارة تزيد عشرأ لكل ألف قدم تعمقها في باطن الأرض . ولكن هذا القدر يختلف كثيراً باختلاف الجهات ، وكذلك تختلف قوة توصيل

الصخور للحرارة ، ولذلك فإن مقادير الحرارة المقاسة هذه تقريبية فقط . كذلك لا يقرب عن البال أن تقدير الحرارة المنبعثة من المواد المشعة الموجودة في الصخور تقريبي أيضاً ، ولكن ليس من شك في أننا نستطيع أن نعلم لوجود الحرارة كلها على هذا النمط وما بنا من حاجة إلى ذكر أن كثيراً من حرارة الأرض صادر إلى سطحها من مركزها ، وإن تكن مسألة أن مركز الأرض لا يزال مرتفع الحرارة جداً مسألة تشعبت بصدها الآراء ولا يمكن الاكتفاء في حلها بالإشارة إلى حرارة السطح ، أو بمباراة أدق إلى جزء حرارة السطح الصاعد إليه من الجوف . أضف لذلك أن البحث في أصل الأرض وعمرها قد أثار بعض الشك حول هذه النقطة ومن المحتمل أن درجة حرارة السطح عند مولد الأرض كانت ١٤٠٠° مئوية ، وأنها على عمق ٢٠٠ ميل إذ ذاك كانت أعلى من هذه الدرجة ، أما عند المركز فقد كانت أشد كثيراً . ويحتمل أن يكون عمر الأرض حوالي ألف مليون سنة

أما خواص المادة وهي في درجة حرارة مرتفعة جداً وتحت ضغوط شديدة جداً — الأرض الحادثة مادة تحت القشرة الأرضية — فمن الأمور الصعبة في بحثها وتحقيقها ، ولم نصب في معاملنا بهذا الخصوص إلا نجاحاً صغيراً محدوداً . أما الزلازل فيصح اعتبارها تجارب واسعة المدى تجربتها الطبيعة كلها بدا لها . وقد تعلمنا أن نقف منتظرين نتائج هذه التجارب تدونها راصدات الزلازل وهي آلات السيسموغراف Seismograph . أما نتائجها من الوجهة العلمية الضيقة (لأن الرجل العلمي دائماً يضيق مدى تجلده حتى يلائم مستوى وجهة النظر الخاصة التي يفحصها) فتمدنا بأنباء حقيقية عن نوع المادة التي تنقل الرجة من إحدى نقط القشرة الأرضية إلى أخرى . وربما كان أليق أن نقول « رجات » بدل « رجة » لأن هناك موجة مزدوجة تنتشر من كل صدمة كما يحدث لو أنك لطمت يديك منضدة . ففي أحد جزئي هذه الموجة تنزاح الجزيئات من جانب لآخر كما تنقلت الموجة وفي الجزء الآخر تتأرجح الجزيئات جيئةً وذهاباً على طول الموجة كما يحدث في موجة الصوت . وتكون حركة الأولى أبداً قليلاً من حركة الثانية ، إذ تبلغ الأولى حوالي أربعة أميال في الثانية ، ومن عدد الثواني التي تتأخرها عن زميلتها الأخرى في الوصول إلى محطة الاستقبال نستطيع أن نحسب بعد مكان الزلزال الذي بدأت منه الموجتان معاً ، وبجمل آلات القياس دقيقة وحساسة أمكن الوصول إلى معرفة الطرق التي سلكتها الموجات ، وأنواع المادة التي تكون قد اخترقتها . فبعض التأثيرات تسري حول الأرض كلها أسفل سطحها مباشرة ، وبعضها تسري في خطوط مستقيمة من نقطة لأخرى ، وبعضها تسلك طرقاً مختلفة الانثناء والانحناء كاشعة الضوء التي تحت السراب في الصحراء . والنتيجة التي نصل إليها من هذه العمليات الحسابية كلها أن الصخور الجامدة تمتد

في باطن الأرض هابطة إلى نحو ثلاثين ميلاً فقط، وأسفل هذه توجد صخور البازلت الساخنة اللينة (نصف المنصهرة) ممتدة إلى حوالي مائة ميل أخرى أسفل ذلك. وبالقرب من مركز الأرض تكون الصخور أثقل ويحتمل أن تكون أشبه شيء بحام الحديد، ويتحتم علينا أن نتصورها منصهرة ولكن لا كالموائع العادية لأن الضغط الشديد يكسبها لزوجة شديدة قريبة من اليوسنة. ومنذ عهد قريب افترض الدكتور جولي Dr. Joly الأيرلندي فرضاً يصحح أن يكون ملحقاتاً لهذه الصورة أشار فيه إلى أن طبقة البازلت التي تبدو في القلح البركاني منصهرة (هي المسماة لافا) تحتوي على معادن مشعة تكون في الغالب مصدر حرارة مستمر. ويسري بعض هذه الحرارة إلى أعلى فيزيد في حرارة سطح الأرض كما مر بنا. ولكن الصخور والحجارة رديئة التوصيل للحرارة، وقد دلّ الحساب الصحيح على أن تولد الحرارة في باطن الأرض أسرع من سريانها، ولذلك ترتفع درجة حرارة الصخور شيئاً فشيئاً إلى أن ينصهر في النهاية. ومعلوم أن السائل في نقله الحرارة أسرع من الصلب لأن أجزاء السائل تستطيع أن تتحرك. فالطبقات الساخنة تصعد إلى السطح وهناك تبرد ناقلات الحرارة بتيارات «الحمل» ثم «التوصيل» العادي حينما تتجمد. وعلى ذلك فحينما يكون البازلت منصهرًا يبقى مورد الحرارة كما هو، وعندئذ تسرب الحرارة بأسرع مما تتكوّن. ومن ثم يبرد الصخور مرة أخرى — ويتجمد أخيراً. ثم يبدأ دور هذه التغيرات العظيمة مرة ثانية. وهذا هو رأي جولي. ويظهر شقة الشيق. عند حساب زمن هذه التغيرات. فقد دلّ الحساب على أن البازلت لا بد أن يبقى صلباً جامداً إلى ما يقرب من ٢٥ مليون سنة، ثم سائلاً إلى ما يقرب من أربعة ملايين من السنين. وإذن فسينقلب سطح الأرض بين الحرارة والبرودة مدة هذه الفترات الزمنية. ونحن نعلم عن طريق الصخور السطحية أنه كانت هناك فترات زمنية عمت فيها البرودة — وهي المعروفة بالصور الثلجية. ومن الغريب أن تقدير مدتها يتفق وأرقام جولي. وهذا مثل من الأمثال البينة التي تثبت صدق فرض نظري علمي، وعلى ذلك فنحن مضطرون إلى الاعتقاد بأن في هذا الحدس اللبّق الخفي فتناً من الصدق. وتوجد لرأي جولي هذا نتائج أخرى كثيرة لا يمكننا التبسط فيها هنا، كالانتفاخات والتقلصات التي لا بد أن تصحب التغيرات ما بين حالة الصلابة وحالة السيولة ثم العكس، والتي لا بد أن تشقق سطح الأرض محدثة فيه تواءات وفجوات، فتتكوّن سلاسل الجبال العظيمة الارتفاع وأحواض البحار العميقة النور. وهنا يلفت أنظارنا ذلك اللبّ ما بين الطاقة والمادة في دورة التغير العظيمة هذه، فلا يسعنا إلا القول بأن الطبقة البازلتية الحالية الموجودة تحتنا ربما تكون قد تجمدت من جديد، أو هي تؤلف تحت القشرة الأرضية بجزراً من صخور منصهر لزج في درجة ١١٥٠ مئوية. فنأمل ا

الفصل الحادي عشر

في داخل النجوم

ليست تلك النجوم الابدية في حرز أمين، بل هي وحظها المقدور لها أشبه شيء بالسفن التي تمخر عباب البحار في ليل حالك، أي أنها لا تأمن الارتطام فالاندثار. أما قواها فترتد من تم إلى تلك العنينة البخارية التي أنبثقت هي منها في قديم الزمان، وبعدئذ تشق لنفسها من جديد ذلك الطريق الخائب الذي سبق أن سلكته

« روبرت برديجز »

لقد تناولنا بالبحث حالة المادة في الهواء وفي جوف الأرض، وها نحن نصل في هذا الصدد إلى آخر أطوار بحثنا وأوسعها ونقصد به معالجة طبيعة النجوم. ففي هذا المجال قد حصل العلماء فعلاً على كثير من المعلومات القيمة الجديدة، ومن حسن الحظ أن عدة فلكيين موهوبين قد خرجوا من مرأصدهم ليعرضوا على الناس فتوحاتهم في الفلك بطرق جذابة لبقة. وإخال إنه في مثل هذا الكتاب، وفي مثل هذا الفصل القصير المختصر، يصبح أن نكتفي بذكر بعض كشوف أولئك الفلكيين، وعلى الأخص تلك التي لها علاقة بطبيعة المادة والأثير اللذين ذكرنا في الفصول الأولى الكثير عنهما. ونصيحتي لكل من أراد التوسع في هذا الصدد أن يقرأ كتب العلامة جينز^(١)، والعلامة إدنجتون Eddington ومحاضراتهما

ولا بد من كلمة تمهيدية بخصوص ما أمكن الحصول عليه من المعلومات المستقاة من نقط الضوء البعيدة عنا والتي تملأ السموات، ونقصد بها النجوم، إذ أن هذا في ذاته فذ معجز إن النجوم في الواقع من السكثرة بحيث تكفي لأن يضع العالم ما شاء من النظريات ثم يشرع في اختبارها. فالعين العارية تستطيع أن ترى منها ما عدده ٢٣ مليون نجم أي إلى ما يشمل نجوم القدر السادس وينتهي عنده، وهي في مجموعها حوالي ٤٠ بليون نجم. ولكن أقربها إلينا،

(١) نقل إلى العربية الأستاذ الدكتور أحمد عبد السلام الكرداني بك أبسط كتب العلامة جينز وهو كتاب «النجوم في مسالكها» ونشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر

يقطع النظر عن سيارات المجموعة الشمسية وتوابعها ، بعد عنا ٢٤ بلون ميل . فليس من بينها ما يبدو لنا كبير الحجم بحيث نسطيع منها قياسه ونعرف قطر هذه الأبعاد الشاسعة . وفي مكانه التلسكوب القوي أن يكشف لنا من أمرها ما يزيد عن مواقعها وحركاتها ، وطبعاً لا توجد في الواقع نجوم « ثابتة » . ونعلم بناءً عن بحوث الدكتور كبتين Dr. Kapteyn طيب الله ثراه أن هذه النجوم الأقرب إلينا من غيرها موزعة في الغالب خلال جزء من الفضاء على شكل قرص مفرطح قطره ١٨٠٠٠٠ بلون ميل وسماك ٣٠٠٠٠ بلون ميل . وموقعنا نحن قريب من مركز هذا الشكل الذي إذا أطلقنا نواظرنا إلى جوارفه البعيدة رأينا من النجوم أكثر مما لو أطلقناها صوب حدوده القريبة — وتلك كلها هي نجوم المجرة . ولكننا في هذا لا نجد ما يشير إلى تكوين هذه النجوم ، إذ أن ما سوى ذلك من الكشف لم يكن ميسوراً لنا إلا بعد أن وصلنا التلسكوب بجهاز الاسبيكتروسكوب

ويفضي كل نجم بسرّه إذا هو رؤي خلال الاسبيكتروسكوب إذ أن هذا يكشف الأطوال الموجية لأشعاعه المنبعث منه ، فأحياناً يكون الطيف شريطاً من ألوان قوسي قزح تقطعه خطوط كثيرة دقيقة مظلمة ، كما هو الحال في طيف الشمس ، وأحياناً يكون شريطاً يحترق بضغ خطوط جادة فقط . وفي بعض الأطياف النجمية تقطع الشريط رقع مظلمة واسعة ، وبعضها يشتمل فقط على خطوط ملونة لامة منفصلة . وقد أخذت صور فوتوغرافية كثيرة لأطياف النجوم المختلفة وحللت هذه الصور تحليلاً دقيقاً — ولا يخفى أن ذلك عمل شاق مجهود جداً يتطلب عناية وصبراً شديدين . وعلى هذه الأطياف كان كل اعتماد علماء الفلك الفيزيقيين في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمادة النجمية . فهذه الأطياف تحدثنا عن درجة حرارة النجوم ، فالنجم الذي يكون أبيض تكون نسبة ضوئه عند النهاية الحمراء في الطيف أصغر من ذلك الذي لا يكون أحمر . وهي التي تبيننا بالناصر التي تكون في سطح النجم وتلك التي تكون في جوفه ، وذلك لأننا نستطيع تعيين شخصية خطوط الأطياف بمقارنتها بخطوط أطياف الذرات التي أمكن الحصول عليها في المعمل ، فنعلم مثلاً أن الشمس غنية في الحديد والكلسيوم . وهي التي نخبرنا بضغ الغازات في النجوم ، وأنها تقترب منا وأنها يعتمد عنا ، بل هي التي تدلي إلينا حتى بما يمكننا من حساب حجم النجم في بعض الحالات . فليس من السهل إذن قراءة لغة الأطياف ، ولكن ترجمة هذه الأطياف قد تقدمت في العشرين سنة الأخيرة ، وسارت الى الأمام خطى واسعة . واستطاع الفلكيون والفيزيقيون في جميع البلدان بتعاونهم وتآزرهم أن يحصلوا على قسط كبير من المعلومات التي كانت أساساً لما وصلوا اليه من النتائج التي سندكرها فيما يلي : —

تختلف النجوم التي نراها في درجات حرارة سطوحها من 3000° إلى 9000° مئوية وتبلغ درجات حرارة مراكزها من خمسة ملايين إلى خمسين مليون درجة . ويجرد سماعتنا بهذه الأرقام يستحق منا أن نشكر قليلاً ، إذ لا يمكن في مماننا أن نحصل على أمثال هذه الدرجات الحرارية المرتفعة . فأعلى درجة أمكن الوصول إليها هي درجة القوس الكهربائي التي تبلغ حوالي 3000° مئوية . والمعروف عن الحرارة أنها توفان : حرارة المادة وهي المتألفة من طاقة الذرات المتحركة ، وحرارة الفضاء الأثيري المتألفة من طاقة الموجات الكهرومغناطيسية . ودرجة الحرارة بالنسبة للنوع الأول مقياس لانطلاق الجسيمات ، أما بالنسبة للنوع الثاني فليس لدرجة الحرارة معنى يمت إلى الأثير نفسه بصفة ، بل أن الموجات تدل دلالة بانه على درجة حرارة الجسم الذي يبعث بها ، وتبين ذلك عند ما نتكلم عن الحرارة الجراء أو الحرارة البيضاء . وإذا نحن عدنا إلى درجة الحرارة البالغة بضعة ملايين على المقياس المئوي نجد أن أساسها الفيزيقي ينحصر في سرعة الجسيمات ، وهي تلك السرعة المرتفعة جداً ، وفي تكوين موجات طولها أقصر من طول موجات الضوء الأبيض . على أن السرعة الحقيقية لا تضاهي في الكبر سرعة الإلكترونات في الأنابيب المفرغة أو سرعة جسيمات ألفا المنبعثة من الراديوم . فإذا صح لنا بعد ذلك أن نتكلم عن درجة حرارة جسيم مفردة كنا كمن يقول بإمكان الوصول إلى درجات الحرارة المرتفعة هذه فوق سطح الأرض في حالي الإلكترونات وجسيمات ألفا . أما في حالة الموجات الأثيرية فالقاعدة أنه كلما كانت درجة الحرارة أعلى كانت الموجة التي تحدثها أقصر ، ويعدل الطول الموجي لبضعة ملايين الدرجات الطول الموجي لشعاع إكس . وعلى ذلك يكون باطن النجم مملوفاً بجسيمات سريعة الحركة جداً واهتزازات أشعة إكس

يبد أن الفرق العجيب ما بين النجم والأرض إنما ينحصر في الدور الذي يلعبه الأثير في النجم فهو ملوّه الاهتزازات بشكل مدعش إذا هو قيس بالحالات الأرضية . فهنا على سطح الأرض إذا نحن غلبنا إربقاً من الماء فاما نزيد في سرعة سريقات الماء ، ونزيد كذلك في شدة الاشعاعات الحرارية في داخل الأبريق ثم منه إلى خارجه . ولكن مقدار الطاقة التي تمثلها هذه الاشعاعات يمكن إهماله لضعفها أما في النجم الساخن فكل من الجسيمات المادية والاهتزازات الأثيرية مئارة إلى حدٍ عظيم جداً ، وقد تمثل الاهتزازات نصف الطاقة وزيادة . وهذا يصل بنا إلى نتيجة عظيمة الأهمية . فنحن لا نشعر البتة بالموجات اللاسلكية أو أية موجات كهربية أخرى على سطح الأرض ما لم تكن لدينا أجهزة استقبال حساسة ، نتمع أن الموجات في الواقع تفيض على كل شيء تقابله وهذا الضغط من الضالة بحيث لا نشعر به ، حتى ضغط الضوء الشمسي الشديد لا نشعر به ، وإن يكن قياس أمثال هذه الضغوط ممكناً في المعامل . قاسه لأول مرة في

موسكو سنة ١٩٠١ الأستاذ ليدبر Lebedew وكان كلارك مكسويل قد تنبأ بوجوده قبل ذلك بحيل كامل وهذا الضغط يكون كبيراً إذا ما اشتد الاشعاع . ففي المذهب المضطرب الوعاج يكون الاشعاع من القوة بحيث يكفي لإبعاد الجسيمات الدقيقة المكونة لذنبه — وإلا لتغلب الجذب الثقالي على هذا الدفع فارتدت الجسيمات إلى المذهب

وحجوف النجم ساخن غني جداً بأشعة إكس حتى تضغط هذه الأشعة على الذرات المتطاردة الحديثة لما فتدفع بها إلى الخارج . وفي نفس الوقت تحاول الذرات أن ترتد بتأثير الجاذبية . وإذن فهناك صراع عنيف في كل نجم بين دفع إلى الخارج وجذب إلى الداخل ، أي بين القوة التي تعمل على انتشار النجم (وهي الضغط الاشعاعي إلى الخارج) والقوة التي تعمل على تجهمه واندماجه (وهي الجاذبية) . ويفصل وزن النجم في أيهما يكون الغالب وأيهما يكون المغلوب . وفي تغلب إحدى القوتين على الأخرى موت النجم ، لأن المادة النجمية إما أن تتفثر وتبدد في الفضاء وإما أن تتكاثف عند ما تنخفض درجة حرارتها ويخبو ضوءها فلا ترى . ولكن النجم يبقى حياً لو أن القوتين كادتا تتوازن . ولما كانت القوتان متوقفتان على وزن النجم كان وزنه هذا مقياساً لوجوده . فالنجوم جميعها من ثم تكاد تتساوى أوزانها ، وإن يكن هناك شواذ سببها أن فعل القوتين المتضادتين بطيء جداً ، ولذا فالنجم يبقى في الوجود ملايين السنين قبل أن تتوازن القوتان . والمدعش أن هذه القاعدة النظرية التي لم تكن متوقعة نافذة بدقة في السموات وأكبر النجوم وزناً هو نجم الكلب الأكبر وزن ، كما يقول جينز ، قدر وزن الشمس ٩٤٠ مرة . ولكن مدى اختلاف النجوم في الوزن صغير يدل على انتظام مرجح ، إذ أن أوزانها في الجملة تتراوح بين عُشر وزن الشمس وعشرة أمثال وزنها ، مع العلم بأن الشمس تزن ألفي بلون بلون طن . أما النجوم التي تزيد أوزانها عن ذلك فقليلة جداً . فالنجوم إذن في الجملة تكاد تكون متساوية وزناً

ويتهم علينا أن نبين كيف أمكن وزن النجوم وهنا لابد من الإشارة إلى أننا في شروحننا نستعمل أبسط العبارات وأكثر الألفاظ شبيهاً بمتبعين جهدنا عن صلاحية البحث الرياضي النظري لأن معالجة ذلك على الوجه الأكمل تستلزم عدا ذلك أن ندخل في حسابنا ظواهر أخرى . ويمكن إجمال ذلك بقولنا إن الفلكي الفيزيقي كما استطاع أن يبين درجات حرارة النجوم بطرائق تشبه تلك المستعملة في المعامل ، وكما استطاع أن يقيس حجوماً بمقياس تدخل نجمي صنع خصيصاً لذلك ، استطاع أيضاً أن يحسب أوزانها عن طريق الشد الجاذبي الذي يؤثر به نجم في زملائه الأخرى من النجوم كما نحسب نحن الآن وزن الأرض عن طريق جذبها للقمر لكي نحفظه في مداره . وأسهل النجوم من حيث إيجاد الوزن هي تلك التي يكون لكل منها زميل يظهر في

السموات ، ويدور كل منهما حول الآخر . وتلك هي النجوم المعروفة في علم الفلك بالنجوم المزدوجة أو المجموعات الثنائية . فإذا ما قاس الفلكي المسافة السكائية بينهما وأوجد سرعة دورانهما استطاع أن يحسب كتلة كل منهما . وقد أمكن إيجاد أوزان بعض النجوم عن طريق ما تبديه أطيافها من شواهد وبنات . أما كثافة السطح فقد أمكن تعيينها بسهولة من حالة الخطوط الطيفية ، وأما الكثافة الداخلية فقد أمكن استنتاجها من ذلك مع مراعاة بعض الاعتبارات النظرية .

وعلى الرغم من انتظام النجوم في الوزن زاهًا تختلف كثيراً وإلى مدى واسع مدهش في الحجم . وقد قيست الأقطار في بضع حالات بطريقة مباشرة تضمنت وصل مقياس تدخل بالنسكوب ، فأيدت النتائج الأرقام التي حصلوا عليها بطريقة غير مباشرة . وفي هذه الحالات غير المباشرة كان قطر النجم المقيس كبير جداً . وقد وجد أن قطر النجم المسمى منكب الجوزاء ٢١٥ مليون ميل ، وقطر النجم المسمى قلب القرب ضعف هذا القدر ، وقطر نجم الدبران أكبر من ذلك قليلاً ، ويمكن وضع المريخ وفلكه حول الشمس داخل قلب القرب ، ويمكن وضع الأرض بفلكها في منكب الجوزاء . ولما كانت هذه النجوم المردة غير ثقيلة الوزن بصفة استثنائية فهي لا بد متألفة من غازات في ضغوط منخفضة جداً . وقد دلت الأرقام التي حصل عليها الدكتور سيارز Dr. Seares على أن الضغط في بعض الحالات أقل من الضغط الجوي عشرة آلاف مرة . والواقع أن ذرات النجوم هذه متباعدة جداً ومنتشرة في فضاء كبير جداً حتى ليعادل الضغط عَشْر مليمتر من الزئبق فقط — أي يبلغ ما اعتدنا إلى سنوات مضت أن نسميه فراغاً طياً

وتوجد على العكس من ذلك نجوم كثيرة تقلصت وانكشفت إلى حد كبير حتى صارت كثافتها مرتفعة جداً ، فالنجوم المختلفة ليست ناجمة عن كييات المادة التي تشتمل عليها النجوم بل هي على الأرجح ناتجة من درجات تكس المادة واختلافها حشداً وتفرقاً . فالطن من مادة الشمس تشغل ما يقرب من الحيز الذي تشغله طن الفحم ، ولكن نفس الوزن من مادة منكب الجوزاء يشغل من الفضاء ما يشغله بهو كبير ، في حين أن طنًا من مادة النجم فان مانن Van Maanen تشغل حيز الحصة الواحدة ، أي أنه في الامكان تعبئة مائة طن بسهولة في إحدى محافظ الحبيب . أما إذا قورن كل شيء على الأرض بماير الصلابة الموجودة في نجم فان مانن فانه يكون أوهى من خيط العنكبوت

وبتأثير الحرارة الشديدة جداً تبدأ الالكترونات الذرية الخارجية في الاشكال في الذرة ، ويكون مثلها مثل الماء الذي يسخن تفصل منه الجزيئات الخارجية وتطلق وحدها في

سياحات مستقلة وفي النهاية يتبخّر الماء كله أو تكون الحرارة قد حولته كتلة غازية أي بخاراً يكون فيه كل جزيء سائراً على حدة في طريق خاص . وعلى هذا النمط تعمل الحرارة في الذرات فتطلق منها طبقات متتالية من الإلكترونات التي تترك مراسيها ، وتضائل الذرات شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى في النهاية من بنائها التماسك إلاّ الحطام الذرية المنفصلة . على أن علماء الفلك الفيزيقيين الرياضيين من أمثال النجم جينز لم يترددوا في القذف بعملياتهم الحسابية في هذا الميدان . واستلجاع جينز أن تثبت من الواقع فيها تقريباً وهو : إن الإلكترونات ، جلها إن لم تكن كلها ، الكتلة في مراكز معظم النجوم لا بد أن تطلق من ذراتها الأصلية نازكة المادة النجمية وقد انحلت معظمها أو انحلت في كلها إلى مكوناتها من نويات وإلكترونات . وكان جينز قد استكشف هذا الرأي من جديد^(١) وقال عنه إنه لم يكن رأياً ظنياً بل كان استنتاجاً لا مناص منه أوصلته إليه كشوف الفيزياء الحديثة بخصوص الذرة . وعند ما تطرد جميع الإلكترونات الخارجية من أماكنها تكون النويات من ثمّ معبأة لزازاً وبشدة ، فتتجم عن تعبئتها هذه كثافات مرتفعة جداً . لقد نبأ العلم بهذه النبوءة ، فلما استكشف الفلكيون زميل نجم الشمري البانامية تحققت هذه النبوءة حيث وجدوا أن كثافته أكبر من كثافة الرصاص خمسة آلاف مرة . أي أن مادته مندمجة جداً بحيث أن طناً منها يمكن وضعها في علبة ثقاب صغيرة . ولم يكن هذا النجم الوحيد من نوعه لأن الفلكيين قد استكشفوا بعده تلك « الأقزام البيضاء » التي من بينها نجم فان مان الذي مرّ بنا ذكره ، والذي اندمجت مادته أكثر من اندماج مادة زميل نجم الشمري البانامية . وعدا هذا فقد ظهر دليل آخر على وجود هذه الكثافات الفيزية استنتج من الازاحة الطيفية التي قال بها العلامة اينشتين ، والتي تحققت في طيف زميل نجم الشمري البانامية ونجم فان مان وأمثالها وسنعود الى ذكر ذلك في الفصل التالي لقد حاولنا في هذا الفصل أن نبين الصور غير المتوقعة التي قد تتخذها المادة والطاقة في النجوم . وإلى هنا يجب أن نقف . ولترك تلك القصة الشيقة الخلاصة ، قصة غم النجوم وضمورها وما يتضمنه تاريخ حياتها من الغيرات التي تحدث بين الحالتين المتطرفتين التي ذكرناها — نترك تلك القصة الى القارئ فليتقص أمرها ، إذا رغب ، في غير هذا المجال . وهو واجد إن شاء الله في علم الفلك الحديث خير تطبيق لقواعد الفيزياء الحديثة ، بل هو واجد فيه حقائق فاقت في روعها أي خيال يستوحيه عقل أشهر الشعراء وأكبر الكتّاب

(١) قلنا استكشف من جديد لان ديكرات Descarte كان قد رأى سنة ١٦٤٤ أن الشمس والنجوم الثوابت « مكونة من مادة في حالة اضطراب وتوران شديدتين بحيث إذا ما اصطدمت بغيرها من الاجسام انقسمت الى جسيمات غاية في الدقة والصغر »

الفصل الثاني عشر

الجاذبية والنسبية

ان وجوه العلم التي لم يكشف عنها القناع بعد تنكسب الباحث عنها شعوراً يشبه شعور الصبي الذي يكبد لمعرفة الطريقة المثلى التي يتناول بها الامور من هم اكبر منه سناً « أينشتين »

البحث في هذا الفصل من أعجب بحوث الفيزياء الحديثة . فهو كاللحجر الأخير في البناء ، إذ به تم الى حد كبير مجموعة المعلومات التي شغلنا بسردها في الفصول الماضية . وإخال أن كل من قرأ هذه الفصول قد لاحظ وحدة هذا العلم النامية عند رؤيته ظواهر الميكانيكية والضوء والبناء الذري وجميع الموجات الأثيرية التي انتهت الأمر بها إلى اعتبارها كهربائية الأصل والمنبت من جهة ، وإلى اعتبارها من جهة أخرى خواص متنوعة للحرارة والصوت والقوى التجاذبية . وقد تحللت كلها فصارت مادة وحركة . وكان ينقص ذلك كله أمر واحد هو معرفة الصلة التي تربط ما بين الاعتبارين . ولقد ظلت قوانين نيوتن سنين كثيرة وهي تبدو كافية لربط كل الحقائق من الجانب الميكانيكي ، كما ظلت قوانين كلارك مكسويل ناجحة من الجانب الكهربائي . ولكن هذه وتلك كانتا على خلاف وشقاق عند نقطة اتصال المجموعتين ، إلى أن ظهرت كشوف أينشتين لحل التوافق والتناسق محل الخلاف والناظر ، وقضت قاعدة النسبية الجديدة على هذه الفروق

واحتاج الأمر لأكثر من بينة تجريبية للافصاح عن سبب هذا التناقض البين . وكان لابد من إظهار نقص الأسس المنطقية التي انبنى عليها موضوع هذا التناقض ، ومن ثم لم يلق أينشتين من معاصريه من العلماء تمكماً أو سخريه حينما نجح في إزالة هذا التناقض وفي وضع أساس جديد لم يقطن أحد لضرورته ، وبدا هذا الأساس الجديد في أول أمره كأنما هو لعب في لعب وبحجج في محجج . لقد جهر الرجل بأن المسافات والأزمنة لا يمكن أن تقاس قياساً مضبوطاً ، مع أن القوانين العلمية جميعها تعتمد على هذه الأقيسة كل الاعتماد . نحن لانستطيع أن نقيس أي شيء قياساً مطلقاً ، لأنه لا يوجد في الكون شيء في حالة سكون ، ومن ثم كان

غير ممكن تعيين حركة جسم متحرك لدينا كاملاً غير مقبوض . فكل ما في ماملنا من أجهزة وآلات يدور مع الأرض ، وهذه تدور حول الشمس ، والشمس تجري لا مستقر لها في هذا الكون العظيم — وهذه الحركات كلها يمكن قياسها نسبياً . ولكن كيف يتحرك الكون ؟ وهذا سؤال لا جواب عنه . على أن نيوتن افترض إزاء ذلك وجود فضاء ساكن ، خارج عن المادة وعن حركتها ، يمكن أن تغيره القوانين كلها نقطة ابتداء . ولقد كان هذا الافتراض في حد ذاته بديهاً لأن القوانين التي انبثت عليه أمكنها الى حد ما أن تفسر حركات الأجرام السماوية تفسيراً كاد أن يكون مقنعاً . غير أن هذا التفسير كان ضعيفاً من وجهين : أولها أنه لم يكن مقنعاً تماماً ، وثانيهما أن الأثير المقول بأنه ثابت لم يمكن العثور عليه عملياً

وفي صدد اختبار مسألة الأثير هذه أجريت في أميركا بحوث بحرية بحثة قام باجرائها سنة ١٨٨٧ الملمان ميكلسن ومورلي Michelson & Morley ، ثم تكرر إجراؤها منذ ذلك الوقت عدة مرات . وكان بحثهما يدور حول إيجاد الزمن الذي تستغرقه الموجات الأثرية في انتقالها من نقطة لأخرى في معملها ، مختارين من تلك الموجات الأثرية موجات الضوء المنظور فلو كان هناك أثير ثابت يمحّر الدنيا عابه فان الزمن الذي يستغرقه الضوء يتوقف على اتجاه سيره . فإذا كان الضوء يسير متجهاً صوب الشرق وكانت الحجرة تدور شرقاً بدوران الأرض حول محورها ، فان زمنه لا يساوي زمن الضوء المنطلق شمالاً ، لأنه لا توجد حركة للحجرة صوب الشمال . والفرق بين الزمنين يشبه من جميع الوجوه الفرق بين الزمن الذي يستغرقه سائح في قطره مسافة ما عبر التيار والزمن الذي يستغرقه في قطعه نفس المسافة ضد التيار . فالواقع أنه توجد حركة نسبية بين الحجرة والأثير ، وهذه الحركة إما أن تساعد الموجة الضوئية وإما أن تعوق سيرها . والواقع أيضاً أنه لا يوجد تمة فرق محسوس بين الزمنين لأن سرعة الضوء أكبر كثيراً جداً من سرعة الأرض وهي تدور حول محورها . ولم يجد ميكلسن ومورلي أي فرق في الحقيقة ، فلم يكن بوسعهما إذ ذاك إلا أن يستنتجا أن القول بوجود أثير ثابت ساكن قول خطأ^(١)

وبعد ذلك بضع سنوات أبدى الأستاذ فترزجرالد Fitzgerald الأيرلندي رأياً كان غريباً جداً ثم صار وجيهاً جداً . قال : ربما كان الضوء يسير بسرعة واحدة في كل من الاتجاهين

(١) ادعى الأستاذ Miller الأمريكي ان هذه النتيجة السلبية لتجربة ميكلسن ومورلي كانت بسبب خطأ الارصاد والقرارات ، وانه أجراها بمقياس تداخل حساس فوصل الى نتيجة ايجابية . ولكن العلامة إدينجتون Eddington دحض أقواله دحضاً لم يترك شكاً . ولعل خير ما يذكر هنا هو قول الدكتور أندريد Dr. Andrade استاذ الفيزياء في جامعة لندن في كتابه « ميكانيكية الطبيعة » بعد ان أورد التجارب الجديدة التي أجريت في هذا الصدد قد قال « لا حركة للأرض خلال الاثير يمكن ادراكها من ثم ، ومعنى هذا انه لا يمكن ان يوجد اثير له خواص اي جسم مادي »

ولكن المسافرتين المتساويتين قد تكونان غير متساويتين . لقد قيسنا حقيقةً وقيل لهما متساويتان
ولكن من الجائر أن قضيب القياس ينكش طوله إذا كان هذا الطول في اتجاه حركة القضيب .
فهو يقلل أن المسطرة التي طولها قدم يكون طولها قدماً إن هي اتجهت صوب الشمال وأقل من
قدم إن هي اتجهت صوب الشرق — أي في اتجاه حركتها مع الأرض ؟ هذا وجه من وجوه
ذلك الرأي الجديد ، والجواب عنه بالإيجاب لا بالنفي . إن قلبي يكون أقصر لو أنه تحرك في
اتجاه طوله ، وقطار السكة الحديدية يكون أقصر وهو متحرك منه وهو ساكن . وهذا الانكماش
أو النقص في الطول لا يمكن إدراكه إذا كانت السرعة عادية من نوع ما نعرفه . على سطح
الأرض ، ولكنها لو كانت ٢٥٠٠ ميل في الثانية لبلغ هذا النقص جزءاً من مائة من الطول
السلكي ، وإذا كانت السرعة ١٦١٠٠ ميل في الثانية وهي السرعة القريبة من سرعة الضوء
لبلغ هذا النقص خمسين في المائة ، وإذا كانت السرعة مساوية لسرعة الضوء أي ١٨٦٠٠٠ ميل
في الثانية لبلغ النقص مائة في المائة أي ينكش الجسم إلى أن يتقدم طوله فلا يرى . على أن
حدوث الانكماش ليس خيالاً كما يبدو ، فالذي يمين طول الجسم إنما هو تلك القوى الكهربائية
الكاثنة ما بين ذراته . وحركة الذرات في الأثير تؤثر بحق في هذه القوى ، فيحدث الانكماش
ومن ثم كان التوازن في الطولين المقيسين

يبد أن مسألة الطول هذه تتضمن نقطة أعمق ، وهي أنه إذا لم توجد لدينا بنات عن
وجود فضاء ثابت — أو أثير ثابت — في الكون ، أي أنه إذا لم توجد نقطة انتساب ثابتة
إليها تناسب الأقيسة فاننا نعجز تماماً عن إجراء أقيسة مطلقة . فمن الصعب بل من المستحيل ،
إيجاد طول قطار متحرك ما لم نعرف سرعته وزمن مروره أمامنا . وإذا كنا في قطار آخر
متحرك بجوار الأول فانه يستصعب علينا إيجاد طوله ما لم نعرف السرعة النسبية للقطارين .
فالطول يمكن حسابه بقياسه إذا عرفت السرعة فقط وهو إذن يتضمن عن طريق السرعة عنصر
الزمن . نحن نستطيع قياس السرعات النسبية بسهولة ، ولذلك نستطيع قياس الأطوال النسبية
أيضاً . ولكننا لا نعرف السرعات المطلقة لأنها لا نعرف السرعات المطلقة لكل من الأرض
والشمس والنجوم . فكانت أولى المسائل التي افقت نظار أينشتاين هي : إن أقيسة الطول المطلقة
مستحيلة ، وأقيستنا جميعها نسبية فقط

ويمكنك أن تدرك بعد أن قياس الزمن تكتشف هذه العقبة نفسها ، فما من حاجة إذن
لمناقشة ذلك . لا يوجد شيء اسمه وحدة الزمن المطلقة . وبمدا علم الفلك بوحدة زمنية ،
ملائمة وثابتة من الوجهة العملية ، كالثانية أو اليوم ، ولكنها في الواقع ناقصة لأن قياس الزمن
يتوقف أيضاً على السرعة التي تتحرك بها الساعة (الآلة) في الفضاء . فالثانية الزمنية والبوصة

الطولية لا يمكن أن تقاسا منفصلتين . نحن نظن أن الزمن والطول عاملان منفصلان تماماً عن بعضهما ولكننا لا نستطيع اليوم في ضوء العلم الصحيح السليم أن نسلم بصحة ذلك ، لأن تأثير السرعة في البوصة أو في الثانية ضئيل يمكن إهماله في جميع الأقيسة الأرضية ، وذلك بالنسبة لضالة السرعة إلا في الحالات النادرة . ففي هذه المجالات العلمية الجديدة ، حيث لا يمكن إهمال ذلك ، يجب أن لا نشير في براهيننا إلى الزمن والفضاء على اعتبار أنهما منفصلان بل إلى مجموعة متصلة منهما هي التي نسميها المتصل الفضازمي

وإذن فمجال القوة الكهربائية المحيط بقلمسي الأنبوس بعد ذلك لا يمكن وصفه بأنه انفعال كهربائي في الفضاء أو في أثير الفضاء ، بل هو انفعال في المتصل الفضازمي . قال العلامة حينئذ في كتابه « الكون الخفي » هذا الصدد ما يأتي : —

إخال من الأنسب أن نعرج كلمة الأثير ظهوراً مراعاةً للمصطلح الجديد « متصل » الذي يقصد به الفضاء ذو الأبعاد الأربعة الذي تخيلناه فعلاً والذي أضيف فيه الزمن إلى أبعاد فضائنا الثلاثة المادية باعتباره بعداً رابعاً

« إن قوانين الطبيعة تفسر الحوادث بدلالة الزمن والفضاء ، فهي بذلك يمكن أن تفسر بالطبع بالنسبة إلى هذا المتصل الرباعي الأبعاد . ومناقشة هذه القوانين كذا وجد من السهل أن تصور كلا من الفضاء والزمن مقيساً بشكل خاص جداً واصطناعي جداً . فالأطوال لن نقيسها بالأقدام أو السنتيمترات بل بدلالة وحدة تبلغ حوالي ١٨٦٠٠٠ ميل ، وهي المسافة التي يقطعها الضوء في ثانية واحدة . ولن نقيس الزمن بالثواني العادية بل بدلالة وحدة محيية غامضة تساوي الثانية مضروبة في $\sqrt{-1}$ ، أي الجذر التربيعي للمقدار السالب — ١ ، ويقول الرياضيون إن هذا المقدار تخيلي لأنه ليس له وجود خارج تخيلاتهم ، وبذلك نكون قد قسنا الزمن أيضاً بشكل اصطناعي بالغ الحد . وإذا نحن سئلتنا لماذا اخترنا طرق القياس السجورية هذه . فالجواب هو لأنها تبدو كأنها طرق الطبيعة نفسها في القياس . وهي على كل حال تمكننا من تفسير نتائج نظرية النسبية على أبسط صورة ممكنة . وإذا نحن بعد ذلك سئلتنا لماذا هذا كذلك فالتا لن نستطيع جواباً سوى ولو استطعنا لأمكننا أن نرى ما هو أعظم وأعوص مما نراه الآن في أقصى حفايا الطبيعة وأسرارها »

قد يبدو سهلاً أن نعرج عنا هذه الآراء على اعتبار أنها آراء ميتافيزيقية (أي فيما وراء الفيزياء) صارية جوفاء ، أو على اعتبار أنها آراء ظنية سائبة باطلة ، لأننا أهملنا الحجة المنطقية الكاملة البعيدة الغور التي تدعم هذه الآراء ونجعلها صادقة لا يمكن الاستثناء عنها . وكان يصح أن يعيرها العالمون التجريبيون بعض العناية لو أنها كانت مجرد استنتاجات منطقية . ولكنهم

وجدوا فيها وجهة نظر جديدة حينما عمم أينشتاين « نظرية النسبية الخاصة » فوضع « نظرية النسبية العامة » التي ظهرت لها نتائج عملية بنفسه . فلقد أبان لهم أنه حتى قوة الجاذبية المجهولة السبب يمكن تفسيرها فيما بسط من آراء ، وأن نظريته يمكن تحقيقها بثلاثة استقبارات تجريبية سنذكرها بعد . فكيف إذن فسرت هذه النظرية الجديدة قوة الجاذبية ؟

عند ما استكشف نيوتن هذه القوة لم يسمه إلا أن يعترف بوجودها وبأنها تخضع لقوانين خاصة — وأن كل جسم مادي في الكون يجذب كل جسم آخر بقوة معينة . وقد بذلت جهود لتفسير هذه القوة ، كأن تكون نوعاً من القوة الكهربائية أو تكون نتيجة لحركة خفية ولكن هذه الجهود قد فشلت كلها . أما لتعليل أينشتاين لهذه القوة فيمنحصر في أن الفضاء ، أو عبارة أصح ، المتصل الفضازمني المحيط بكل جسم مادي ممتلئ متقوس . وهذا الأنواء أو التقوس لا يحيط بالجسم فقط ، بل هو الجسم نفسه ، لا تبتلى نعرف شيئاً عن الجسم إلا عن طريق هذه القوة التي يبدىها ذلك الانواء أو التقوس . ونستطيع دون الاستعانة بالقوانين الرياضية التي لا يمكن شرح النظرية شرحاً وافياً بدونها ، أن نقربها إلى الذهن بمثل توضيحي

نفرض أننا نعيش في دنيا أبسط من دنيانا بناءً — دنيا متألفة من طول وعرض أي من بعدين اثنين فقط لا ثالث لهما كالمق أو الارتفاع . ولنتصور أننا مخلوقات منبسطة مفرطة متحرك في محاذاة السطح فقط ولا نستطيع الابتعاد عنه . فلا يمكن إذن أن تكون لدينا فكرة عن الارتفاع أو العمق ، أي عن « فوق » و « تحت » وعلى ذلك فإذا كانت المساحة التي نوجد فيها مقوسة — محدبة كانت أم مقعرة — فإنا لا نستطيع أن ندرك شيئاً من تكورها . فإذا فرضنا أنه يوجد في هذه الدنيا المنبسطة السطح في نظارنا فجوة صغيرة ضيقة فإن يتسنى لنا أن نتبينها . فكيف يؤثر وجودها فينا إذن ؟ كل ما نلاحظه أننا ننجذ الأشياء تميل إلى الاستقرار في أسفل هذه الفجوة ، وننجذ الأشياء التي تتحرك في اتجاه مستقيم في جهات أخرى من هذه الدنيا نتعرف بشكل خفي مبهم عندما تقترب من هذا الجزء المقوس السطح في الحقيقة . وتبدو لنا الأجسام التي تقترب من هذه النقطة كأنها منجذبة إليها . ولها نحن نشاهد في دنيانا الحقيقية أن كل جسم من المادة يشبه هذه النقطة في أن كل جسم آخر ينجذب إليه . فهل لا يكون ذلك مشابهاً للفجوة غير المنظورة في الدنيا ذات البعدين ؟ إن نظرية أينشتاين تقول بأن السكتل في دنيانا الحقيقية هذه أشياء تشبه أو تقابل تلك « الفجوات » وإنما في دنيا ذات أبعاد أربعة لا ثلاثة لأن الزمن بعد رابع . وبعبارة أخرى إن المادة هي مركز الأنواء أو التقوس في المتصل الفضازمني وتوجد مشابهة أخرى مهمة بين فضاء الكون وبين سطح الكرة . فإذا تحدثنا للحظ المستقيم الموجود بأكملة فوق سطح الكرة إن هو مد ؟ إنه يدور حول الكرة ثم يعود ثانية

إلى النقطة التي ابتدأ منها ولا يمكن أن يتابع الامتداد قدماً إلى ما شاء الله ، لأن نفوس السطح يشيه ويلويه . فسطح الكرة إذن متناهي ولكنه غير محدود ، ويقول أينشتين عن السكون إنه هو أيضاً متناهي ولكنه غير محدود

وإذن فالجاذبية ليست قوة فيزيقية جديدة ، وقد أخفت كلمة « قوة » أصل هذه الجاذبية الذي هو في الحقيقة هندسي لا فيزيقي . أما كنه هذا الأنواء فلا يزال سرّاً خفياً . إنما في الواقع قد اخترعنا نظاماً ذا منطق رياضي ، وهذا النظام قد تخطى الحاجات العملية التي ولدته وأنشأته ولذلك تبدر نتائج هذا الاختراع غريبة أو خيالية إذا نحن حاولنا ترجمتها بمبارات مادية عملية . ويجدر بي أن أفقت النظر إلى أن محاولة التعمق في بحث هذه النظرية تكون عديمة الجدوى إذا لم يتروّد صاحبها بقسط وافر من العلوم الرياضية العالية البحتة والتطبيقية . ولذا أكتفي بتطبيق هذه النظرية على كل ما يمكن من المسائل المادية ، إذ أن ذلك يهد لنا سبيل إدراك حقيقتها الفيزيائية قلنا إن هناك ثلاثة اختبارات عملية لنظرية أينشتين في النسبية . أولها : تطبيق قانون الجاذبية الجديد على حركة الكواكب السيارة . وهنا يحسن بنا الرجوع إلى نيوتن لكي يكون الموضوع أكثر وضوحاً . يقول نيوتن في أول قوانين الحركة التي وضعها إن الجسم المتحرك الذي لا تؤثر فيه قوة ما يتحرك في خط مستقيم ويحفظ بمركانته هذه وبسرعته إلى الأبد . حسن هذا ولكن كيف وصل إليه عملياً ؟ إن لنا أن نجد جسماً لا يكون متأثراً بالقوى ؟ بالطبع لا يوجد هذا الجسم فوق سطح الأرض ، لأن الأرض كتلة هائلة دوارة ، وكل جسم فوقها متأثر بجاذبيتها له وكذلك بالقوة المركزية الطاردة الناشئة من دورانها . وإذن ينتهي بنا الأمر إلى أن قانون نيوتن هذا ليس قانوناً عملياً تجريدياً . وقد قبله العلماء قروناً ، وذلك فقط لأنه ينطبق على ما افترضناه خطأ بخصوص طبيعة الفضاء ، إذ الواقع أننا فرضنا أن هندسة إقليدس تنطبق على الفضاء الحقيقي ونصح بالنسبة إليه

فانظر ماذا حدث نتيجة لتلك الفروضة أننا إذا نظرنا صوب السماء وراقبنا الكواكب السيارة نجد أنها لا تتحرك في خطوط مستقيمة ، فلماذا ؟ يقول نيوتن « لأنها متأثرة بقوى » ويقول بأن مسار حركة الجسم الطبيعية غير المقيدة هو الخط المستقيم . وعلى ذلك إذا وجدنا جسماً لا يتحرك في خط مستقيم قلنا إنه مقيد ، وحتماً وجود قوة ما تجعله ينحرف . فنحن قبل كل شيء نبدأ بحركة لا يمر فيها أحد ونسميها الحركة الطبيعية ، ثم ننهي بعدئذ إلى أن كل الحركات التي نشاهدها تستلزم وجود قوى ، وبعدئذ نفترض هذه القوى لكي نفسر بها هذه الحركات . ما بنا من حاجة إلى القول بأننا لا نحاول أن نقلل من شأن كشاف نيوتن المدهشة ، وإنما نحن نعرض وجهة نظر أخرى قد تكون أدق وأكثر انطباقاً على السكون .

وجهة النظر هذه هي : ان الحركات الحالية للكواكب السيارة هي حركاتها الطبيعية ، ولنا في حاجة إلى « قوى » لتفسيرها : فهي تتحرك على النمط الذي اختارته ، لا لأنها تدفع باستمرار إلى خارج مساراتها الطبيعية بل لأن هذا هو طريقها الطبيعي . ولكنك يا أينشتين تقول إنها لا تتحرك في خطوط مستقيمة . فيجبنا بقوله : نعم إنها لا تتحرك في خطوط مستقيمة لأن الحركة في خط مستقيم تكون طبيعية فقط في الفضاء الاقليدي الثلاثي الأبعاد ، وإذن فلا بد أن يكون فضاءنا غير إقليدي !

فدعنا الآن رأيان : نؤمن يقول إن الفضاء إقليدي ، وإن الحركة الطبيعية تكون في خط مستقيم ، وإن الكواكب السيارة تتحرك في هذا الفضاء الاقليدي ، والسبب في أنها لا تتحرك في خطوط مستقيمة وجود قوة « الحاذية » التي تجذبها نحو الشمس . ويقول أينشتين إن الفضاء غير إقليدي ، وإنه لا حاجة بنا لبراد قوى نفس بها حركة الكواكب السيارة ، وحركتها هذه هي في الحقيقة الحركة الطبيعية في نوع الفضاء الذي توجد فيه هذه الكواكب . فكيف يكون الحكم إذن بين الرأيين ؟ نعود إلى التجربة . فإذا كان أينشتين مصبياً وكانت حركات الكواكب راجعة فقط إلى نوع الفضاء الذي تسبح فيه فإن هذا الفضاء يجب أن يؤثر في كل شيء يمر فيه ولو كان هذا الشيء إحدى الموجات الأثيرية . فشعاع الضوء مثلاً يجب أن يسلك في سيره خلال هذا الفضاء مسلك الجسم المادي ، ولا يمكن أن يسلك غير هذا المسلك . ولقد مررنا أن النظرية تقول إن المادة تؤثر فعلاً في الفضاء المجاور لها فهي تلويه وتقوسه . والتأثير من الضالة بحيث أنه لا توجد مادة أرضية ، ولا الأرض نفسها ، تكفي كلفتها لاهداث هذا الالتواء بشكل يمكن إدراكه . ولكن الشمس تفي وتصلح . فبالقرب منها يلتوي الفضاء كثيراً وتقوس بشكل كبير يسهل إدراكه . وإذن فشعاع الضوء المار بالقرب من الشمس والذي يسير خلال هذا الفضاء الملوي المقوس لا بد أن ينحرف عن الخط المستقيم انحرافاً محسوساً . وقد تبنا أينشتين أيضاً بمقدار هذا الانحراف قبل إجراء التجربة وقبل قياسه عملياً . وحدث فعلاً أن قامت بمئة كبيرة من إنجترات تحت رأس العلامة إدنجتون ، أستاذ علم الفلك في جامعة كمبريدج لاجراء التجربة وذلك بأخذ صور فوتوغرافية للنجوم التي يمر ضوءها بالقرب من الشمس عند حدوث الكسوف الكلي سنة ١٩١٩ . وكانت أينشتين إذ ذاك محجوزاً في ألمانيا زمن الحرب المظلم حيث كان حصار الحلفاء لا يزال قائماً على أشده . وقد كانت النتيجة مؤكدة تماماً لبوءة

ذلك العالم العظيم الذي هو بحق كبير العلماء العالميين في زماننا

وأما الاختبار الثاني نخلص بالتجارب التدريجية في أفلاك الكواكب السيارة حول الشمس فلهركة السيار عطارد ، وهو أقرب الكواكب إلى الشمس ، شذوذات ومتناقضات ما أمكن

تفسيرها عن طريق قانون نيوتن في الجاذبية . ولعلالمالك الفلكيون ستم بخصوص تحليل هذه الشواذ وتفسيرها ولكنهم لم يصلوا إلى تفسير مرضي ، وكانت خير تفسير لها هو ذلك القضاء الأينشتيني المروي المقوس . فالفهم بحسب قوانين نيوتن أن الكواكب السيارة تدور حول الشمس في أفلاك إهليلجية . ولكن أينشتين زاد على ذلك أن مستويات هذه الأفلاك تعاني دورانا مستمرا غير أنه بطيء جدا . وكما كان الكوكب قريبا من الشمس كان مقدار هذا الدوران كبيرا . وكان الفلكي الفريه Leverrier قد استكشف فعلا في أواسط القرن التاسع عشر أن فلك السيار عطارد يدور فيه عرّف مستويه في كل قرن زاوية قدرها ٤٣ ثانية قوسية . فهذا الشذوذ بالنسبة لقوانين نيوتن سبب حيرة الفلكيين وأدى بهم إلى توهم وجود كوكب مجهول بين عطارد والشمس وأن هذا الكوكب هو سبب الاضطراب الحادث في فلك عطارد . ولم يكن أينشتين قد استنتج من نظريته وجود هذا الدوران فقط بل استخرج مقداره ، ووجده مساويا بالضبط ٤٣ ثانية قوسية كل قرن كما أثبتت أرصاد الفلكي لفرير من قبل . فكان هذا أيضا توكيدا صريحا للنظرية

وأما الاختبار الثالث نفاص بالأهتزازات الذرية فقد وجد أينشتين عن طريق نظريته أنه في المادة المتكاثفة جدا تتأثر حركة الالكترونات داخل الذرة بسبب جاذبية هذه المادة فتبطيء حركة رقصها ، وتزاح قليلا جميع خطوط طيف الذرة ناحية اللون الأحمر ، وكان من الصعب اختبار هذه المسألة في طيف الشمس لأن مادتها ليست متكثفة ولا متكاثفة بالقدر اللازم لهذا الإبطاء وتلك الازاحة . ولكن النتائج التي حصل عليها الفلكيون الفيزيقيون حديثا في هذا الصدد قد أثبتت صدق النظرية ، وذلك عن طريق واختبار أطيف النجوم الكثيفة جدا من أمثال زميل نجم الشمري ونجم فان مان وزملائهما من النجوم الأقزام البيض

لم تقف نظرية النسبية عند هذا الحد ، بل إنها مضت تقول إن كتلة المادة التي ترن رطلا مثلا تزيد كلما تحركت وزادت سرعتها . ولكن الزيادة تكون غير محسوسة لأن السرعات الممكنة على سطح الأرض صغيرة جدا نسبيا . وحتى إذا كانت السرعة ٦٧٠٠ ميل في الساعة وهي سرعة الأرض حول الشمس فإن الكتلة التي ترن رطلا لا تزيد إلا بمقدار جزء من مائتي مليون جزء من الرطل ، فإذا ما بلغت السرعة ١٦١٠٠ ميل في الثانية تضاعفت الكتلة أي يصير الرطل رطلين . أما إذا تحركت بسرعة الضوء فإن الكتلة تزيد زيادة لا نهائية . وهنا لا أرى بأسا في الإشارة إلى وجود نماذج من جسيمات تسير بسرعات هائلة . فلا شمة المهبط مثلا ولبعض الجسيمات المنطلقة من الراديوم ، كما مر بنا في الفصول الماضية ، سرعات أكبر كثيرا من السرعات المعروفة لنا في حياتنا العملية . وقد استطاع علماء الفيزياء حساب الزيادة في كتل

هذه الحسيمات بسبب سرعتها . وقد أبدت آنتانج نظرية أينشتاين ، ولو أننا كنا نعيش في دينا تكون السرعات فيها مقاربة لسرعة الضوء لكننا عرفنا من زمن طويل كل شيء بقول به هذه النظرية ، وما كنا وجدنا فيها إلغازاً أو تسمية بل كنا وجدناها عادية ما أمكن

لم يبق بعد ذلك إلا نتيجة أخرى للنظرية وهي الفائلة بأن المادة نوع من الطاقة (١) . ولقد جرت العادة أن نقول عن الطاقة إنها صفة من صفات المادة أو الأثير ، فلا أجسام أو الحسيمات التي تكون في متناولنا نستطيع أن نكسبها سرعة أو نشحنها بقدر من الكهرباء أو نضبطها فنكسبها بذلك طاقة . ولم تكن نعلم من قبل أن الحسيمات المادية إنما تمثل لنا طاقة متجمعة متكاثفة . ولكن انضح في ضوء نظرية أينشتاين أن هذه الطاقة موجودة غير أنها كاملة ، وأن مقدارها عظيم هائل . ولكي نعرف مقدار الطاقة التي يمثلها جزء من المادة ما علينا إلا أن نضرب كتلته في مربع سرعة الضوء . فالف بروتون تكافئ إرجاً ونصف إرج ، وتحتوي الأوقية من المادة على كمية من الطاقة كذلك التي تمدنا بها آلة قدرتها ألف حصان في مدة سنتين ونصف سنة . وطاقة الضوء الشمسي الساقط على ياردة مربعة مثلاً باستمرار لمدة سنتين تعادل مليجرام من المادة — وربما استحوالت مادة بعملية كونية غير معروفة . وتغرق طاقة المادة الكامنة هذه بمراحل طاقة الراديو أو طاقة الالكترونات المنخرجة بسرعات هائلة داخل الذرة . إن المادة مخزن للطاقة قد يفتح لنا في مقبل الأيام . « وبأبادة نقطة واحدة من الماء تزود لمدة سنة بقدرة مائتي حصان »

وبعد فهذا موجز لأراء أينشتاين تجنبت فيه كل بحث رياضي . فلتنقع به إذ أن تفصيلات النظرية صعبة جداً لا يحيط بها مثل هذا العرض البسيط العام الذي يلائم غرض هذا الكتاب . إن نظرية أينشتاين ترى أنه يوجد ثمت شيء في الطبيعة ذو ذاتية قصوى في السكون ، ولكن النظرية لم تقل لنا عنه شيئاً . وكل ما في الأمر أن العقل قد التقط أحد وجوه هذه الذاتية وتقصده به المادة — فلما التقطه خصه بفضاء وزمن لكي توجد فيهما المادة . وليس كثيراً أن نقول إن السكون المادي كله في معناه هذا قد خلقه العقل الفيزيقي الرياضي

(١) سبق ذكر ذلك في الفصل الثالث الخاص ببناء الذرة



الفصل الثالث عشر

نظرية السكم^(١)

عندما اتصلت مناحي الفيزياء الحديثة بطرق محكمة أدى اتصالها هذا إلى مجالات غير مهيبة ولا خالية من الصعاب والعقبات التي شطرت واحدة منها ، ولعلها أهمها ، علم الفيزياء شطرين وفصلت بينهما يشق عميق . وتلك هي الخاصة بمسألة لم يكتمل حلها بعد ، والتي تبعت في حل الطاقة ذرية في طبيعتها كاللادة ، وفي حل الطاقة التي ينتقلها الجسم متواصلة أو مكونة من رزم منفصلة أو «كلم» والمهمة عميقة فيما نرى ولكنها ضيقة أيضاً ، وقريباً تقام جسور لمرها فتتم بذلك معلوماتنا عن عجائب المادة والفضاء

« روبرت لانون »

عرفنا تماماً ما بنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب أن المادة تتألف من وحدات صغيرة هي الذرات، وأن هذه بدورها تتألف كما تتألف الكهربائية من جسيمات صغيرة هي الإلكترونات السالبة الكهربائية والبروتونات الموجبة الكهربائية ، وأن الذرة متعادلة لأن عدد ما بها من البروتونات يساوي عدد ما بها من الإلكترونات ، ولأن شحنة هذه تساوي شحنة تلك وتضادها . وقد أطلق على عدد الإلكترونات الخارجية غير الموجودة في النواة «العدد الذري للعنصر»^(٢) أما الخطوة التي تلي هذه فأساسها ذرية الطاقة—وهذه الذرية هي لب نظرية السكم لقد مررنا بنا أن الضوء اهتزاز مستعرض في الأثير ، وأن لهذا الاهتزاز طولاً موجياً هو المسافة بين قمتين أو بين قرارين لموجتين متتاليتين . وأن له تردداً خاصاً أي عدداً خاصاً من الموجات في زمن معين معلوم أو مسافة معينة معلومة . ثم جاء كلارك مكسويل فتخيل أن الضوء مجال كهرومغناطيسي متردد مصدره جسم مشحون بالكهربائية ، وأن هذا المجال يتحرك في مادة غير منتظمة . وجاء هرتز بعد ذلك بكشف جديد مكنه من أن يرسل في الفضاء بوسائل

(١) يرى بعضهم أن الانسب تسمية هذه النظرية « نظرية الكمات » ويرى غيرهم تسميتها « نظرية التناذر » ولكن لفظ «السكم» شاع وعم استعماله

(٢) أنظر في آخر الكتاب جدول العناصر مرتبة بحسب أعدادها الذرية

كهربية بحتة موجات لاسلكية لا تختلف عن الضوء في شيء إلا في أن طولها الموجي أكبر كثيراً، ومن هنا كانت ذات تردد أصغر. وتختلف أطوالها الموجية كما سبق أن قلنا من أميال إلى أمتار. ونتيجته بعد هذه سلسلة الأشعة « دون الحمراء » وهي التي تؤدي إلى الضوء الأحمر عن طريق الأشعة الحرارية. وأقصر من الضوء البنفسجي تلك الأشعة فوق البنفسجية التي تؤثر في اللوحة الفوتوغرافية. وأقصر من هذه أشعة إكس التي تولد من اصطدام إلكترونات أشعة المهبط بهدف فلزي ملائم مثبت في جدار أنبوبة أشعة إكس. ومثل هذه الموجات القصيرة « عمرة » كما مر بنا، أي أن قوة فائدها خلال الأجسام الصلبة أكبر من قوة أشعة الضوء العادي. ولقد قلنا إن هذه الإشعاعات جميعها متشابهة في الأصل والجوهر، وأنها تسير بسرعة واحدة ولا تختلف إلا في الطول الموجي فالتردد من ثم. وبين أقصر الموجات اللاسلكية وأقصر موجات أشعة إكس توجد مسافة ضوئية، كالمسافة الموسيقية، تشمل على نحو ثلاثين جواباً، لا يوجد من بينها إلا جواب واحد تتأثر به العين فتدركه، وهو الضوء العادي الذي يحتوي على كل ألوان قوس قزح، من الأحمر فالبرتقالي فالأصفر فالأخضر فالأزرق فالبنفسجي فالبنفسجي حيث بهذا المختصر في الأشعاع لأن نظرية الكم إنما استبطنها العلامة الأستاذ ماكس بلانك Max Planck خلال بحثه في إشعاع الموجات الضوئية المنبعثة من جسم محمي. ويمكن وصف الأشعاع بأنه انتقال الطاقة من ذرات المادة إلى الأثير الذي سبق أن قلنا إنه مقر الموجات الكهرطيسية. وتؤكد نظرية الكم أن هذه الاتصالات لا تحدث متواصلة بل متقطعة خطوة خطوة وأن أصغر قدر منظم في كل خطوة هو الذي يعبر عنه بعبارة « كم الفعل » ويرمز له عادة في الفيزياء بالرمز (هـ). فوحدة الشغل هذه يمكن تفسيرها بأنها مقدار الشغل الذي تنهيه آلة قدرتها حصان واحد في دقيقة واحدة. ولقد أوضحت هذه النظرية الفائلة بأن الفعل يحدث في « هزات » خفيفة صغيرة كثيراً من النقط الغامضة في الأشعاع، وعينت للمقدار العددي لحجم ذرة الايدروجين وللمقدار وحدة الشحنة الكهربائية، وطبقها أينشتين وغيره في دراسة الحرارة الذرية للأجسام. وقد كان أينشتين أول من خطابهذه النظرية خطوة أخرى جريئة مدهشة حيث طبقها على الضوء، ونادى بأن الضوء أيضاً مكون من وحدات أو كوام (١).

وقد أمكن تطبيق هذا الرأي في دراسة ما يسمى « التأثير الكهربائي الضوئي أو الكهرضوئي » الذي يمكن تفسيره وتوضيحه هكذا: إن اللوح الفلزي الذي نفع عليه أشعة الضوء القصير طوله الموجي يطلق في الهواء كهواء كهارب سالبة أي إلكترونات، فيصبح من ثم مشحوناً بالكهربائية

(١) اصطلاح على تسمية هذه « الكمات » فوتونات جمع « فوتون photon » ويرى البعض ان

تسميتها « ضوءات » جمع « ضوءة »

الموجبة . فإذا كان الضوء ضعيفاً انطلقت بعض الإلكترونات فقط ، ولكنها تسير بعد انطلاقتها بنفس السرعة التي تسير بها لو كان الضوء شديداً . ومعنى ذلك أن شدة الضوء لا تأثير لها في سرعة الإلكترونات المنبعثة وإنما يقتصر تأثيرها على عدد هذه الإلكترونات المنطلقة . أما إذا أردنا أن نغير سرعة هذه الإلكترونات المنبعثة فلا علينا إلا أن نغير « لون » الضوء أي تردده . فتردد الضوء إذن يؤثر في السرعة فقط . وقد كان هذا الأمر محيراً لم يكن تفسيره عن طريق معلوماتنا الأولى السابقة في الضوء . ويمكن تشبيه انطلاق الإلكترونات من اللوح الفلزي بانطلاق القنابل من مدفعية . فإذا كانت المدافع قليلة كانت الطلقات قليلة ، ولكن كل طلقة يحتفظ بقوته فينبعث بشظاياها المتناثرة بعد الانفجار إلى عين المسافة التي تصل إليها قنابل مدفعية من صنف الأولى ولكنها تبلغ ضعفها في عدد المدافع . فلتغير نوع الانفجارات يجب أن يغير نوع المدفع أو عياره . والنتيجة التي لا يحصى عنها أن الضوء يصل على هيئة « ذرات » أو « رزم » أو « كمام » تكون أشبه شيء بالقنابل المنطلقة . ويلاحظ أن « الكم الضوئي » هو إحدى وحدات الطاقة لا وحدات الشغل ، وأن حجمه يتوقف على « لون » الضوء . وهو يساوي في الحقيقة تردد الضوء مضروباً في (هـ) التي تسمى أيضاً « ثابت بلانك » لأن مقدارها ثابت كما مر بنا . ومن ثم كانت « رزم » الضوء ذي الطول الموجي القصير والتردد الكبير ، كهذه أشعة إكس مثلاً ، أقوى الرزم وأشدها . وواضح أن فكرة الكم الضوئي هذه بعيدة جداً عن الفكرة القائلة بأن الضوء إهتزاز متواصل في « أمير » متواصل . ومما يجدر ذكره أنه لم ينبجح أحد في التوفيق بين الرأيين

والآن فلنمد إلى صورة المجموعة الشمسية التي رسمناها للذرة ، ولنحاول ترجمة « التأثير الكهرضوئي » في صورة فكرة الكم وعلى أساس هذا التصور . إن الذي يحدث واضح وبسيط جداً ، فالطاقة المحولة إلى ذرات اللوح الفلزي عن طريق إطلاق الضوء عليه تجمل بعض الإلكترونات الدائرة في أفلاكها تتجه في حركتها إلى الخارج مبتعدة عن متناول جذب النواة لها ، فتسبح حرة طليقة في الهواء . ولكن إذا كانت كمام الضوء ضعيفة لا تقوى على ذلك كله فإن عملها يقتصر على زحزحة الإلكترونات من أفلاكها . والواقع أن هذه الإلكترونات تنتقل لحاجة من تلك إلى تلك آخر يكون فيه توازن الجذب أكثر استقراراً وتكون الطاقة أقل مقداراً . وهناك ينطلق فرق الطاقتين دفعة واحدة . فيتولد الضوء طفرة ، ويسير على هيئة كم ثابت لا يقبل التجزئة . وفي هذا الصدد يقول الأستاذ دافيد لاندزبرو طمسن D.Landsborough Thomson أصغر أبناء المرحوم العلامة سير . ج. آرثر طمسن ما يأتي : —

« يقتصر عمل كمام الضوء على أبعاد الإلكترونات الذرات إلى الخارج قليلاً عن نوياتها بحيث

لا يضم بعدها ولا سرعتها عرى ارتباطها الكهربائي بالنوات ، وتكون الذرة عندئذ قد شععت بالطاقة ، ويكون أحد إلكتروناتها قد ابتعد عن النواة أكثر من اللازم ، وتكون أشبه شيء باللوب المنفرط في يد الصبي . فعندما ينكش يعود الإلكترون إلى مقره القديم على الفور ، ولكنه إذ يعمل ذلك يترك اللاثير الطاقة التي يكون قد أخذها منه — أي أنه بعبارة أخرى يشع ضوءاً .

ربما يبدو لأول وهلة أن الإلكترونات تدور حول النواة على أي بعد تريده ، أي أنها تنزاح إلى الخارج أو إلى الداخل إلى أي مدى . ولكن نظرية السك ، على النقيض من نظرية الضوء القديمة ، تحدثنا بأن الأمر ليس كذلك . فالطاقة الضوئية الممتصة أو المنعثة تكون على هيئة مقادير أو كمات متفرقة . وإذن فلا يمكن أن توجد سلسلة متواصلة من أفلاك يصح للإلكترون أن يسبح فيها . ومن هذه الأفلاك الممكنة المتنوعة المتواصلة تنتج نظرية السك أفلاكاً «محبوبة» فيها فقط يستطيع الإلكترون أن يسبح ، وفضلاً عن هذا توجد علاقة عددية بسيطة تربط هذه الأفلاك ، وهي أن طاقة الأشعاع لا تتغير أثيراً منتظماً متواصلاً مستمراً ، وإنما تتغير بمقادير ثابتة لا تقبل التجزئة هي بمثابة وحدات كاملة . فإذا زادت الطاقة أو نقصت كان ذلك بمقدار هذه الوحدة الثابتة أو بأضافها ولا يكون النقص أو الزيادة بحزء منها فنقول «كم واحد» و«كأن اثنان» وهكذا دون ذكر كسور السك حيث لا توجد له كسور . ويكون السك في هذه الحالة «عزم كمية التحرك» أي كتلة الإلكترون مضروبة في سرعته ثم في نصف قطر فلكه وهنا نقف لحظة لتناقش طيف الايدروجين وما عرف عنه . يبعث الايدروجين في القوس الكهربائي ضوءاً إذا ألغص بالاسبكتروسكوب كشف لنا عن مجموعة خطوط ذات طول موجي معين خاص . وهذه الخطوط متباعدة عند نهاية الطيف الحمراء ومتكدسة عند نهايتها البنفسجية . وقد استكشفت حديثاً مجموعات أخرى مماثلة في منطقتي الطيف فوق البنفسجية وتحت الحمراء . ومن نحو خمسين سنة استكشف بالمر Balmer قانوناً به نستطيع حساب الأطوال الموجية لجميع أنواع الضوء الذي يشعه الايدروجين . وكان نصراً عظيماً لنظرية بوهر في الذرة وفي الأطياف أنها أتت بهذا القانون الدقيق عينة من بحوث نظرية بحنة . فذرة الايدروجين هي أصغر ذرة موجودة ، وتتألف من نواة وزنها وحدة الأوزان وشحنتها وحدة الشحن ، يدور حولها إلكترون واحد . فإذا أحيطت الذرة بضوء أو بحرارة فإن الإلكترون قد يقفز في جوفها إلى أعظم فلك في الداخل ، فيشع ضوءاً بعمله هذا . وهذا الضوء يكون ضمن المجموعة فوق البنفسجية ، ويتوقف طول الموجي الحقيقي على المسافة التي يكون الإلكترون قد تقهقر إليها ، وبقدر عدد الخطوط الموجودة في تلك المجموعة من الطيف يكون عدد المسافات أو الأفلاك الممكنة . أما إذا لم يبلغ

الالكترونات أعمق فلك في جوف الذرة ، كأن بلغ الفلك الثاني مثلاً ، فإن الضوء المنبعث يكون من المجموعة الثانية أي المنظورة وهكذا . كل هذا بسيط ولكن توجد نقطتان مهمتان : الأولى أن الالكترونات في أثناء دورانه في أحد الأفلاك بسرعة ١٥٠٠ ميل في الثانية لا يتخلى للأثير عن شيء من الطاقة ولا هو يكتسب منه شيئاً من الطاقة ، فكأنما هو مستقر راکد ، والثانية أن الفقرة من فلك لا آخر تبدو كأنها تحدث فجأة ، أي تكاد لا تستغرق زمناً البتة

فنظرية بوهر هذه في الذرة وفي الأطياف ، وهي التي شرحتها في الفصل الثالث والتي ألخصناها من جديد هنا لازدوم ذلك ، قد توسعوا في تطبيقها في كل منحنى فأنت بنتائج مثمرة جداً أبدتها التجارب في كل خطوة ، وكان منها أن أكسبت العلم قدرة على التنبؤ . وتوسع العالم سمر فيلد Sommerfield في فكرة الأفلاك الالكترونية الدائرية وجعلها تتضمن أفلاكاً إهليلجية فاما طبقت نظرية النسبية كانت النتيجة أن الالكترونات في الأفلاك الأكثر إهليلجية تتحرك بسرعات متغيرة فتغير كتلتها من ثم ، إذ أن الكتلة تتغير بتغير السرعة كما صرنا في نظرية النسبية ويظهر هذا في الطيف على هيئة إنشقاق طفيف في خط الضوء الظاهر يؤلف « بناءً دقيقاً » مكوناً من جملة خطوط تتفق تماماً والنتائج التي حصلوا عليها حسابياً من نظرية النسبية الخاصة وهناك تطبيق آخر لنظرية النسبية في هذا الصدد يفهم منه أن حاصل جمع اثنين واثنين لا يساوي أربعة . فالنقطة أن نواة ذرة الهليوم ، وهي الذرة التي تلي ذرة الايدروجين في الوزن ، تتألف من أربعة بروتونات أي من أربع نويات من نوع نواة ذرة الايدروجين لصقت ببعضها واندمجت بأحكام شديد . ولكن الأمر المثير هو أن وزن ذرة الهليوم أقل قليلاً من وزن أربع ذرات إيدروجين . والمظنون أن الاتحاد الرباعي في نواة ذرة الهليوم يحدث ويستقر بعد بذل جزء قليل جداً من الطاقة ، في حين يكون للوحدات الأربع المنفصلة طاقة أكبر ، ومن ثم تختم أن يكون لها وهي منفصلة مجموعة كتل أكبر كما رأينا . وإنما في الحقيقة كذلك . وما أشبه ذلك بنقص حجم مزيج من الكحول والماء عن مجموع حجميهما منفردين . ولكن لتليل النقص في الحجم معقول ، أما لتليل النقص في الوزن فأمر محير حقيقة

على أن أعجب نتائج النظرية هي تلك التي استخلصها بوهر وسماها « قاعدة المقابلة » بين نظرية الضوء القديمة ونظرية الكم الجديدة . لقد سبق أن قلنا إن هاتين النظريتين متباينتان ، ولكن من الجائز مع ذلك أن تصور ذرات إلكترونات يتحرك في فلك كبير جداً بحيث يكون الضوء المنبعث منها واحداً سواء حسب مقداره عن طريق النظرية الجديدة أو القديمة . ولاحظ أن هذه حالة لا يمكن تحقيقها في الواقع . فإذا نرى ؟ نرى أن النظرية القديمة تسمح لنا بإجراء بعض حسابات عن شدة الضوء المنبعث وعن مسلكه ، ولكن النظرية الجديدة لا تسمح .

فما نفع ذلك إذن في حالة تمهيلية بحثية ؟ وهنا تؤكد لنا قاعدة المقابلة هذه أن تبادل النظريتين الذي أمكن تبرره في الحالة التخيلية النظرية يكون صحيحاً بحق في كل حالة ممكنة . والأصحح : من هذا كله أن هذه الحسابات المبنية على هذا الفرض تتفق تماماً مع كل من التجربة والبحث النظري الناقص المبني على نظرية الكم فقط . ومن ذلك يظهر أنه يصبح لنا أن نستخدم إحدى النظريتين لمساعدة الأخرى إن قامت في سبيل هذه بعض الصعاب . والخلاصة أن الرأيين القديم والحديث بخصوص الضوء لا يختلفان معاً ، ولسكنهما فقط يسيران في اتجاهين مختلفين . أما كيف يحدث ذلك فأمرٌ نجهله ، ولكن ما أشبهه برؤية منظر واحد من نقطتين مختلفتين والحق توجد مشاكل لا تزال قائمة ، وحلها موكول للجهود العلماء في المستقبل . ولكن هذا لا يمنع أن نقول إن في تلك الفروض قسطاً وافراً من الحقيقة . على أن استمرار العلماء في البحث والدرس والتفكير مع النظريات الحديثة إلى النهاية هو وحده كفيل بإظهار الحق من الباطل . ويحسن أن نختم هذا الفصل بكلمة قالها العلامة إدنجتون في كتابه « الفضاء والزمن والحاذية » لحص فيها مركز نظرية الكم أحسن تلخيص . قال : —

« تنحصر الحقيقة الفيزيائية في تركيب كل ما أمكن تركيبه من الأوجه الفيزيائية للطبيعة . ويمكن أن نضرب لذلك مثلاً توضيحياً نأخذ من ظواهر الطاقة المشععة أو الضوء . ففي ظواهر كثيرة جداً يبدو الضوء المنبعث من الذرة على هيئة سلسلة أمواج منتشرة . وفي ظواهر أخرى كثيرة أيضاً يبدو الضوء كما هو حزمة صغيرة من الطاقة التي يمكن أن تقتحم ذرة واحدة فتسبب انفجارها . وقد يكون في هذه الاستنتاجات التجريبية بعض الضلال ، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فيجب الجهر بأن الحقيقة الفيزيائية المفسرة للضوء تقتضي أن يكون بناء تركيباً ما ، يجمع ما بين هذين المظهرين . أما كيف يكون ذلك التركيب فذلك ما حارث فيه العقول والأفهام إلى يومنا . غير أن الدرس الذي نستخلصه هو أن الوصول إلى الحقيقة إنما يتم حينما تتحد جميع وجهات النظر المفهومة المعقولة »



الفصل الرابع عشر

الميكانيكا الجديدة

ترسم الميكانيكا الموجية الجديدة التي وضعها شروينجر صورة لجوف الذرة تختلف عن الصورة البسيطة التي رسمتها نظرية بوهر، بل نراها ملئت عليها وحلت بسرعة محلها. وحق الكترون هذه الميكانيكا يختلف أيضاً شكل الاختلاف عن الكترون نظرية بوهر القديم. وهو لا يكون كهذا الالكترون القديم الا حينما يكون فقط على مسافة لانهائية من النواة. أما حينما يقترب من هذه النواة تدريجياً فإنه يعاني انقلاما تخليقياً من نوع لم ينتج أحد قط في تفسيره

« حينئذ »

تتماز السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر بظهور النظرية الالكترونية، وتماز السنوات العشر الأولى من القرن العشرين بظهور نظرية النسبية، والسنوات العشر الثانية بظهور نظرية الكم. أما السنوات العشر الثالثة من القرن العشرين فتتماز بظهور الموجات المادية وما ترتب عليها من انشاء الميكانيكا على أسس جديدة

ولقد كان من آثار نظرية الكم أنها أبرأت نظرية الضوء الموجية من عيوبها، وأظهرت في الوقت ذاته أن نيوتن لم يكن مخطئاً كل الخطأ في اعتباره الضوء متألفاً من دقائق كرية، حيث أثبت أن حزمة الضوء يمكن اعتبارها مجزأة إلى وحدات منفصلة قائمة بذاتها اسمها « كم ضوئية » أو « فوتونات » وأن هذه الوحدات تشبه همرة المطر انقسمت رذاذاً، أو وبلاً من الطلقات تفرقت فصارت قطعاً رصاصية صغيرة منفصلة، أو غازاً تاثرت جزئياته

ومن عجب أن الضوء في الوقت عينه لا يفقد ميزة التوج، فكل رزمة ضوئية لها من هذا التوج قدر معين، هو طول خاص يقرن بها ونسميه نحن « الطول الموجي » وذلك لأن هذا الضوء يسلك إذاً مساراً من خلال منشور زجاجي مسلك الموجات التي لها هذا الطول الخاص. ويتألف الضوء ذو الطول الموجي الطويل من رزم صغيرة، ويكون مقدار الطاقة الموجودة في كل رزمة متناسباً تناسباً عكسياً مع هذا الطول الموجي، أي أننا نستطيع دائماً أن نحسب طاقة الفوتون من طول موجته، والعكس بالعكس، وبصعب علينا هنا أن نلخص جميع البيانات التي أثبتت عليها

هذه الآراء ، ولكنها كلها دون استثناء تدل على أن الضوء يسير ، كما كشفته الأجهزة الدقيقة ، على هيئة فوتونات غير مجزأة ، ولم تكشف المشاهدات والمجارب كلها عن وجود كسر من الفوتون ، بل إنها لم تشر حق إلى ما يدل على توقع حدوث هذه التجزئة . واليك ملين مثالان الأمر كله

الأشعاع إذا كانت ظروفه مؤاتية يمكنه أن يحجز في الذرة التي يصدمها . وقد كشف البحث في الذرات المجدوعة ، أي التي فقدت بعض إلكتروناتها ، عن مقدار الطاقة التي أطلقت على كل ذرة محزتها . وقد ثبت ثبوتاً لا شك فيه أن هذه الطاقة تسدل بالضبط طاقة فوتون واحد ، وذلك بناءً على الحساب المؤسس على طول الموجي المعروف . فكأنما جيش من الضوء التي يحبس من المادة . وقد صرنا بنا أن الجيش الأول جنوده الفوتونات ، وأن الثاني جنوده الذرات . والغريب في أمر هذه المبركة أن الصراع فيها كان جدياً لجدي

والمثل الثاني أن الأستاذ كمبرتون Compton الشيكاني درس حديثاً ما يحدث حينما تنساقط إشعة إكس على الإلكترونات . فوجد أن الأشعاع يتفرق تماماً كما لو كان متألفاً من جسيمات مادية من الضوء — أي من فوتونات — تتحرك على هيئة وحدات منفصلة ، وكانت الجسيمات هذه المرة كالمصاص المنطوق في ساحة الحرب فأصابت كل ما عترضها من الإلكترونات . وقد أمكن من مدى انحراف الفوتونات الفردية عن طريقها عند حدوث هذه المصادمات حساب طاقة الفوتون ، فوجد للمرة الثانية أن قدر هذه الطاقة يتفق وقدرها المحسوب من طولها الموجي فهذا الرأي القائل بعدم قابلية تجزئة الفوتون يدفع بنا من جديد إلى حالة اللبس وعدم الثبوت . وذلك لأنه لأنه أمكن في مجارب أخرى أن تنقسم حزمة الضوء قسمين يسلك كل منهما طريقاً يختلف طريق الآخر . فإذا ما تضاعفت الحزمة فصارت فوتوناً واحداً فأنها لا بد متبعة هذا الطريق أو ذاك ، ولا يمكنها أن توزع نفسها على الاثنين معاً لأن الفوتون لا يمكن أن يتجزأ فاختيار الفوتون طريقه إذن شيء احتمالي لا يقيني

ومن ثم يبدو لنا أن نظرية الدقائق والنظرية الموجية مخطئتان كلتاهما أو مصيبتان كلتاهما . والحق أن الضوء ، بل الأشعاع بجميع أنواعه وصيغه ، جسيمات وموجات في آن واحد . ففي تجربة الأستاذ كمبرتون يسقط الأشعاع الأكسي على الإلكترونات المفردة ، ويسلك مسلك واحد ، وفي تجربة لاون Laue وبراج Bragg وغيرها يسقط نفس الأشعاع على البورة الجامدة ويسلك مسلك الموجات المتعاقبة . وسين في الطبيعة أن يقد الأشعاع كلا من الجسيمات والموجات في وقت واحد . فهو يسلك مسلك الجسيمات آنأ ، ومسلك الموجات

آناً آخر، وليس هناك ثمة قانون عام يستطيع أن يحدد لنا المسلك الذي يتخذه في أية حالة خاصة وواضح أننا في هذا الصدد لا نستطيع أن نحفظ للطبيعة بوحدتها وانسجامها إلا إذا افترضنا أن الجسيمات والموجات شيء واحد في الجوهر. وهذا يصل بنا إلى النصف الثاني من قصتنا، وهو النصف الأكثر إثارة لدهشتنا. فنصفها الأول الذي انتهينا من سرده ينحصر في أن الأشعاع يمكن أن يظهر آنًا على هيئة موجات وآنًا على هيئة جسيمات. والواقع أنه قد استكشف حديثاً أن طبيعة الإلكترونات والبروتونات اثنتان كطبيعة الأشعاع. فالإلكترونات والبروتونات تبدو أن أيضاً على هيئة جسيمات وعلى هيئة موجات في آن واحد.

حينما أفسحت نظرية الدقائق التي وضعها نيوتن الطريق لنظرية التموج صار من الضروري تفسير كيف أن الموجات في تماقيها تشبه وإبلاً من الجسيمات فتتحرك في خط مستقيم إلا إذا انحرفت عن مجراها منعكسة أو منكسرة. فإذا كانت حزمة ضوء الشمس المنطلقة من شق في مصراع متألفة من موجات فطبيعي أن توقع انتشارها في الحجرة كلها كما ينتشر البرق فوق سطح مستقيم من الماء بأكمله، أو كما تنتشر حزمة الضوء الرفيعة جداً من ثقب صغير، أي على شكل حلقات حيود. ومع ذلك فقد أثبت كل من ينج Young وفرنيل Fresnel أن سلسلة الموجات المتعاقبة غير المضطربة ذات السعة الكافية يمكن أن تتحرك على هيئة حزمة لا تنوءات جانبية فيها — فكأنها حمرة من جسيمات تتحرك طواعية واختياراً — وتنعكس مرتدة من سطح مرآة بنفس الطريقة التي يرتد بها المقذوف إذا ما أصاب سطحاً يابساً. وقد ثبت أيضاً أن مثل مجموعة الموجات هذه تنكسر خاضعة لقوانين الانكسار في الضوء. وأخيراً إذا سارت مثل هذه المجموعة خلال وسط تغير باستمرار قدرته الكاسرة فإن طريقها يشبه طريق الجسم الذي يدفع إلى الانحراف عن مساره المستقيم بوساطة قوى تؤثر فيه باستمرار.

وعلى ذلك فما نستطيعه جسيمات نظرية الدقائق نستطيعه مجموعة الموجات المتعاقبة. بل أننا في كل حالة نتحقق فيها الجسيمات نجد مجموعة الموجات تنجح كل النجاح. وبهذه الطريقة تكون جسيمات نيوتن المفترضة قد تحولت إلى مجموعات

وفي السنين الأخيرة تحولت أيضاً الجسيمات المكونة للمادة العادية — ونقص هذه الجسيمات الإلكترونات والبروتونات — إلى مجموعات من الموجات على هذا النمط السابق. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في الفصل الثالث. فقد وجد في حالات كثيرة أن مسلك الإلكترون أو البروتون معقد لا يمكن تفسيره بأنه حركة جسيم، ولذا حاول لويس دي بروي Louis de Broglie وشروودنجر وآخرون تفسيره بأنه مسلك مجموعة من الموجات، فوضعوا بمحاولتهم هذه أساس فرع جديد من فروع الفيزياء الرياضية هو المعروف الآن باسم «الميكانيكا الموجية»

إننا إذا راقبنا كرة الصبي العادية وهي ترتد واثبة من سطح الأرض وجدنا حركتها مشابهة لحركة جزمة ضوئية انكسرت من سطح مرآة . فالكرة إذن ترتد أو تنكس من سطح الأرض . أفلا يسمح لنا هذا بأن نصف الكرة بأنها مجموعة موجات ؟ يقول جينز إنه يسمح بلا شك ، ولكننا لا نريده لأننا لا نرى — أو نظن أننا لا نرى — إلا شيئاً واحداً وهو أن كرة الصبي ليست مجموعة موجات

على أن الأمر يكون غير ذلك لو أن الجسم المتحرك لم يكن كرة بل كان إلكترونات . وإذا كان قد لوحظ أن حركة الإلكترون المرتد من السطح تشبه مجموعة الموجات فليس ثمة ما يحول دون احتمال أن يكون الإلكترون مجموعة موجات . ولا يستطيع أحد بعد أن يقول : « هذا غير مهم ، لأنني أستطيع أن أرى الإلكترون فهو لذلك لا يكون مجموعة موجات » لأنه لم يرَ أحد قط إلكترونات بالذات ، وليست لدى أي إنسان فكرة ما عن شكله . وعلى ذلك كان لنا أن نعبر الإلكترون مجموعة موجات ، وأن نعبر دقائق نيوتن الصغيرة مجموعة موجات كذلك . ولكي نثبت أن الإلكترون في الواقع مجموعة موجات يجب أن ننود إلى الظواهر التي يختلف فيها مسلك الجسم الصلب عن مسلك مجموعة الموجات ، وقد وجد أن الإلكترون في كل حالة يسلك مسلك مجموعة الموجات . وهناك ظاهرة خاصة هي ظاهرة همرة الإلكترونات المرتدة من لوح فلزي ، فهذه الإلكترونات لا ترتد كما ترتد همرة البرد أو كرات اللعب ولكنها تحدث جيوداً يشبه الجيود الحادث من مجموعة الموجات ^(١) . وهذا بطبيعة الحال لا يدل على أن الإلكترون متألف بالفعل من موجات ، ولكنه يدعو على الأول إلى التساؤل عما إذا كانت مجموعة الموجات لا تمدنا بصورة للإلكترون أحسن من الصورة التي تمدنا بها الجسم اليابس أو هي تمدنا والواقع أنها تمدنا بصورة ما أخفقت قط في البناء عن حقيقة مسلك الإلكترون ، في حين أن القول بأن الإلكترون كالجسم الصلب قد أخفق في كثير من الحالات

وقد برهن الميكانيكا الموجية الجديدة على أن الإلكترونات أو البروتونات المتحركة لا بد أن يسلك كما تسلك مجموعة موجات ذات طول موجي معين . وهذا يتوقف على كتلة الجسم المتحرك وعلى سرعة حركته ، ولا يتوقف على غيرها . أما الأطوال الموجية المنسوبة للإلكترونات والبروتونات المتحركة في أجهزة المعامل طوعاً لظروف خاصة فيمكن قياسها بسهولة بأجهزة خاصة وقد أجرى دافيسون وجرمر Davisson & Germer بأمركا والأستاذ ج. ب. طمسن G. P. Thomson بأبردين وروب Rupp بألمانيا وكيكوشي Kikuchi باليابان ودوفيليه

(١) تبدو الإلكترونات في الصور الفوتوغرافية كالجسيمات إذا هي اخترقت غازاً ، وكلوجات إذا هي اخترقت فلزاً رقيقاً أو ارتدت منه . وتكون في الحالة الثانية مشابهة تماماً لصور الفوتوغرافية لجيود الجزمة الضوئية

Dauvillier فرنسا ، تجارب على انكسار الالكترونات وانكسارها . وقد كانت تطلق الالكترونات المتحركة في هذه التجارب على سطح فلزي أو خلاله كما تطلق الخزمة المتوازية ثم تؤخذ لكل حالة صورة فوتوغرافية . ولم يكن تأثير اللوحات الفوتوغرافية مشابهاً لتأثيرها في حالة ما إذا سلكت الالكترونات مسلك وابل من الخردق الصغير أو من أية جسيمات أخرى جامدة . فقد كانت الصور التي حصلوا عليها صور حيود متألفة من مجموعة حلقات متحدة المركز، مضبوطة ثم مظلمة على التبادل . وكان الصور صور موجات ذات طول موجي معين سقطت على الفاز . ولما قيس الطول الموجي وجد أنه مساوٍ بالضبط للمقدار الذي تنبأت به قوانين الميكانيكا الموجية . وحديثاً نيج الأستاذ ا. ج. دمبستر A. J. Dempster الفيزيائي في الحصول على ذلك بالنسبة للبروتونات المتحركة

فهذه التجارب وغيرها قد أظهرت أن الموجات والأطوال الموجية المقترنة بالالكترونات والبروتونات المتحركة شيء أكثر من الحرافة البحتة على الأقل . إنها أسفرت بلا نزاع عن شيء ذي طبيعة موجية . أما الصورة التي أظهرت الالكترونات والبروتونات المتحركة على هيئة مجموعات من الموجات ففسر مسلك هذه الالكترونات والبروتونات ، سواء أكانت في داخل الذرة أم في خارجها ، تفسيراً أحسن من تفسير الصورة القديمة التي اعتبرت الالكترونات والبروتونات مجرد جسيمات من الكهرباء

نستطيع أن نحمل ما مضى بأن نقول إن مكونات المادة ، وهي الالكترونات والبروتونات ثم الأشعاع ، تنكشف لنا عن طبيعة مزدوجة ، وما دام العلم يتناول الظواهر الكبيرة المدى فالصورة الطيبة التي يرسمها المادة والأشعاع لا يمكن الحصول عليها إلا إذا فرضنا أنهما يتألفان من جسيمات ولكن إذا ما اقترب العلم من الطبيعة ومضى في دراسة الظواهر الصغيرة المدى فإنه واصل حتماً إلى أن المادة والأشعاع يتجلان إلى موجات

فاذا أردنا أن نفهم طبيعة الأشياء الأساسية وجب أن نوجه أنظارنا صوب هذه الظواهر الصغيرة المدى ، ففيها نخفي الطبيعة القصوى للأشياء حيث لا نجد أماناً إلا في موجات

وعلى هذا الخط بدأ الفيزيقيون يشبهون في أننا نعيش في كون من الموجات ، ولا شيء غير الموجات . وفيما مضى ما يكفي لأن نلاحظ أن العلم الحديث قد انتهى منهجاً جديداً قاطعاً كثيراً عن الرأي القديم القائل بأن الكون ليس إلا مجموعة من قطع مادية جامدة تبد موجات الأشعاع كأنها ساقطة عليها عرضاً وعن غير قصد

سبق أن قلنا إن التأثير المقول بأنه مقر الاشعاع بملأ رحاب الفضاء ، فهو ذو أبعاد أربعة

أحدها الزمن . أي أنه توجد أربعة أبعاد للأثير الذي فيه تسير الموجات الموائفة للإلكترون واحد منزول في الفضاء . وقد يكون هذا الأثير مشابهاً للأثير الأول ، وقد يكون غير مشابه له . ولكنهُ يتفق معه في أن له ثلاثة أبعاد مكانية وبعداً زمينياً رابعاً . غير أن الإلكترون الواحد المنزول في الفضاء يدنا بكون عديم الحوادث ، وأن أبسط ما يمكن أن يقع فيه من الحوادث حادث تلاقي إلكترونين ، فلكي تصف الميكانيكا الموجية ما يحدث عندئذ أبسط وصف زاهنا نقول بوجود مجموعة موجات في أثير ذي سبعة أبعاد ، ستة منها مكانية — ثلاثة اسلك إلكترون — وواحد زمني . ولكي تصف تلاقي ثلاثة إلكترونات يحتاج الأمر إذن إلى أثير ذي عشرة أبعاد ، تسعة منها مكانية — ثلاثة لكل إلكترون — والعاشر زمني . ولولا ذلك البعد الزمني الذي يربط الجميع ممّا لو جدت الإلكترونات في أفضية ثلاثية الأبعاد منفصلة غير متصلة . وإذن فالزمن يشبه ملاط البناء حيث أنه يصل ما بين لبنات المادة ويجزئها جزماً . أو بمباراة أخرى ربما كانت أقرب إلى الواقع كما يقول جينز « إن الإلكترونات أمور ذهنية ، والزمن هو عملية التفكير فيها »

ويتفق معظم الفيزيقيين على أن الفضاء السباعي الأبعاد الذي تصور فيه الميكانيكا الموجية تلاقي إلكترونين خيالي محض ، ومن ثمّ وجب أن تعتبر الموجات التي تصاحب الإلكترونات خيالية أيضاً . وهنا يقول شرودنجر فيما كتبه عن الفضاء السباعي الأبعاد « إنه على الرغم من أن له معنى فيزيقياً معيناً إلا أنه لا يمكن القول بوجوده ، ومن ثمّ فالحركة الموجية في هذا الفضاء لا يمكن أن يقال عنها إنها موجودة بالمعنى المادي المقصود من الكلمة . إنه في الحقيقة مجرد وصف رياضي (مائتمتي) دقيق لما يحدث . وكذلك لا يتجسم في حالة الإلكترون المنفرد وجود الحركة الموجية بالمعنى الحرفي أيضاً مع أنه قد وجد أن الفضاء المنخيل المقول به ينطبق على الفضاء المادي في هذه الحالة البسيطة الخاصة »

يصعب علينا أن ننسب لأحدى مجموعتي الموجات درجة من الصحة أقل من درجة الأخرى ومن البله أن نقول إن موجات الإلكترون الواحد حقيقية في حين تكون موجات إلكترونين خيالية . وقد ظهر من التصوير الفوتوغرافي لموجات الإلكترون الواحد أنها جد حقيقية حيث أوجدت لنا طبقات حيود . ولكننا نستعيد الاتزان والتوافق الكاملين إذا نحن فرضنا أن جميع الموجات سواء في الصحة والبطالان ، بقطع النظر عن كونها موجات إلكترونين أو إلكترون واحد أو موجات لوحة الأستاذ طمس الفوتوغرافية

ويقول جينز إن بعض الفيزيقيين يرون معالجة هذا الموقف بأن يعتبروا موجات الإلكترون موجات احتمالية . فمئذ ما تتكلم عن موجة مادية مثلاً فأتانا نقطع بوجود موجة مادية من الماء

تبلل كل ما يمرضها . وحينما تتكلم عن موجة حرارية فالتا نقصد شيئاً يسخن كل ما يمرض طريقه على الرغم من أن الموجة الحرارية غير مادية . ولكن حين تتكلم الجرائد مثلاً عن موجة انتحار فهي لا تقصد أن كل شيء في طريق الموجة يخرج إلى الانتحار، وإنما هي تقصد فقط أن ميله إلى ارتكاب ذلك يتزايد . فإذا مرت موجة انتحار ببلد مثلاً ارتفعت فيه نسبة الموت من الانتحار، ولكنها إذا مرت بحضرة رومبسن كروزو أو حي بن يقظان فإن احتمال أن هذا الساكن الوحيد يقتل نفسه قد يرتفع أيضاً . فالموجات التي تمثل إلكتروناتاً واحداً في نظر الميكانيكا الموجية لا تخرج عن كونها موجات احتمال تعين شدتها في أي نقطة درجة احتمال وجود الإلكترون في هذه النقطة

وعلى ذلك فنجد أي نقطة في لوحة الاستاذ طمس الفوتوغرافية الحيوية تعين شدة الموجة درجة الاحتمال التي بها يمكن أن يصيب إلكترون واحد حادثة اللوحة في هذه النقطة . فإذا ما جاد جمع بأكماله من الإلكترونات فالعدد الكلي للإلكترونات التي تصيب أية نقطة يتناسب بطبيعة الحال مع درجة احتمال إصابة كل إلكترون بمفرده هذه النقطة ، وبذلك يعطينا اسوداد اللوحة مقياس الاحتمال لكل إلكترون

ولقد كان لوجهة النظر هذه خطرهما الكبير حيث أنها مكنت الإلكترونات من الاحتفاظ بذاتيتها . فإذا كانت الموجات الإلكترونية موجات مادية حقيقة فإن كل مجموعة موجات تكون عرضة لأن تشتتها التجربة ، فلا يمكن أن تبقى في الوجود جسيمات متكهربة كذلك الموجودة في الحزمة الحادثة . والحق أن كل مهاجمة للمادة تنتهي إلى تجزئة الإلكترونات ، ومن ثم لا يمكن اعتبار هذه أبنية ثابتة مستديمة . على أن همزة الإلكترونات - لا الإلكترون الواحد - هي التي تحيد فعلاً بالطبع ، أما الإلكترونات المنفردة فتتحرك كما تتحرك الجسيمات وتستبقى ذاتيتها وشخصيتها على هذه الصورة

ويتفق هذا كله مع « قاعدة عدم الحزم » أو « قاعدة عدم الثبت »^(١) التي قال بها هايسنبرج Heisenberg والتي تجمل من المستحيل علينا أن نقول مثلاً : إن هذا الإلكترون هنا ، في

(١) هي المسماة بالإنجليزية principle of indeterminacy أو uncertainty principle وهي التي تدل كما يقول هايزن « على أنه مادامنا نستطيع غزو الطبيعة بالفوتونات الكاملة فقط فإنه لا أمل البتة في الحصول على معلومات مضبوطة تماماً بخصوص كل من الزمن والنقطة . فالضبط في أحدهما إنما يحصل عليه على حساب عدم الضبط في الآخر . اننا نستطيع فقط أن نمنع ونخز الحذاء في موضع ما من القدم بجعله يحزه في موضع آخر منه » فكأنما يريد هايسنبرج أن يظهر في قاعدته تلك « أن الطبيعة تكره الضبط والاحكام قبل كل شيء »

هذه النقطة بالضبط ، وانه يتحرك بسرعة كذا أميال بالضبط في الساعة ، إنما نستطيع التكمّل فقط بصيغ الاحتمالات

ويرى Dirac أنه من الضروري بسط عدم الحزم أو عدم الثبوت هذا على الفيزياء الذرية كلها . فهو يقول «عندما نشاهد أية مجموعة ذرية في حالة معلومة فإن نتيجة المشاهدة لا يمكن أن تكون في الجملة معينة محدودة ، بمعنى أنه إذا أعيدت التجربة عدة مرات في ظروف متطابقة فإنه يمكن الحصول على عدة نتائج مختلفة . فإذا أعيدت التجربة عدداً أكبر من المرات فإننا لا نحصل على نتيجة خاصة ما إلا في بعض منها ، فلا يسمع الانسان إلا أن يقول بأن ظهورها في التجارب محتمل . والعجيب أن النظرية يمكننا من حساب هذا الاحتمال . وقد يكون الاحتمال في حالات خاصة مساوياً للوحدة ، وعندئذ تكون نتيجة التجربة محددة معينة تماماً »

ويرى هيسنبرج وبور أن الموجات الالكترونية يجب اعتبارها مجرد تمثيل رمزي لما نرجحه عن حالة الالكترون ومركزه . فإذا كان الأمر كذلك فهذه الموجات تتغير إذا تغيرت معلوماتنا وبذلك تصبح ذهنية على الأكثر . وعلى ذلك فلا حاجة البتة إلى الظن بأن الموجات مقيمة في الفضاء والزمن ، إذ أنها ليست إلا مجرد تخيلات عن الطبيعة الموجية ذات القوانين الرياضية ، ولكن هذه الطبيعة كلها استنتاجية استدلالية تجريبية

وهناك رأي أرجح من هذا استخلص أيضاً من إشارة أبداها بور ، وهو القائل بأن أصغر ظواهر الطبيعة لا ترضى قط أن تمثل في المتصل الفضازمني . وعلى ذلك يكون متصل نظرية النسبية ذو الأبعاد الأربعة صالحاً فقط لبعض الظواهر الطبيعية التي من بينها الاشعاع في الفضاء الطليق والظواهر الكبيرة المدى ، أما الظواهر الأخرى فلا يمكن تمثيلها إلا في خارج هذا المتصل . مثال ذلك قوة الشعور والوعي عند الانسان ، فهذه قوة خارج المتصل . وقد صرنا كيف أن تلاقي إلكترونين يمكن تصويره في سبعة أبعاد ، والمفهوم أن الحوادث التي تحدث في خارج هذا المتصل تعين ما نسميه « بحرى الحوادث » في داخل المتصل . ولا ينشأ عدم التحديد الظاهري الذي تبديه الطبيعة إلا من محاولتنا إرغام الحوادث التي تحدث في أبعاد كثيرة على أن تحدث في أبعاد أقل عدداً . تصور مثلاً نوعاً من الديدان العمياء التي انحصرت مداركها الحسية في سطح الأرض ذي البعدين . ومعلوم أن أجزاء اليابسة قد تبطل وتترطب من آن لآخر . فنحن الذين نفهم عقولنا أبعاد الفضاء الثلاثة نسمي هذه الظاهرة همرة مطر ، ونعلم أيضاً أن الحوادث في البعد الثالث للفضاء تعين بغاية الدقة أي القبط تتبدى وتبطل وأياً بقي جافة . فإذا حاولت هذه الديدان التي لا تشعر بوجود البعد الثالث أن تضع الطبيعة كلها في إطار أو متصل ذي بعدين فهي لا تستطيع أن تستكشف كيف تحدد توزيع البقع الندية والبقع

الخافية . ولا نستطيع الدودة الملمية — إن صححت التسمية — من بين تلك الديدان أن تقاشر بلل المساحات الصغيرة وحفافها إلا بدلالة الاحتمالات التي لا يسع هذه الدودة العلمية إلا أن تعتبرها الحقيقة القصوى . هذا التأويل يتضمن في نظر العلامة حيناً أحسن تفسير للموقف وإن كان زمن البت في صحته لم يأت بعد . وكما أن الظلال الساقطة على جدار رسم في مدين اثنين مسقطاً للحقائق الثلاثية الأبعاد فكذلك تكون ظواهر المنصل الفضازي في مساقط رباعية الأبعاد لحقائق تشغل أكثر من أربعة أبعاد . وعلى ذلك تكون الحوادث في الزمن والفضاء « لا تعدو صفها مستحسناً لأشكال ظلال سحرية تحيي وتذهب أو تظهر ثم تفتيب ^(١) »

رب معترض يقول بأننا أعزنا الميكانيكا الموجية اهتماماً أكثر من اللازم على الرغم من أنها صورة رياضية لا أكثر ولا أقل ، في حين قد تقوم مقامها صور رياضية أخرى لا أعداد لها لا تقل عنها صلاحية وتؤدي إلى نتائج أخرى مخالفة كل المخالفة . وحقيقة ليست صور الميكانيكا الموجية فذة في بابها ، فهناك نظم أخرى دفع بها إلى الميدان هيسنبرج ودراك ، ولكنها تتحدث عن الشيء عنه وإنما بكلمات أخرى أكثر تعقيداً . فما من نظام آخر ابتدع يمكن أن يفسر الأمور بمثل هذه البساطة أو يبدو منطبقاً على الطبيعة متلائماً معها كميكانيكا دي بروجلي وشروودنجر الموجية . وتشهد صور الجيود الفوتوغرافية المختلفة بأن هناك موجات ذات طول موجي معين هي بطريقة ما ، أساسية في منهج الطبيعة وأسلوبها . وهذه الموجات هي المدرك السكلي الأساسي في الميكانيكا الموجية ، أما في النظم الأخرى فتدور فقط كأشياء منتجة ثانوية صعبة الفهم والتقصي . وتبدي الميكانيكا الموجية أيضاً قدرة تنفيذها إلى أسرار الطبيعة متعققة إلى أبعد مما يستطيع أي نظام آخر حتى لقد تفهقرت في هذا الصدد النظم الأخرى وارتدت إلى الوراء

فإذا كان لنا بعد هذا أن نلصق بصورة واحدة ونستمسك بها قلدينا إذن ما يبرر اعتبارنا الصورة التي رسمتها الميكانيكا الموجية، وإن كان كل من نظام هيسنبرج ودراك يضل بنا في الواقع إلى ما يكاد يكون النتيجة عنها . على أن الأمر الجوهرى هو أن جميع الصور التي رسمها العلم

(١) يرى الاستاذ محمد احمد المراوى مدرس الكيمياء بمدرسة الطب ، وكان لحسن الحظ قد اطلع على مسودات هذا الكتاب أن « هذا وما قبله اعتراف بأن الظواهر الكونية ناشئة عن شيء ليسنا فقط نجهله ولكن لن نستطيع أبداً أن نعلمه وإن تفهده . ويظهر ان العلم مقبل على عهد سيضطر فيه الى الاعتراف برأدة من وراء هذا الكون تفعل فيه ما نشاء ، وعندئذ يصبح من مبادئ العلم الاعتراف بالله سبحانه » والواقع ان العلماء العلميين والروحانيين قد اعترفوا بذلك حيث ثبت لديهم علمياً ان هذا الكون لا يمكن ان يكون وليد المصادفة العارضة ، وانه لابد ان يكون من خالق مدبر حكيم هو الروح الاعظم او العقل الاعظم ، هو الله جل شأته

الآن للطبيعة ، والتي تبدو وحدها متفقة والحقائق المشاهدة ، إنما هي صور رياضية بحتة . ويتفق معظم العالمين على أنها صور لا أكثر ولا أقل — هي أخيلة إن شئت وكنت تقصد بالخيال أن العلم لم يلبس بعد الحقيقة القصوى . ويرى كثيرون ، من وجهة نظر فلسفية واسعة ، أن أظهر كشفو الفيزيكا في القرن العشرين ليست نظرية النسبية بادماجها الفضاء والزمن معاً ، ولا نظرية الكم بما تبديه في الوقت الحاضر من إنكار قوانين النسبية أي نوااميس العلة والمعلول ، ولا تجزئة الذرة وما استتبعته هذه التجزئة من أن الأشياء ليست كما تبدو — نعم ليست هذه أظهر كشفو الفيزيكا الحديثة ، وإنما أظهرها في الحقيقة هو إنهاؤها بنا إلى أننا لم نلبس بعد الحقيقة القصوى . وكم كان أفلاطون حكيماً في تشبيهه الموقف حيث قال بأننا لا نزال محبوسين في كهف وظهورنا مولات شطر الضوء ، فكل ما نستطيعه هو أن نرغب الظلال والأشباح على الجدار . وواجب العلم في الوقت الحاضر ينحصر في دراسة هذه الظلال والأشباح ونقسيمها إلى مراتب ثم تفسيرها بأبسط الطرق الممكنة . وكل ما نحن واجدوه في سيل المعلومات الجديدة المدهشة هو أن أوضح طريق طبيعي وأكمله لتفسيرها هو الطريق الرياضي ، أي شرحها بدلالة المدركات الكلية الرياضية . إذ الواقع « أن كتاب الطبيعة الضخم قد كتب بلغة رياضية » ولا يمكن لغير الرياضي في الحقيقة أن يتطلع لأن يفهم تمام الفهم فروع العلم التي نحاول أن نقسر طبيعة الكون الأساسية — وتلك الفروع هي نظرية النسبية ونظرية الكم والميكانيكا الموجية وأرى أن أختم الحديث عن « حاضر الفيزيكا الحديثة » بما ختم به العلامة الألماني الدكتور آرثر هاس Dr. A. Hass كتابه النفيس المسمى « الفيزيكا الجديدة The New Physics » فقد قال : —

« تكشف لنا الفيزيكا الحديثة من ثم عن صورة للطبيعة غاية في البساطة . والواقع أن الطبيعة ليست معقدة ، ولكن الطريق المؤدي إلى معرفتها تمام المعرفة هو المعقد وحده . وهذا الطريق معقد لأنه ابتداء من حدود الحواس الآدمية الضيقة ، وقد نجحت الفيزيكا النظرية تدريجياً في تحرير هذا الطريق من وجهة النظر الآدمية هذه »



القسم الثاني

مستقبل الفيزياء

وفيه ستة فصول

من الخامس عشر الى العشرين

الفصل الخامس عشر

العلوم تتلاقى

ليست الحدود التي تفصل ما بين الفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا
إلا فواصل وقتية ستختفي يوماً ما كما اختفى الحد الفاصل ما بين
الكيمياء والفيزياء

« هربرت دنجيل »

من الأمور التي تخلب العقل وتبعث على الدهشة في تاريخ التفكير العلمي خطور فكرة
واحدة بمقول متفرقة في وقت واحد . والشريب أن هذا التوارد في الخطوط تمديد حدوده
في غير ظرف واحد . مثال ذلك : أن هندسة إقليدس ظلت سائدة مدة ألفي سنة لا ينازعها
منازع ، وقد حدث أن خطر في وقت واحد بمحمد كل من جاوس Gauss ولوبتشفسكي
Lobatschewsky وبوليائي Bolyai ، كل على حدة ، نوع جديد من هندسة أخرى غير
هندسة إقليدس . وكان أن كتب لبوليائي أبوه يستحبه على نشر نتائج بحوثه ، وهو يجهل أن
جاوس قد وصل إلى نفس الكشوف التي وصل إليها ولده ، يقول : —

« الحق يا بني أن الباحثين وهم في عدة أمكنة متفرقة قد يمترون في آن واحد على كثير من
خفايا العلوم وأسرارها . فكأنما هذه الحفايا زهور كزهور البنفسج مثلاً تفتحت زمن الربيع
في كل مكان . فأسرع ما استطعت بنشر ما وصلت إليه من الكشوف »

ومن أمثلة توارد الخطوط هذه ما ذكره دارون Darwin في مقدمة كتابه « أصل
الأنواع » من أنه في غضون ١٧٩٤ — ١٧٩٥ خطرت في آن واحد فكرة تطور الأنواع ،
لا سببها ، لكل من جيته Goethe في ألمانيا ، وسان هيلير St. Hilaire في فرنسا ، ولجد
دارون نفسه الدكتور دارون في إنجلترا . والأعجب من ذلك ما يرويه دارون نفسه من أن
ولاس A. R. Wallace قدم إليه سنة ١٨٥٨ مقالا يتضمن خلاصة وافية لنظرية دارون
نفسه الخاصة بالتخاب الطبيعي باعتباره أهم أسباب تطور الأنواع مع أن دارون لم يكن نشرها بعد
وحدث مثل ذلك في السنين الأخيرة ، فقد ارتأى كثيرون من الباحثين في العلوم ، كل
على حدة ، رأياً لو أنه اكتمل لأحدث تغييراً عظيماً في التفكير العلمي . ذلك أن كثيرين من

العلميين رأوا منذ سنة ١٩٢٧ خلال دروسهم لمسألتي ابتداء الضوء وامتصاصه أن الفيزياء قد اقتربت من مسألة الحياة (١). وقد اقترح غير هؤلاء أنه لكي تصلح الفيزياء من أمس مسائلها الذرية يجب أن تعتمد على شواهد بيولوجية. أما ما هي هذه الشواهد فأمر لم يكن عرف بعد. وسنرضي فيما يلي من صفحات هذا الكتاب إلى منهاج تقدم خاص تيسر الفيزياء على مقتضاه خطوات أخرى إلى الأمام، وسنحاول تفسير تلك الومضات المنفردة التي استتارت بها عقول العلماء — كل بمفرده — بأنها دلائل وبيانات على وجود وجهة نظر جديدة في الحالة الحاضرة للعلوم. والواقع أننا الآن في نهاية ليل عهد كاد يتقوض، وستنفس صبحه عن عهد جديد. إن الفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا قد تلاقت كلها، وانتهى بها الأمر إلى تركيب علمي فذ في أهميته، سيكون له أثر عميق في الفكر وفي الاجتماع بحيث يخطط لنفسه مرحلة في التطور الأدبي. فلقد مضت على العلم سنون ركز جهوده خلالها في دراسة المادة غير الحية، أما اليوم فقد التفت في النهاية العلوم الثلاثة الكبرى عند مسألة الحياة. وذلك لأن بحوث هذه العلوم في المادة والحياة والعقل قد تضافت عن مولود جديد مشترك هو طبيعة العمليات الكهربائية الأساسية التي يبنى عليها الإشعاع والاتحاد الكيميائي.

فالفيزياء في الوقت الحاضر مشغولة بالتغيرات التي تحدث عند ما تنفث ذرة ضوء أو كهربائية (٢) والبيولوجيا مشغولة أيضاً بالمسألة عينها إذ هي تدرس الآن العمليات الكهربائية التي هي أساس التغيرات المصنوعة كلها، سواء كانت في صيغ البروتوبلازمية الأولى أو في المجموع العصبي عند الإنسان. وتبحث السيكلولوجيا في الوقت عينه في نفس المسألة، إذ هي الآن تحلل بناء العقل وتدرس تغيرات الشعور التي تحدث عندما يسقط ضوء ذو لون خاص معروف على شبكة العين ثم يبعث بتأثيره إلى المخ.

ونتيجة هذه البحوث المتلاقية ستكون الحياة، وكذلك سيكون الشعور (الوعي)، في القريب العاجل عرضة لأولى مراحل رقابة نظرية، وإذا قورنت بها الجهود التجريبية في الطب والسيكولوجيا بدت أشبه شيء بعمل المشتغلين قديماً بالكيمياء قبل وضع أساس الكيمياء الحديثة. ولكن هذا التوسع في معلومات الإنسان وفي قواه يحمل في طياته مسؤوليات جسيمة كبرى، نحتم على العلميين أن يعدوا أنفسهم لتحمل الأعباء الجديدة التي ستثقل كواهلهم قريباً. وبإيضاح الآراء الرئيسية التي منها ينهض هذا التركيب العلمي الواسع المدى نرمي هنا إلى إظهار وجوب الماضي في هذا السبيل جديداً. وسنلخص باختصار بادية ذي بدء نهاية ما وصات إليه الفيزياء

(١) نرى ذلك في مؤلفات كل من هوابند وادنجتون وجينز ولودج. و ج. ١. طمس

(٢) حدث في هذا الصدد أن تحولت بعض العناصر إلى عناصر أخرى كما يقول الدكتور أندريد

في الوقت الحاضر، ثم بعدئذ نتجه لبحث ما قد يكون للكشوف الفيزيائية المقبلة من التأثير في البيولوجيا والسيكولوجيا

توجد عمليتان رئيسيتان تأييان أن نفسرا تفسيراً مقنعاً في حدود الآراء الفيزيائية الحالية، وهما: الحياة نفسها ثم ذرية الاشعاع والمركبات الثابتة. في العمليات العضوية من جهة، وتبادلات الطاقة الذرية من جهة أخرى يوجد شيء لا نكون أحسن تصور له إذا نحن وصفناه بأنه تغير في البناء. والبناء هنا معناه النموذج الفضائي للجسيمات المفروض فيها أنها مستديرة وأنها تتحرك كما تتحرك الكرات أو الكواكب السيارة. فالمجموعات التي بناؤها من هذا النوع لا يمكن أن تظهر الغرض الوظيفي للتصرف العضوي. وحينما نحاول صنع نموذج تركيب للذرة نجده يفشل في أن يفسر لنا لماذا تشع الذرة الطاقة على هيئة رزم منفصلة متقطعة تسمى «كماتاً» لا على هيئة موجة متواصلة. وقبل أن نخوض في مسألة الكائنات الحية سنذكر باختصار لماذا لا يمكن وصف الذرة بأنها مركبة من جسيمات. وسبق أن ذكرنا ذلك باسماء في القسم الأول من الكتاب

في سنة ١٩١١ نجح رذرفورد في الحصول على تحليل لنتائج بحوثه في التأثير الكيميائي للأشعة، وذلك باختياره نموذجاً للذرة هو أشبه شيء بمجموعة شمسية مصغرة سياراتها الإلكترونات الدائرة بسرعة حول النواة. ولكي يفسر بوهر، بناء على هذا التصور، لماذا يبدي طيف الضوء المنبعث من الذرة سلسلة خطوط خاصة بمنازلة رام يقول بأن الإلكترون داخل الذرة لا يستطيع أن يشع ضوءاً إلا بفقره قفزاً غير متواصل من فلك إلى آخر. فعدم التواصل الظاهري هذا خدع الفيزيقيين وضللهم أكثر من عشر سنين. وإليك التفسيرات التي ذهب إليها العلماء حديثاً لتعليل ذلك التصرف الخير: —

أولاً — إن الطبيعة تتألف من إلكترونات وإن كلاً من الفضاء والزمن متواصل، وإن الإلكترون يلوح كأنما له بعض حرية الاختيار وكأنما له قدرة على الظهور من جديد على غير انتظار في أماكن محظورة

ثانياً — إن الطبيعة متواصلة مقيدة، ومع ذلك فهناك ما يحول بيننا وبين تقرير كل ما نريد معرفته بخصوص الإلكترون. فمثلاً إذا حاولنا تعيين مكانه بالضبط نراه يسلك مسلكاً لا يمكننا في نفس الوقت من قياس سرعته الحقيقية. (هيسنبرج). وهذا قد يفسر بأن نموذج الذرة الذي اخترناه أكثر تعقيداً من الذرة نفسها، وأتينا تبعاً لذلك قد استعملنا مقادير زيادة عن اللازم لوصف كل ما نستطيع ملاحظته عن مسلكه

ثالثاً — إن الطبيعة ليست متألفة من إلكترونات بل من موجات. فالذرة يتعتمد اعتبارها

بجموعة موجات كهربائية تنتشر حول حجمها كله . وما الالكترونات إلا طريقة غير محكمة لوصف بعض خواص هذه الموجات . ومع ذلك فالتصوير الموجي للذرة يجب أن يعتبر أيضاً وسيلة مؤقتة يصح استخدامها إلى أن نصل إلى وصف آخر للذرة أحسن من هذا تبدو فيه الخواص الموجية والدقائقية للذرات كأنها أوجه لحاصة فيزيقية أكثر عمقاً واستعماء . (شرودينجر) .

وظاهر أن الرأي الأول ماهو إلا اقتراب خطوة أخرى من الحقيقة القصوى . أما الرأي الآخران فيمكن ضمهما معاً هكذا :-

رابعاً — إن الرأي القائل بأن الذرة بناء من جسيمات نيوتونية خطأ لأنه يؤدي إلى نشوء انقطاعات وانقطاعات ، ولأنه يمدنا بمقادير تريد عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر . ومن ثم تحتم إيجاد تفسير جديد واضح للعمليات الذرية مع استعمال مقادير أقل تفسر بها سبب وجود الخواص الموجية ، وبها نشرح لماذا يسلك الالكترون في بعض الأحيان مسلك الكرة الصغيرة مع أنه في الواقع وقس الأمر يختلف عنها كل الاختلاف

والآن فإدات رياضية نيوتن الخاصة بالجسيمات المتحركة لا تصلح لتفسير التغيرات التي تحدث للذرة — كما أنها لا تصلح أيضاً لتفسير العمليات العضوية — فلا بد إذن من وجود فرض مضمّن في قوانين نيوتن التي لا تصلح لكل من الذرة والكان الحي . وهذا الفرض من السهل جداً الشعور عليه وإن تكن الفيزيقا لم تكتث له كثيراً . وهو أن العمليات الأولية في الطبيعة « قابلة للانقلاب » (١) أو هي تكون كذلك لو أمكن عزها . ومعنى قابلية الانقلاب هنا هو أن القوانين التي تخضع لها العملية تظل كما هي دون أدنى تغيير لو أن اتجاه الزمن قد انعكس أو انقلب ، أي حينما يستعاض عن المقدار الزمني t بالمقدار السالب $-t$. أما إذا تغير القانون بهذا التعويض فلا تحدث أبداً العملية المعكوسة أو المقلوبة ، أو حدثت بدلاً عنها عملية أخرى مخالفة تماماً لها ، فالعملية عندئذ تسمى « غير قابلة للانقلاب » وعلى ذلك فيمكن للعملية غير القابلة للانقلاب أن تستخدم في إيجاد صورة مادية للعاض ، والمستقل ، وذلك إذا ما وصلنا يوماً إلى تعريف الماضي والمستقبل .

فاذا وقفتُ مثلاً خلف سياج وأخذتُ على شريط سينماتوغرافي صورة لحجر ارتفع فجأة في الهواء ثم اختفى عن الأبصار ، فاني لا أستطيع من فحص الشريط أن أعرف الاتجاه الصحيح لطيه . فاذا طويته في اتجاه ما فقد يبدو الحجر عند عرض الشريط صاعداً ، وإذا طويته في الاتجاه المضاد بدا الحجر عند عرض الشريط ساقطاً من السماء . فلكي أعرف الاتجاه الصحيح

(١) « قابل للانقلاب » هو التعبير الذي اختارناه مقابلاً للكلمة الإنجليزية reversible

لا بد لي من استخدام حاسي الذهبية التي أدرك بها اتجاه الزمن ، أي أذكر أنني رأيت المحييط منخفضاً في الهواء قبل أن أراه مرتفعاً فيه . فهذه الحالة قابلة للانقلاب كمثل عملية تجاذبية تناظرية ، وأمثال هذه الحركات هي التي كانت أساس المدرجات السككية في الفيزيكا الحديثة . ولكن هب لي بدل ذلك قد أخذت شريطاً لقدح من الشاي وهو يبرد . فأحد طرفي الشريط يرمي البخار فوق القدح ويرينا المعلقة يتغير طولها بتغير درجة الحرارة ، وبالمضي في عرض الشريط يقل وضوح هذه الآثار فلا تبدي الصور الفوتوغرافية المتعاقبة أي تغيير على الإطلاق عند ما تبلغ درجة حرارة الشاي درجة حرارة الهواء المحيط بالقدح . وهنا يظهر لنا بوضوح الأنحاء الذي يجب طي الشريط فيه دون الرجوع إلى استخدام أي مقياس ذهني تقدمه الذاكرة عن العملية الفردية التي ارتسمت فوق الشريط . فهذه عملية غير قابلة للانقلاب ، ولكن الفيزيكا إلى هنا قد افترضت أن أمثال هذه العمليات جميعها ليست إلا نتيجة إحصائية لحواء من حركات جزئية ، كل حركة منها قابلة للانقلاب كل القبول . ويرى بعض الفيزيقيين أن افتراض قابلية الانقلاب ضروري وجوهري بحيث أنه لا يمكن أن يوجد علم بدونه . ولكن هذا رأي مغرض بعض من أن نبوت ارتأى طريقاً خاصاً في وضعه قوانين رياضية لما يمكن قياسه من العمليات الفيزيكية . وهو بإشارته إلى أن جميع القوانين الطبيعية قد تتخذ صيغة مشابهة لقانونه في التجاذبية قد فرض ضمناً أن جميع العمليات الأولية قابلة للانقلاب . والحركات التناظرية تتفق وهذا أيضاً في حدود صلاحية قانون نيوتن . ولما كان هذا القانون قد اتخذ نموذجاً لجميع الإدراكات السككية في الفيزيكا الحديثة فإن هذه الإدراكات السككية لا تكون صحيحة إلا في العمليات القابلة للانقلاب فقط .

أما عدم قابلية الانقلاب الظاهرية كتبريد قدح الشاي مثلاً ، فننسب إلى تأثيرات إحصائية . ويكون القانون الثاني في الديناميكا الحرارية ، وهو القانون الذي يحزم بأن درجات الحرارة تميل إلى النظام والتساوي ، مجرد وصف لأمر كثير الاحتمال . وليان فكرة التأثيرات الإحصائية نقول إنه في المجموعات البطيئة التغير تفرز الأفراد عادة ونضاهي تغيراتها بعضها ببعض ، ثم يستنبط من ذلك قانون عام . فإذا اعتبرت المجموعة كلها متألفة من وحدات ممزولة ثابتة فالحال يتسع إذن لأمثال هذه الطرق الإحصائية في استنباط القوانين . ولكن هذه الطرق لا يمكن أن يرجى لها نجاح إلا في المجالات المحدودة التي لا تنتهي التغيرات فيها بأي حال إلى كارثة . وتكون الاستنتاجات في الواقع منسوبة إلى المجموعة مجتمعة ، ولا يمكن تطبيقها على أحد أفراد هذه المجموعة إلا بإعراق غير مباشر . ويعرف جيز « الذرة الإحصائية » بأنها « الذرة التي خواصها وصفاتها متوسط خواص وصفات جميع الذرات الحقيقية الخاصة بامتعات الضوء »

قد يكون هذا أمراً مقطوعاً بصحته ، ولكن الفيزياء تختار عادة ، حتى في العملية غير القابلة للانقلاب التي خلقت من كل تأثير إحصائي ، مقياساً ما ولا تفترض أن عملية أولية أساسية — كائنة ما كانت — غير قابلة للانقلاب ^(١) . ولا يمكن أن ندهش لهذا ، لأنه ما دامت الفيزياء قد سلمت مرة بأن أية عملية أولية غير قابلة للانقلاب فالواجب أن يمدل عن آراء نيوتن كلها . إن المادة والقوة والطاقة والفعل والخواص الموجبة — كل هذه غير صالحة لمعالجة التأثيرات غير القابلة للانقلاب . لأنها كلها تعتمد في النهاية على قانون نيوتن القابل للانقلاب . ومن ثمّ نحتم إيجاد مجموعة آراء أخرى لكي تحمل محل آراء نيوتن القديمة . وهذه المجموعة تتوطد إذا هي نادت بعدم قابلية انقلاب القوانين الطبيعية كلها . وعندئذٍ نصل إلى حلٍ وافر للعقد الفلسفية والعلمية الحاضرة . وتكون النتيجة هكذا : —

هل توجد في الطبيعة عملية حقيقية موقوتة ؟ هل مرور الزمن غير القابل للانقلاب عنصر ضروري في أي صورة من صور بناء الطبيعة ؟ أو بعبارة أخرى هل الاختيار الذهني الزمن مجرد تصور عقلي كاذب لا يمكن تفسيره تفسيراً مادياً ؟ هذه ليست أسئلة ميتافيزيقية بصح أن يتركها العلم دون مهاجمة . وما دام أن أينشتين قد خطا خطوته بتحليل إدراكات كلية كالعملية الزمنية التي حسبوها فيما مضى مدركة ملاحظة في الأغراض العلمية العملية ، فالخطوة التالية في الفيزياء يحتمل أن تكون في مواصلة البحث في تحليل الزمن ابتداء من النقطة التي عندها وقف أينشتين . وعدا هذا فثلك الأسئلة يمكن أن توضع في صيغة علمية صريحة وذلك بالتساؤل عما إذا كانت العلاقات السببية — علاقات الملة والممول — التي درسها العلم وخبرها متمثلة وقابلة للانقلاب بحيث لا نستطيع الحصول منها على مقياس أو قانون يفرق ما بين الماضي والمستقبل . فإذا كانت هذه العلاقات من الجهة الأخرى غير متمثلة وغير قابلة للانقلاب فان قوانين الطبيعة تسير بنا بالضرورة مما مضى قبلاً إلى ما سيحيي بعد ، أي من السابق إلى اللاحق

(١) مثال ذلك حركة الإلكترون في مجال تضرب مغناطيسي . لهذه الحركة غير القابلة للانقلاب تصير في الظاهر قابلة له بافتراض أن المجال المغناطيسي يرجع في الأصل إلى وجود الإلكترونات متحركة . ومع ذلك فهذا الافتراض خيالي جداً لأنه يشير إلى حركات الكترونية لم يشاهدها أحد . وهناك حالات أخرى تتمحي فيها قابلية عدم الانقلاب عن طريق اختيار مجموعات احداثية خاصة . ويرى بعض الفيزيقيين في الوقت الحاضر أن قابلية عدم الانقلاب قد تكوّن من لوازم العمليات الذرية كما هي من لوازم العمليات العضوية

الفصل السادس عشر

مبارزة حديثة

أينشتين وإدنجتون في جانب وبرجسون وهوايتهد في جانب آخر

إن أشيق ما أراه عند الموازنة بين إدنجتون وهوايتهد وهو ما أرجو أن يراه غيري أيضاً أنه على الرغم من اختلاف هذين العالمين البارعين في التفصيلات فتنهما ينتميان إلى نتيجة واحدة .
« أولر لودج »

في هذه المعركة القائمة حول أهمية الزمن والعملية ^(١) نرى أسماء ضخمة يمثل أصحابها وجهتي النظر المختلفتين . فالمعركة ناشئة بين أينشتين ورئيس أركان حربه إدنجتون من جانب ، وبين برجسون Bergson ورئيس أركان حربه هوايتهد Whitehead من جانب آخر . ولكل من الزعيمين طريق يخالف طريق الآخر كل المخالفة . فأينشتين باعتباره فيزيقياً رياضياً يرى أن القوانين الفيزيائية يمكن تفسيرها خير تفسير إذا نحن فرضنا أن الفضاء والزمن من التشابه والتجانس بحيث لا يمكن للفيزيقا أن تجد بينهما أي خلاف جدي . ولذا فإن مماثل الفضاء في نظرية النسبية يتضمن تماثل الزمن ، فقابلية انقلاب القوانين الفيزيائية من ثم . وينكر برجسون باعتباره بيولوجياً وفيلسوفاً ، أن فكرة الزمن الضمنية في حسابات النسبية تكون صالحة إذا أدخلنا في حسابنا سلسلة تجريبية واسعة المدى . واقتصر أينشتين في حسابه على قليل جداً من التجارب الفيزيائية ، فسهل عليه من ثم أن يستخلص نتائج ناجحة عن الضوء والجاذبية لأنه اعتبر عدم قابلية انقلاب سير الزمن شيئاً عديم الأهمية في الأقيسة العامة . أما برجسون فقد انتهى من بحثه في كثير من التجارب البيولوجية والذهنية إلى تقرير وجود عملية إنشائية خالقة على الرغم من أن حدود العقل والعلم لا يمكن أن تصل إلى جوهر هذه العملية . وقد ترك كل من المتنازعين جناحه مكشوفاً لأنه أهمل عرض رأيه عرضاً منطقياً موثقاً . فأما أينشتين فلأنه اكتفى فقط بالمعادلات الرياضية التي يمكن خبرها بالتجربة ، وأما برجسون فلأن غرضه الرئيسي لم يكن عقلياً . وهنا تقدم كبرا مؤيديهما يدلان بدلوها لزيادة إيضاح وجهتي النظر ، فأذكيا المعركة من ثم وأججها تأجيحاً

(١) هي المقابل لكلمة Process ويقصد بها ما يتم من ظواهر فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية .

فأما إدخيتون فقدم أساساً منطقياً لنظرية النسبية ، وأبان أن لبّ القوانين الفيزيائية ليس هو ذلك الذي اعتدنا تخيله . ويذهب هذه القوانين بأنها متطابقات استكشفتها العقل خلال بحثه وتفحصه في جميع مظاهر العالم المتغيرة عن شيء مستديم سماه «مادة» . ولقد اعتبرنا المادة شيئاً حقيقياً بادعائنا أن البقاء أو عدم الفناء أساس الحقيقة الفيزيائية . وما كدنا نصنع ذلك حتى وجدنا أنه ليس ثمة ما يجهدنا لكي نصل إلى أن المادة المطلقة غير المتغيرة لا وجود لها ، ما دام هذا لا يعني إلا أننا ابتدأنا بقضية أو دعوى لا تستطيع الطبيعة تقديمها وتحقيتها . ولما يؤسف له أن إدخيتون لم يناقش أو يبين أية دعوى أخرى تصلح أن تتخذها أساساً لتكوين مجموعة من الآراء العلمية تكون أكثر ملاءمة . ولكنه على الرغم من تحمسه لنظرية أينشتين وما افترضه ضمناً من قابلية الانقلاب زراه يتردد في دفاعه عن القوانين القابلة للانقلاب لأنه قد ظهرت أمور تشير إلى أن هذا الافتراض الضمني الذي لم يناقش قد يكون غير صحيح (١)

وأما هوايتهد فقد كان في الوقت عينه يعمل في ناحية أخرى ، ومضى يشهد منطقته حتى لم يفهمه إلا قليلون ، جاعلاً فكرة العملية الموقوفة أساساً للتفكير العقلي والعلمي مع كثرة ما قدمته العملية للعقل حتى الآن من شتى المسائل العويصة المستعصية . ومن رأيه أنه ما دام الإدراك السبكي للمادة قد وجد غير كافٍ ولا مقنع فالواجب عند وضع نظرية فيزيائية جديدة أن نبتدىء من الفكرة الأساسية العملية . ونتيجة لحطة التفكير هذه التي اختطها هوايتهد زراه اضطر إلى نبذ بعض حجج أينشتين وآرائه ، وإلى إثبات أن قانون أينشتين يمكن الوصول إليه من فروض وعروض أخرى مخالفة كل المخالفة لفروض أينشتين وعروضه . مثال ذلك أن هوايتهد افترض أن حركة الضوء غير قابلة للانقلاب ، وأن الضوء لا يسير بسرعة واحدة في اتجاهين متضادين . وفي هذا بيان لأحد وجوه الخلاف . ولكن النتيجة يجب ألا يقطع فيها برأي إلا بعد الاحتكام إلى البيانات التجريبية المطبقة على أوسع مجالات الظواهر ولا زال الفيزيائي يقول بقابلية الانقلاب ، يؤيدها ذلك البيان الجلي الواضح الذي أدلى به أينشتين سنة ١٩٢٥ ولكنها بتسمكها بهذا ترفض بادية ذي بدء أن تشير أية إشارة إلى العمليات المضوية . على أن الإدراكات الكلية التي تبني على هذا الفرض لا يمكن أبداً أن تطبق تطبيقاً صحيحاً على الحياة وقد فشلت

(١) من العمليات التي أبنت ما يشير إلى عدم قابليتها للانقلاب تلك المتضمنة تغيرات حرارية أو إشعاعاً ضوئياً أو كتلة . وتلك الخاصة بأحداث طاقة النجوم وحركة الالكترونات في المجالات المغناطيسية ، وتصادم الأيونات في الغازات المختلفة ، وفعالية الإشعاع ، والنمو والتطور العضويين ، والشعور نفسه . وقد اقتصر إدخيتون على بحث حائلي انبعاث الضوء ، وامتصاصه ، وزراه يشير إلى أن اتجاه الزمن يمكن استنتاجه فقط من العمليات الاحصائية . وذلك هو الرأي السائد الآن وإن يكن يشك كثيراً فيها إذا كان صحيحاً الآن أن عمليات السهم تخضع لقانون

بالضرورة جميع الجهود التي بذلت حتى الآن لتفسير العمليات الرئيسية الضالقة عند الكائنات الحية في حدود الفيزياء الكلاسيكية . وقد عرفنا الآن أن هذا الاحتياك كان مستطاعاً إدراكه والتنبؤ به

ولا يمكن توجيه هذا الاعتراض إلى آراء برحسون وهوايتهد الرئيسية ، ولا إلى الفيزياء الذرية الجديدة على مقتضى تفسير بورن Born وشروودجر وغيرهما كما سئرى . فبرحسون وهوايتهد وكثيرون غيرها ومنهم لويد مورجان Lloyd Morgan يقولون بأن عمل الطبيعة إنشائي إبداعي ، أي يتضمن خلق الجديد من الأشياء وظهور اتحادات جديدة كانت من قبل مستحيلة . وربما دلّ هذا على أن القوانين الفيزيائية التي تصف ما يحدث فعلاً في العالم يجب أن تكون من النوع غير القابل للانقلاب . وذلك لأن المعادلات القابلة للانقلاب لا يمكنها قط أن تميز بين اليوم والغد ، ولأنها لا تستطيع أن تفسر مكنة ظهور صيغ جديدة فيما بعد . سواء كان في تطور الكائنات الحية أو في تطور النجوم . ومن جهة أخرى يمكن أن ترتب القوانين غير القابلة للانقلاب بحيث تظهر الزمن عاملاً فعلاً في التعليل ، أي تؤكد وجوب مضي فترة زمنية ما قبل الحصول على اتحاد جديد (١)

ويستطيع المؤيدون لفكرة وجود عملية حقيقية في الطبيعة أن يستشهدوا بالحياة العضوية وبالذاكرة وبالتطور البيولوجي والنجمي . ولكن قضيتهم تظل مع هذا ضعيفة لأن قابلية عدم الانقلاب الرئيسية لم تجد لها بعد قوانين رياضية صريحة تلائم الاختبار التجريبي . فإذا ما تمّ لها ذلك فالمركبة العقلية تنتهي إلى قرار ، وإذا كانت الغلبة ستكون لعدم قابلية الانقلاب فان البيولوجيا والسيكولوجيا ستحصلان على أساس فيزيقي بالأمم بحوثهما خير ملاءمة

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا القرار قريب الظهور فلقد رأينا أن قابلية الانقلاب مقترضة ضمناً في جميع الآراء النيوتونية . ولذا فقد يكون سبب عجزنا عن تفسير المسلك الذري بأنه حركات جسيمية ، أن العمليات الكهربائية والاشعاعية غير قابلة للانقلاب في الأصل . فالحركة الجسيمية والانتشار الموجي — وهما الرأيان اللذان أثبتت عليهما جميع النظريات الحديثة الخاصة بالمادة كما صرّحنا في القسم الأول من الكتاب — يمكن أن يمثلتا كلاهما بعبارات رياضية قابلة في جوهرها للانقلاب مادام الزمن لا يدخل فيها إلاّ خلال مربع h ، أي أن مقاديره تربية .

(١) لا بد عند التدليل رياضياً على أن الزمن قد يكون عاملاً فعلاً في التعليل من ظهور المقدار الزمني واضحاً في مدلول القانون ، ولا يصح الاكتفاء فقط بوجود مربع التفاضل الزمني القائلون الذي يتضمن في صيغته الرياضية الزمن مقيساً ابتداء من لحظة ما في تاريخ المجموعة المقتضية يعطينا معنى جديداً للمقدار يتناسب مع خواص المقدار h النيوتوني التفاضلي القابل للانقلاب . وقد يفسر مثل هذا القانون مسألة المدة التاريخية غير القابلة للانقلاب بأنها وجه في الطبيعة قد أهملته القوانين المتضمنة فقط على مربع h

أما إذا ظهر أن عمليات الكم غير قابلة للانقلاب فالتا نكون قد عثرنا عندئذ على سبب عدم صلاحية الآراء القديمة الخاصة بالجسيمات والموجات

قد يكون هذا الظن صحيحاً في الواقع مادام بورن ، وهو من أساطين العلماء الجديرين بدناميك الكم ، يؤكد أن عمليات الكم جميعها غير قابلة للانقلاب ، وأن قابلية الانقلاب التي تبدو في العمليات الكلاسيكية ما هي إلا تقرب نتج من أن عدم قابليتها للانقلاب قد أمكن إهماله . وعلى ذلك فكل ما يرحوه العلم أن يتمكن الفيزيقيون الدربون سريعاً من صوغ قوانين الكم بوضوح في صيغة غير قابلة للانقلاب تسلم بالاختبار التجريبي المضبوط

ولكن هذا قد يستغرق بضع سنين ، فملينا إذن في الوقت عينه أن تلفت حولنا لنرى كيف تؤثر هذه النتيجة في الآراء السارية . فنجد العلامة سوليفان Sullivan قد ساوره شك بخصوص تلك العملية مع أنه لم يقرر بعد الناحية التي سيمتصها العلم النصر ، فقال في مقال له عن « طغيان العلم » ما يأتي : « إخال حقيقة أن الحوادث لا تجري في الواقع وانما نحن نعبها » وهو يرى أن العملية « قد تكون رأياً وأنها كل الوهن إذا ما طبقت على الحقيقة والواقع » ولكننا سندعش بعد إذ نعلم « أن العالم من باب أولى يجب (على مقتضى النظرية العلمية) أن يعتبر عملية تطويرية تكشفتنا لنا عن نماذج قيمة » . ومع هذا فلا يصح أن يزجنا ذلك التناقض ما دمنا قد عرفنا أن « تعاليم العلم في ضوء المسائل الروحية ليست إلا تعاليم واهية واعنة »

فهذه الآراء تبين لنا أن الزمن مستراب تتخالجه الشكوك ، ومن ثم يصح اعتبارها سجلاً ثميناً لحالة العقل التي تقدمت التركيب العلمي . ولعل أشيق ما في مقال سوليفان تردده بصدد أهمية العلم الروحية . وتلك إحدى بقايا الأزمنة الغابرة أيام كان يوجد عالمان ، عالم العلم وعالم الدين والفن . وما كان لأحد أن يعرف في أي هذين العالمين يعيش ، وما كان ذلك يدعو إلى دهشة فالتقسيم إنما عمل لأن ظروف الحال في وقت ما كانت تظهر لنا الأسلوب العلمي كأنه لا يتناول إلا الكم ، فلم يكن لدى العلم من ثم ما يقوله عن الأهمية والكيف . على أن هذا الرأي لم يتشبث به طويلاً ، ولم يستمسك به اليوم أحد . فمثلاً التكامل العضوي صفة بقدرها معظماً حق قدرها ، وبدونها هي ومثيلاتها الكثيرات لا يمكن أن تتقدم البيولوجيا ولا السيكلوجيا ومن الضروري قبل المضي في الحديث إلى أبعد من ذلك أن نصصح خطأ شائعاً بخصوص أهمية نظرية النسبية لأينشتين . فالنظرية رياضية مبنية على سلسلة من العروض المسلم بها والتي أبدت لنا في النهاية نظرية قصوى عن الفضاء والزمن . ويؤكد أحد هذه العروض أن جميع معلوماتنا الفيزيائية يمكن أن تتحوّل في النهاية إلى انطباقات فضائية زمنية لأزواج من حوادث نقطية point-events أو ببساطة أخرى إلى تقاطع الخطوط الدنوية world-lines

للالكترونات . وأراني هنا أذكر مصطلحات لم أترض لها عند الكلام على النظرية في القسم الأول من الكتاب . ولكن مهما بلغ احترام المصلين لكبيرهم الصقري الغد الذي تنبأ بنيتجيبين تجريبيتين محابهما أهم المتناقضات الباقية في آراء نيوتن ، فإن هذا الاحترام لا يصحح أن يصدمهم عن أن يشيروا إلى أن هذا المرض يفرض شيئاً لم يعرف قط أنه حدث فعلاً ، ولم يشر إليه أحد قط في عالم التجريب الفيزيقي . ولا يمكن أن يكسب تحقيق مما دلات أينشتين الأخيرة هذا المرض أي قسط من الصحة لأنه من الصعب جداً أن نجد تجربة فيزيقية سليمة لا تتضمن الادراك الحسي للضوء أو اللون ، ولأنه لا يمكن أن يفرض أن الادراك الحسي للضوء إدراك حسي للانطباقات . إن الضوء يختلف لوناً وشدة ولكن الانطباع في الفضاء أمر ذهني تجريدي جداً فلا يمكنه أن يعمل أمراً آخر عرضة للتغير . وعدا هذا فإن التجارب الفيزيقية كلها تتطلب قدراً خاصاً من الزمن ، وهذا أمر مهمل إذا قصر الادراك الحسي على تبين الانطباقات الفعائية ونعرفها . وحتى إذا ترك هذان التقدان وشأنهما فلا يزال علينا أن نلاحظ أن عرض أينشتين ينتهي بنا إلى أن هناك عمليات كثيرة غير قابلة للانقلاب . مثال ذلك : مسألة تأثير الاشعاع كيميائياً . فالشاهد أن العناصر الثقيلة تتحلل وتفكك إلى عناصر أخرى خفيفة ، ولم يشاهد العكس وهو تكون العناصر الثقيلة من الخفيفة ^(١) . فإذا ما قبلنا أمر يف أينشتين للتجريب الفيزيقي وجب أن نترك مسألة تأثير الاشعاع هذه ومثيلاتها إلى علم آخر ^(٢) غير الفيزيقي بقاؤها محملاً ودرساً وكثيراً ما يحدث أن يبالغ في آراء أحد المبالغة أساساً لعقيدة خبيثة ضارة . وهذا ما حدث فعلاً لنظرية النسبية . فازاء ما نثار حول النظرية من الاستحسان المبالغ فيه قام كل من هوايتهد ولأرمور Larmor وبردجمان Bridgman وبعض كبار الفلكيين في أوروبا وراحوا يناقشون الفكرة البامة التي شاعت عنها وهي القائلة بأن نظرية النسبية قد أدت مهمتها . ولكن المناصرين لهذه الفكرة وهم جماعة المؤيدين لنظرية النسبية المعتقدين في صدقها قد أعملوا هذه الانتقادات ولم يقرأ لهم بعد ردّاً يدرأ الشبهات . وكثيراً ما كان الاهمال سلاحاً ماضياً

(١) يقول الدكتور أندريد استاذ الفيزيكا في جامعة لندن في كتابه « الكيمياء الجديدة » انه عند تحطيم ذرات الالومنيوم قد اكتسبت هذه الذرات خاصية النشاط الاشعاعي ثم حدث أن تكون من ذرات الالومنيوم العظيمة هذه نظير للفسفور لم يكن من قبل معروفاً . وهذا التغير غير ثابت بل يتحول مطلقاً بروتوناً ويقول انه أمكن أيضاً استخلاص نظير اشعاعي للسلكون من الالومنيوم

(٢) لعل هذا العلم هو العلم الروسي الحديث الذي أنشئت له ثلاثة وداسة في جامعة كبريدج . وتجارب العلاج الروحي التي يتحدث عنها أساتذة الطب في جامعتي جلاسجو وأكسفورد قد يقر فيها بلاشعاعات الروحية الجوهولة أجزاء من الجسم وتكونت أجزاء أخرى وكل ذلك في طرفة عين . أي في قاصر الزمن قد انعدم بتأنا وعدا هذا فقد قال أحد البعثات الأمير كين ان اثاث بعض الدواب في تجاربه قد اتصالت ذكورا بعد تعريضها الى الاشعة الكونية !!!

تسمهره العقيدة في وجه الآراء الجديدة فتمنع تقدمها . على أن ذلك لا يمنعنا أن نقول إن مساهمات نظرية النسبية لم تكن موضع فحص دقيق قبل أن تتخذ أساساً لرأي فلسفي واسع . ولا بضمن التعديق العملي التجريبي لقانون أينشتين في الجاذبية صحة مساهمات أينشتين مادام قد وصل هوايتهد من فروض أخرى مغايرة إلى قانون مشابه لقانون أينشتين

إن عقل أينشتين المبدع العميق القور يستوجب منا أعظم احترام وأبلغ تقدير، ولكن عمله يجب ألا يعتبر نظرية عامة للفضاء والزمن فهو لم يهمل مسألة عدم قابلية الانقلاب فحسب بل يشك كثيراً في صلاحية نظريته للعمليات الدورية ، كما أشار إلى ذلك كل من رسل وبردجان . ومن الجائز أن أينشتين نفسه يعتبر نظريته مرحلة ، لا أكثر ولا أقل ، في سبيل إيجاد بناء فيزيقي أوسع . ومن ثم تحتم علينا ألا نذهب بعيداً في تأويل رأيه القائل بأن إحدى دعاوى نظريته « قد أخذت من الفضاء والزمن آخر بقايا الادراك الحسي الفيزيقي » فان هذا لا يكون صحيحاً إلا إذا قاسم الزمن الفيزيقي الفضاء في تماثله المطلق ، أي إذا كانت العمليات الفيزيكية كلها قابلة للانقلاب . ولكن هناك عمليات نستطيع أن نحصل منها على مثال لاتجاه الزمن تدركه الحواس ، ومن ثم يحفظ الزمن بعنصر الادراك الحسي الفيزيقي واضحاً متميزاً عن التماثل المطلق للفضاء

وسيكون من أهم الوجوه في مستقبل الفيزياء الوصول إلى تفسير أن أينشتين قد وصل إلى قانون صحيح من مساهمات وفروض محدودة الصحة ، وفي هذا الصدد قد يكون استنتاج هوايتهد ذا أهمية



الفصل السابع عشر

الزمن في الفلك وفي الفيزياء

ان الماضي والمستقبل نوباً زمن مخلوقان نكسهما نحن خطأ ودون
وعمي منا جوهر الابدية. ونحن نقول « كان » و « يكون » و « سيكون »
ولكن الواقع أن « يكون » هي وحدها التي يمكن أن يكون استمعنا لها
قرين الصواب والسداد
ان الزمن والسماوات قد ظهرا في الوجود في لحظة واحدة، وذلك
لكي ينفضا مما اذا قدر لهما أن ينفضا « أفلاطون »

ينحصر الخلاف الحقيقي بين الفيزيكا والحياة في أن الأولى لا تسلم بعدم قابلية انقلاب الزمن
في حين تسلم الحياة بذلك وتعتبره أساسياً لها . ونحن مع ذلك لا ندري هل يكون للزمن
الفيزيقي « د » نفس الدلالة التي تكون له في كل من البيولوجيا والتطور والتاريخ وتجارب
الأيام . المعلوم أن الإدراك الكلي الفيزيقي للزمن قد نشأ وتكوّن عن طريق استخدام آلات
قياس الزمن (الساعات) بالفعل في وصف العمليات الطبيعية ، واستمرّ كذلك إلى أن اتخذ لنفسه
أخيراً صيغة أخرى هي الصيغة الفلكية التي تعينت عن طريق دوران الأرض حول نفسها ثم
حول الشمس . ثم اعتبر اليوم في الحقيقة مقياساً زمنياً مطلقاً . ووافق هذا المقياس الهوى لأن
قوانين الفيزيكا تصبح سهلة بسيطة الصيغة إذا اعتبرناه كذلك

وهنا نجد أمماً عدة هي أن دراسة حركة القمر قد انتهت بالفلكيين إلى القول بأن الأرض
تدبّطاً في دورانها ، أي أنهم لتعليل حركة القمر الظاهرية افترضوا أن اليوم يتزايد طوله . وقد
أظهرت نظرية المد والجزر أن من أسباب هذا الإبطاء الاحتكاك الذي يقع في قيعان الأحواض
المائية الضحلة بسبب المد والجزر . مثال ذلك أن اندفاع مياه المحيط الأطلنطي في أثناء المد
والجزر في البحر الأارلندي بسبب قوة احتكاكية كبيرة تعوق حركة دوران الأرض حول
نفسها . ويبدو أن هناك ، عدا هذا الإبطاء ، تغيراً دورياً بطيئاً جداً في طول اليوم ربما كان
سببه ما يحدث لقشرة الأرض من تمدد وتقلص منتظمين

وبصرح الفلكيون بأن المقياس القديم للزمن لا يطارد إبطاءه بحسب بل إنه يعاني أيضاً

تبراً منطقياً مناسباً . وهم لذلك قد أمهلوا الأرض عند تعريفهم الفترات الزمنية المتساوية ، واستعانوا عنها بشيء آخر سخي . ثم إنهم لم يعلنوا ذلك للعالم ، ومن ثم ما كان لأحد أن يستخلص لنفسه هل كانوا قد تحققوا من أنهم يتملهم هذا قد غيروا المعنى النظري للأقيسة الفيزيقية جميعها أم لا . لقد عرفت الفيزيكا الزمن في أولى أيامها بدلالة آلة زمنية مختارة (الساعة) ثم بعدئذٍ مضت في سبيلها تبحث عن قوانين الطبيعة . ولكن صلاحية الطرق القديمة أصبحت لا تفي بحاجة الفلكي الحديث الذي عين لنا الزمان وأدار ساعات ماملنا الفيزيقية . ولدى هذا الفلكي من الأسباب ما يجعله ينكر على الأرض صلاحيتها لذلك ، فقلب لنا الأوضاع رأساً على عقب . ولكي ينفذ قوانين القصور الذاتي والجاذبية بالنسبة لحركة القمر — وإلى مدى أقل بالنسبة لحركة السيارات والشمس — نراه قد جعل هذه القوانين مقياسه النموذجي الدال على الفترات الزمنية المتساوية بدلاً من دوران الأرض . والموقف غريب وعلى الأخص من وجهة أن قانون أينشتاين الذي نسخ قانون نيوتن لا يصلح أن يتخذ آلة زمنية فلكية كما أوضح ذلك العلامة لارمور . وربما استطاع الفيزيقي في القريب العاجل أن يتخذ من الذرة آلة لقياس الزمن نظرياً في الفيزيكا مع مضيه في اتخاذ دوران الأرض المصحح مقياسه العملي ، على أنه إذا استطاعت الفيزيكا أن تتنكر وسيلة ما لقياس الفترات الزمنية الضئيلة في حولة الإلكترون في فلكه، فإن الإلكترونات قد تتخذ عندئذٍ وسائل تمدنا بمقياس أساسي للزمن . وعلى ذلك فإذا كانت سرعة الإلكترون قد قيست أولاً بطريقة ما غير مباشرة فلأما مول أن تصل الفيزيكا إلى قياسها بطريقة مباشرة ، وعندئذٍ قد يصلح الإلكترون أن يكون آلة جيدة لتعيين الزمن . ولكن يتحتم على الفلكيين في الوقت ذاته أن يعلنوا الناس بما يكونون قد وصلوا إليه ، لأنه باستعمال آلة زمنية فلكية من النوع الجديد تفترض الفيزيكا قوانين كلاسيكية أثناء بحثها في عمليات معروفة عنها أنها تنقص هذه القوانين من أساسها . إن الفيزيكا النظرية لا يمكن أن تتوقع توضيح مسائلها الأساسية ما لم تراع كل المراعاة ما يتضمنه هذا التصرف المريب

والفيزيكا كمنظم المذاهب تتضمن قسطاً كبيراً من العظمة والكبرياء ، ولكنها الآن على النقيض من غيرها مشغولة غناهضة كل ادعاء أجوف لكي تخلص بنفسها سليمة نقية من كل شائبة . فمثلاً نرى الكتب الفيزيقية التي ظهرت في العشرين سنة الماضية ملأى عبارات من هذا النوع « إلكترون سرعته كذا سنيمترات في الثانية » فهذه دعوى أهل الأساتذة إخبار تلاميذهم بحقيقة سرها الرائع ، وهو أن السرعات الإلكترونية لم تحقق بعد تحقيقاً عملياً تجريبياً مباشراً . وقد ظهر اليوم لذلك رد فعل إذ قامت الصيحة بوجوب عدم استعمال إدراكات كلية في الفيزيكا النظرية لا تتفق مع التقديرات الكمية المباشرة مباشرة . ولذلك نجد أحدث النظريات الذرية

قد حثت فكرة الأفلاك الإلكترونية ، لأنه قد تحقق أن هذه ليست سوى حيلة رياضية لحساب شيء آخر غير ذلك وهو الطول الموجي للضوء الذي تستطيع الذرة أن تشعه . ولما أمول أن يستخلص عن الأفلاك شيء آخر يمكن أن يستخدم المعالم الذرية التي يمكن مشاهدتها مباشرة ، ولكن هذه الصورة الجديدة لم تكتمل بعد .

ومع هذا فالفيزياء لا تزال تعتمد على آراء لم تؤيدها البيانات تماماً . فعلى الرغم من أن فكرة الإلكترونات المتحركة قد استبدلت من النموذج الذري الحديث فإنه لم يقترح بعد بديل لها ، وذلك بسبب الإلكترونات التي توجد خارج الذرة . لهذا صار من المهم جداً لدى العالم الفيزيقي التجريبي أن يعرف هل يستطيع قياس المسافة التي يقطعها الإلكترون في جزء مقيس معلوم من الثانية أم لا . ولم يقدّر لأن دليل على أن الطبيعة قد مهدت لنا الطريق يجعلها الإلكترونات تسلك مسلك الجسيمات المتحركة ، مع أن الإلكترونات في الواقع شيء آخر غير الجسيمات . والحق أننا لم نجرب بعد تجارب مباشرة تكفي لأن نعرف منها هل مجموعة الأبعاد المستعملة في الإلكترونات صحيحة أم لا . ولما لم تكن سرعة الإلكترون معينة القدر الآن بطرق القياس المباشر فلا يمكننا الاستيقاق من أن أبعاد التاب الجديد « ه » المسمى ثابت بلانك هي أبعاد الطاقة مضروبة في زمن كما هو معروف . ويستحيل على الفيزياء أن تصل إلى ابتكار طريقة لأجراء قياس مباشر لزمن ما داخل في الحركات الإلكترونية ما لم تعرف أولاً كيف تتناول عمليات الكم وتتصرف فيها .

وحينما نستوثق من عدم تولد الإدراكات الكلية التي انبثت عليها النظرية الإلكترونية كلها فأننا سوف ندهش لما نكون قد عرفناه عن الذرة نفسها ، ومع ذلك فن الجائز أن تكون معلوماتنا عن الذرة أكثر مما نظنه ، وأن ما نتحدث عنه باعتباره حقائق خاصة بالإلكترونات وبالأشعاع يكون أحجى لو اعتبرناه مجرد معلومات عن الذرات المنفردة وعن الطريقة التي تؤثر بها الذرات بعضها في بعض فانبعث الضوء عملية ذرية ، ونحن في الحقيقة لا نعرف عن الضوء شيئاً إلا إذا صر بذرة فامتصته كله أو بعضه على الأقل . ويحدث للذرة حينما تضيء تغير غير مفهوم ينتقل منها إلى غيرها وهكذا . وقد تسبب الطاقة الممتصة تغيراً كيميائياً كما يحدث في الألواح الفوتوغرافية ، ولكن إذا حدث أن أدرك عقل الإنسان تغير الحالة هذا فإن تأثير ذلك لا بد أن ينتقل عاجلاً أو آجلاً ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، إلى ذرة ما في شبكة الدين . على أننا لا نعلم إلا قليلاً عن هذا التغير في حالة الذرة ، وهو على الرغم من تسميته عادة تغيراً في الطاقة الكهربائية الداخلية للذرة فإنه سيظل حاملاً لمعنى أكثر إلى أن نصل إلى قياس سرعة الإلكترون بطريق مباشر . أما أبعاد الطاقة الكهربائية فسنعتبرها كأبعاد طاقة الحركة ، أي

الكتلة مضروبة في مربع السرعة ، واكتنا لا ندري هل ذلك يصف التغيرات الذرية وصفاً صحيحاً أو لا . ولما لم يكن قد استطاع أحد قط أن يقيس أي زمن داخل في عملية إلكترونية فإن مقياس الزمن في الذرة يخالف كل المخالفة المقياس الذي يعطيه الحساب . على أن جهلنا حقيقة ما يدل عليه تغير الحالة الذرية جهل كبير مطبق دفع البعض إلى معالجة الذرة على اعتبار أنها كائن تظهر فيه الحياة إذا ما أثبتت ، ويموت إذا ما بلغت الطاقة الذرية نهايتها الصغرى ولذا يقترح هوايتهد أن تعتبر الذرة كائناً حياً ، وإن يكن هذا الاقتراح بالطبع يدعو إلى الحيرة لأن ما نعرفه عن الحياة أقل مما نعرفه عن الذرة

إلا أننا مع هذا نعرف أمراً شيقاً للغاية بخصوص هذا التغير الذي يحدث للذرات دون أن ينتهي إلى تغير تكوينها فحينما يدرك الضوء ذرة في شبكة العين يسري حث كهربائي في أحد الأعصاب فيغير حالة البروتوبلازم في جهة ما من المخ . فهذا التغير في حالة المخ ندركه على الفور وهو المعروف لدينا بالادراك الحسي للون . وعلى ذلك فنحن نعرف بشكل ما عن حالة هذا التغير الذري أكثر مما نعرف عن «المجالات الكهربائية» أو «قوة الشاغل» أو أي تعبير رياضي آخر مستعمل في الفيزياء لربط المقادير المشاهدة المقيسة . أما التغير الحادث في ذرة الصوديوم مثلاً حينما يوضع ملح الطعام في اللهب فليس تغيراً في شعور ذرة الصوديوم أو وعيها ، لأنها ليست جزءاً من مجموع عصبي معقد فيه من التآزر الراقى ما نرى له أمثلة في عمل الأعضاء في جسم الانسان، وعلى ذلك تكون الذرة عديمة الشعور عديمة الوعي . ولكن حينما يقع هذا التغير للذرة في المخ فالتأثير ينشعب به على الفور ، وتكون التغيرات الحادثة في المادة عند امتصاصها الضوء مقترنة دون شك بمسألة الشعور

لهذا نحن مسوقون لأن نسأل : كيف بنيت الذرات في المجموعات المعقدة التي تمتاز عن غيرها بالحياة ، ثم في المجموعات الأكثر تعقيداً التي هي مقر الشعور عند الانسان ؟!



الفصل الثامن عشر

تجربة تطورية

يشبه السكون في نشوئه وتكشفه الثوب ينسج فوق النول . وما سداة النسيج ولحمته الا الفضاء والزمّن . فمتى أية لحظة خلال النسيج يكون قد انتهى جزء من النسج انتهاء لا رجوع فيه . أما باقيه فيظل محبوساً في النول ، لا يلبث الزمان الا في اياته . ويكون النول تبعاً لوجهة النظر القائلة بميكانيكية الطبيعة ، قد مضى يعمل متسلسلاً لقوانين أرلية خاصة ، أي أنّ الثوب وجد بهامه في الاصل منذ البداية ، ثم صار يتطور فكان تطوره مرادفاً لما يطر فيه من تغيرات قدر عليها أن تظهر ، ومن ثم كان خروج الثوب من النول أمراً مرسومًا . فملا . وتبعاً لوجهة النظر القائلة بعدم ميكانيكية الطبيعة يكون النول مقوداً بكيفية لا يعرفها أحد ، فينتج اذئث مالا يعرفه أحد « حينئذ »

كثيراً ما تكون صيغة السؤال للموجه سبباً في صعوبة الاجابة عنه بل تعذرها . فتلاً إذا أردنا أن نسأل عن الحياة فيحسن بنا بدلاً من أن نقول « ما هي الحياة ؟ » أن نضع السؤال في صيغة عملية صالحة للمناقشة فنقول « هل يستطيع أحد عباقرة الفيزيقيين أن يعد في يومه المواد الكيميائية اللازمة له لسكي يصوغ منها في غده إنساناً تركيبياً ؟ وإذا لم يستطع فلماذا ؟ وما هو ذلك الذي نسمي إليه فلا يكون منه إلا أن يباعد ما بيننا وبين الوقوف على سر الحياة ؟ » فلنقرب عن كسب ذلك الفيزيقي الطموح فراه يدخل معمله ثم زراه يبدأ عمله بسهولة فيعد في لحظة بعض جزئيات بسيطة من عناصرها . ثم ها هو ذا قد جهز المادة الغروية الأولى التي يحتاج إليها بعد ، وها هو ذا قد بدأ تركيب العضوي الأول . ولكن عمله الواسع العريض لا يمنحه الأبدية كلها على صورة دقيقة من الزمن . ولذا زراه يقاطع في سيره ويتمك . فاذا كان اتحاد الجزئيات الأولى يستغرق جزءاً من ألف جزء من الثانية تقريباً فإن أبسط جزيء غروي يستغرق في تكوينه ثانية تقريباً . أما الجزيء الغروي العضوي فيستغرق دقيقة . وكما لا تستطيع الطبيعة أن تمضي في عملياتها بأسرع من ذلك ، فلها أترانها ولا يمكن أن تتحجم على الاسراع . وإذا نحن صبرنا على صاحبنا حتى آخر النهار فقد يصل إلى هباءة البروتون بلازم الأولى ولو استعان بكل ما في العالم من مهارة فلن يحصل على غير أمثال هذه الهباءة ، ثم هو لن يحصل

منها على شيء آخر في مجال التطور . ولكن انظر إليه الآن واعجب لما ترى ! ما أسرعه إلى إجراء العمليات الحسية فكأنما قد وقف على سر عظيم من أسرار الطبيعة أيقن منه في النهاية أنه عاجز عن أن يخلق جيناً آدمياً . ثم وجه نظرك من فوق كنفه إلى ما يكتب تقرأ الجدول الآتي : —

النهاية الصغرى للزمن الذي تتطلبه العمليات الزككية التي تجريها الطبيعة
للحصول على مراحل تطورية متعددة

| النهاية الصغرى للزمن | ابتداء من العناصر إلى |
|----------------------|-------------------------------------|
| من الثانية ٠.٠٠١ | مركب بسيط غير عضوي |
| ثانية ١ | عروي بسيط |
| ساعة ١ | بروتين |
| شهر ١ | بروتوبلازم أولية |
| سنة ١٠ | أبسط الكائنات الحية الأحادية الخلية |
| سنة ١٠٠٠ | حيوان ذي زوائد خيطية |
| سنة ١٠٠٠٠٠ | حيوانات ثديية من بينها الانسان |

وهذه تقديرات حدسية جداً مبنية على أمور ظنية . فلكي تقترب ذرة من أخرى لتكون جزيئاً فإنه يلزم لذلك قدر من الزمن . ويكون الزمن اللازم أطول إذا كانت الذرات الداخلة في التركيب المراد أكثر عدداً . فثلاً فلز الفضة متبلور في المادة ، ولكن إذا تكاثف بخار الفضة بسرعة فلا يكون لدى الذرات متسع من الوقت يكفي لأن ترتب نفسها ، فتراكم فوق بعضها بشكل ما مكونة كتلة غير متبلورة . أما العمليات الغروية فتستلزم مدداً أطول ، لأنه توجد جزيئات كبيرة ضخمة ترتب نفسها على سطح الجسيمات الغروية . وأما في الصيغ الأولى للبروتوبلازم تكون النماذج الجزيئية أكثر تعقيداً من ذلك ، ومع هذا فلا بد للجزيئات من زمن آخر لكي تنظم نفسها على الوجه الصحيح

وربما كان الذي يعوقنا عن عمل البروتوبلازم هو قصورنا فقط ، ولكننا على كل حال نحاجون بلا شك إلى زمن يتزايد بكثرة لكل مرحلة من مراحل التطور المتعاقبة . وسيكون الحال كذلك دون ريب عندما نصل إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيداً من جراء مراعاتها الوسط خلال تولدها أجيال عدة . أما الكائن الحي الراقي فلا يمكن تكوينه مباشرة ، إذ أن الترتيبات الجزيئية

في جسمه لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق أسلوب حيوي بسيط. يستغرق نشوؤه أجيالاً لا عداد لها. وتبقى الوراثة المضوية في النماذج التي تنشأ فقط بعملية التناسل المتكررة البطيئة. وإذن فالزمن هو كل ما يعني أن يتقلب عليه العالم الظموح في قطامه إلى خالق جنين آدمي، إذ أن كيمياء الزمن التركيبية وحدها هي التي تستطيع أن تبني الكائنات الحية التي يحمل كل فرد منها في طيات نفسه سلسلة توارثية طويلة.

أما مقادير النهايات الصغرى لزمّن المطلوب في كل حالة فجزء من ألف جزء تقريباً من الأزمنة الحقيقية اللازمة في التجارب المعملية أو في تاريخ التطور كما تدل عليه المدونات الجيولوجية. وربما تكون أول خلية حية قد استغرقت في نشوئها من المواد غير المضوية مليون سنة أو يزيد، وربما تكون الحيوانات الندية قد استغرقت ألف مليون سنة. وربما تكون هذه العمليات قد جرت بأسرع من ذلك. فالأزمنة المعطاة ليست سوى تقديرات لنهاية الزمن الصغرى التي تلزم في حالات الكمال المتخيلة. والراجح أننا سنصل بتقديم المعلومات في التطور إلى استكشاف أنه لا بد من مضي زمن معلوم قبل أن تكون المجموعات العضوية ذوات التراكيب الخاصة المعقدة. وفي هذا الصدد يصح أن نقول إن النطفة والرحم عند الإنسان يحملان في طياتهما تركيباً ربما يكون قد استغرق مليون سنة على أقل تقدير.

وليس لغير مههد دولي للأبحاث التطورية تشرف عليه أثبت عصبة دولية أن ينسج أمامه الأمل للوصول إلى خلق إنسان صناعي. وحتى مع هذا تمكاد ثقة الإنسان في إمكانية ذلك تضيق لأن الزمن يعمل أكثر مما يعمل الإنسان. ولكن الإنسان بالجلد والمثابة، جيلاً بعد جيل، قد يستطيع ذلك بشرط أن يكون قد عرف كيف ينهز سنوح فرص الزمان المبدعة الخالقة، وأن يحذر الوقوع في خطأ يقطع عليه الوصول إلى كنز السنين المتجمع المتراكم، ونقصده به الوراثة التطورية. أما كيف يصل الإنسان إلى تقدير الحياة، وكيف تغير مثل هذه التجربة وجهة نظره إلى البشر تغيراً عميقاً، فكلاهما أمرٌ معجز لا يقدرُ بثمن، وهو ثمرة مليون سنة وستسمح لنا معلوماتنا العلمية بعد عشرين سنة أن نبدأ بها هذا العمل العظيم، وسنبذل المال بسخاء للاشتراك في تأسيس هذا المعهد الدولي. لقد أمر الله الزمان لخلق الإنسان، وقد يستخدم الإنسان بأمر ربه هذا الزمان لخلق الإنسان مرة أخرى. وكل ما في الأمر أننا سنمهد السبيل للحياة لكي تنشأ من جديد متى اكتملت أسبابها المتخيلة، وستكون سوبرا مقرر هذه الأبحاث التطورية. ويصح أن تظهر الحياة بتوافر هذه الأسباب بأسرع مما ظهرت أول مرة على سطح هذا الكوكب السيار الوحشي. وقد يغضب الله سبحانه وتعالى من ذلك فيعجازي بني الإنسان على محاولتهم إقامة هذا الصرح الذي يصل بهم إلى سر الحياة، فيسلط على أولئك العلماء العاملين

لا « طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل » بل اختلالاً في الموازين والمقاييس يتركهم حيارى يمتحن

والواجب في أمثال هذه المشروعات أن يؤخذ بأسبابها جدياً ، فمن أرقى الكائنات الحية وأكثرها اعتداداً بالنفس والشعور ، وقد آمدنا الله بكثير من وسائل البحث الفيزيائي وأسماها به قبل أولئك الذين وهبهم الله منا قوة التخيل الخالصة المبدعة والذين يقدسون الحياة أن ينهضوا هم بمسئولية ذلك ويستخدموا الوسائل العلمية في أغراض الانشاء والتميز لا الهدم والتدمير . ويستطيع كل منا أن يتصور اهتمام الناس بأمورهم وقد تحول فجأة إلى سويسرا بعد أن تكون محطات الأذاعة اللاسلكية العامة قد أذاعت أن الأميا الصناعية الأولى قد أوجدتها يد الفيزيقي البيولوجي . ولو أننا وجهنا جهود العلم إلى ذلك لاستطاع في المستقبل أن يعوضنا عما أضاعه ماضيه في صناعة المقتضيات المهلكة مثلاً من وقت وجهه ومال وأرواح . بل تخيل إلي أن الحكومات ستكون من الضعف بحيث لا تستطيع أن تدعو إلى حرب لو أن الفيزيقيين رفضوا أن يصنعوا المدافع وأدوات الحرب المهلكة ، وأضربوا هم والعلميون جميعاً عن عمل أي شيء ، فينتهي كل خصام إلى التعظيم العادل

وقد ينظر إلى مسألة الحياة في ضوء جديد إذا قبلت هذه الآراء المتخيلة ففرضنا أن ثمة فترة زمنية لازمة لتكون أي كائن حي . لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن القوانين التي تحكم الحياة لها لا بد أن تتضمن عمر الكائن الحي ابتداء من لحظة معينة في تاريخه . وقد نضج لهذه اللحظة البرهة التي تستقر فيها النطفة داخل الرحم في الحيوانات الراقية ، أو يصح أن يعتبر العمر في تلك التجربة التطورية التي ذكرناها ابتداء من اللحظة التي اتحدت فيها أولى المواد التركيبية الكيميائية الأولية فكانت جزئيات . والمهم إذن أن هذه العملية التطورية كلها يجب أن يبرعها بقوانين تدخل في حسابها عمر المجموعة التي قد تكون قيد الفحص والبحث

فاذا حدث مثلاً أن وجدت في كل من ذرتي إيدروجين الطاقة التي تكفي لاتحادها فتكونان جزئي إيدروجين ، ثم تقاربت الذرتان من بعضهما واتحدتا ، فالواجب أن يبين القانون الذي يصف ما حدث أن الاتحاد تم في لحظة ما وأن العملية قد بلغت غايتها . وهذا مثل لعملية غير قابلة للاعقاب لأن الجزئي لا يمكن أن ينحل ثانية طواعية واختياراً . وعدا هذا فإن التعبير الرياضي لهذه العملية يجب أن يتضمن عمر المجموعة الصحيح الذي عنده تم العملية مقيساً ابتداء من لحظة ما أساسية مختارة . وبذلك نضع حداً شائعاً للقاعدة التي وضعها مكسويل أساساً للفيزياء . فهو يقول بأن قوانين الفيزياء يجب أن تكون أبدية وغير متغيرة ، وأنها لذلك يجب أن تصاغ بحيث لا تشمل بشكل ظاهر على الزمن . ومعنى هذا أنه بالنسبة للقوانين الفيزيائية لا يمكن أن يكون

ثمة فرق بين اليوم والغد . فالقوانين تختص حتى بالتغيرات الصغيرة التي تقع للمجموعات في فترات زمنية قصيرة ، فهي إذن ليست بحاجة إلى إيضاح أي تمييز أساسي بين لحظة وأخرى أمثال هذه القوانين لا يمكنها أن تفسر لنا كيف يحدث شيء مفاجيء فيسبب تغيراً جوهرياً في المجموعة ، كأن تصبح مجموعتان مجموعة واحدة أو كأن تنقسم مجموعة إلى مجموعتين . والواجب أن توضح قوانين النمو أو التطور العضوي كيف تحدث للمجموعة أمور خاصة عند بلوغها سنّاً خاصة ، كإحداث ذرتي لأيدروجين أو كادراك السكان الحي من البلوغ . فقاعدة مكسويل تضع تحديداً لصيغة القوانين الفيزيكية ، وهذا التحديد من شأنه أن يححو تماماً القوانين التي قد تكون مناسبة للكائنات الحية . ولكن ليس هناك ما يمنع ظهور فيزيقا أخرى أوسع من الحالية تحاول أن تصوغ هذا النوع الجديد من القوانين وهو الذي يمكن أن يطبق على تاريخ المجموعات الفردية وتكشفها ، ومن المحتمل إذا أمكن الوصول إلى ذلك أن تبدو لنا قوانين نيوتن وأينشتين ومكسويل كأنها أشياء تقريبية تصلح عند عدم حدوث شيء ذي أهمية خاصة ، أي مثلاً عندما كانت تحسب التغيرات الفضائية وحدها دون تركيب الضوء أو تحليله أو انبعائه

وتفرض القوانين التي من النوع التوتوني الذي فكر فيه مكسويل أن الانسان يمكنه أن يشرح أحسن شرح الحالة الحاضرة لمجموعة مادون تعيين تاريخها الماضي . ولكننا لا نستطيع أن نقول شيئاً عن داخل السكان الحي ويكون دقيقاً كل الدقة ، ولذا رؤي أن الأصلح شرح ما عرف من تاريخها الماضي . نحن لا نحاول أن نقول أين توجد الذرات في السكان الحي ولا متى وجدت ، بل نحن نذكر بدلاً عن ذلك نوع السكان وعمره وما إلى ذلك . فيصح تعريف الكائنات الحية إذن بأنها مجموعات بسهل تقدير مستقبلها من تاريخها الماضي عن تقديره من تكوينها الداخلي الحالي . ومن ثم كانت أسهل صيغ القوانين العضوية هي تلك التي توضح عبارتها بدلالة عمر السكان الحي والتي لا تهمل تاريخ حياته . وهذه القوانين بالضرورة غير قابلة للاعقاب ما دام تمثيل الأكسجين أو الطعام سائراً في طريقه بشكل لا يمكن أن ينعكس أو يتقلب . إن الحياة أشبه شيء بوظيفة لا بد أن تتغير باستمرار في اتجاه واحد ، فإذا ما وقف هذا الاطراد اختفت الحياة . والفرق بين الحي والميت يبدو الآن أقل أهمية من تقسيم العمليات الطبيعية كما يأتي : —

أولاً — عمليات قابلة للاعقاب ويمكن التعبير عن قوانينها بدون عمر المجموعة ، مثال ذلك الحركات التناقلية والميكانيكية التي لا تتضمن ضوءاً أو حرارة

ثانياً — عمليات غير قابلة للاعقاب ، وهذه يعبر عن قوانينها خير تعبير بدلالة الزمن

الكلي الذي مضى ابتداءً من حالة أصلية ما. مثال ذلك الاتحاد الكيميائي والنمو والتطور والنشاط الإشعاعي وتأثيره كيميائياً وجميع التغيرات التي تتضمن ضوءاً أو حرارة. وطالما أكدت الفيزياء أن العمليات التي من النوع الأول أساسية في الطبيعة ، وقدم علم الفلك مثلاً نموذجياً لذلك في حركة الكواكب السيارة . وقد كان هذا التأكيد وحده سبباً في ظهور النتيجة الجوهرية من خلف الصراع بين النظامين الآلي والحيوي. ولكن إذا كان الاستناد بورن صادقاً وكانت العمليات الذرية الأساسية غير قابلة للانقلاب فإن الموقف يتغير كلية . ولا تعتبر الحياة بعد ذلك عارضاً قاهراً غير مقيد في دنيا ذات قانون ميكانيكي ، إذ الواجب أن تعتبر قوانين الجاذبية والميكانيكا ، في حالة ما تكاد تكون قابلة لعدم الانقلاب عمومية ، كأنها حالة نهائية لسلسلة كاملة من عمليات غير قابلة للانقلاب تشمل على أهم أمثلة النظام الأساسي في الطبيعة . وتتضمن هذه السلسلة بالطبع العمليات الذرية المتصلة بالحرارة والضوء والكهربائية والاتحاد الكيميائي والتأثيرات الفردية والنمو العضوي والتطور العضوي وتلك العمليات الكهربائية البالغة حد الانتظام والدقة التي هي أساس الشعور . فإذا كانت وجهة النظر هذه صحيحة فإن العمليات الذرية للإشعاع والاتحاد الكيميائي يجب أن تكون تلك التي يريدها البيولوجي في تكوين الكائنات الحية . وبدلاً من خواء الجسيمات الصغيرة الحاضمة لقانون التوزيع العكسي يقدم الفيزيقي الحديث لزميله البيولوجي نوعاً جديداً من ذرات ذات خواص كهربائية ومغناطيسية تجعله قادراً على بناء مركبات ثابتة

وقد يقول له البيولوجي « نعم ولكن للكائنات الحية أربع ميزات هامة ، فسلوكها التخلقي غير قابل للانقلاب ، وهي تنمو ، ولها ذاكرة ، ولها غرض وظيفي . فإذا قلت لي إن ذراتك تخضع للقوانين غير القابلة للانقلاب فيها لأن كائنات الحية تخضع لهذه القوانين . ولكن نمو بلوراتك يختلف كثيراً جداً عن نمو خلاياي وكائناتي الحية ، ثم إنك لا تستطيع تفسير الغرض الوظيفي الظاهري للحياة كلها . »

فيجيبه الفيزيقي « هب أن ذرتي إيدروجين تبعدان أحدهما عن الأخرى مسافة ما ، وأن بهما من الطاقة ما يكفي لأن يكونا معاً جزيء إيدروجين . فإذا بدأتا تتحركان صوب بعضهما بتأثير قوة جاذبة فذلك لا يدهشنا . ولكنهما تسيران صوب غرض نهائي ، هو على كل حال غرض وإن كانتا بالطبع لا تشعران به . فإذا لم يتدخل بينهما دخیل فهما لا بد متصلتان معاً مكوتان جزيئاً ، وتكون العملية إذن قد بلغت ذروتها . وتأثر الذرتان بقانون جاذبي قاهر فتتحركان صوب حالة نهائية لا يمكن الإفلات منها ما لم تتدخل مؤثرات خارجية . وتبلغ مجموعة الذرتين بالضرورة الغرض النهائي ، وتكون للعملية في معناها هذا صفة التعليل الغائي teleological ،

ولإن يكن هذا لا يعني أن قوة ما قد رسخت عادة متعمدة هذه الناية لذرتي الأندروجين هاتين « فهذه الصفة لم تكن في قانون الجاذبية النيوتوني ، وذلك لأنه أخفق في أن يذكر لنا ما يحدث عند نهاية أية عملية . مثال ذلك عند ما يصطدم نيزك بالأرض . وتهرب القوانين النيوتونية من مسؤولية البحث في الحوادث المثيرة المستعنة ، كتزاح الذرات وموت النيزك . ويبدو محتملاً من الجهة الأخرى أن جميع القوانين غير القابلة للانقلاب يمكن أن تفسر بأنها تجريء من ، أو تؤدي إلى ، حالة انتهاء إنقلابية . وعلى ذلك فجميع العمليات الحرارية تميل إلى جمل درجة الحرارة واحدة تقريباً ، وكذلك تسير التفاعلات الكيميائية صوب حالة نهائية . وتبدى أمثال هذه المجموعات أوليات الفرض الباطن أي غير الواعي وعلينا أن نتخيل هذه المجموعات وقد جعلت أكثر تعقيداً فاستغرقت زمناً طويلاً ولاقت تغذية طيبة قبل أن تبلغ غرضها غير الواعي سواء كان ذلك الفرض هو التوالد الفريزي لحفظ النوع أو كان أية وظيفة بيولوجية أخرى »

فيقول البيولوجي « قد يكون ذلك صحيحاً ولكني أحب هذا الفرض غير الواعي الذي كشفت عنه الفئاع في الفيزياء غير القابلة للانقلاب لأنني صقت ذراعاً زملائي الذين يرون العقل الواعي في كل مكان . ولكن إذا ساءت لك بأن رأيت في الذرة ، وما ترتب عليه من جزئيات وغرويات يقرني على رأيين من آرائي الأربعة في الحياة وهما عدم قابلية الانقلاب والفرض غير الواعي فلا يزال لديك النمو والذاكرة »

فيجيبه الفيزيقي « حقيقة إن النمو والذاكرة أمران لا تعرف عنهما الفيزياء إلا قليلاً . ولكننا على كل حال قد اخترنا مسألة الحياة إلى أصغر نسبها . فهي لم تعد إحد السؤال القائل « ما هي الحياة ؟ » بل انحصرت في السؤال عن كيفية تحويل العمليات الغروية نفسها إلى مجموعات ماضية في النمو والترقي ، فعالة باستمرار ، تستطيع أن ترد على تأثيرات الوسط فتحصل في النهاية على خاصية ما . وهذا السؤال بالطبع أقل صعوبة من الأول. وعدا هذا فما دامت مسألة الاشعاع هي أساس جميع العمليات الكيميائية المقترنة بالحفاظ على الحياة فإن لنا أن نتوقع مدداً عظيماً حينما أوضح لنا الفيزياء هذه المسألة المعقدة وتبسطها كل التبسيط »



الفصل التاسع عشر

الفيزيكا والعقل

تضمحل بسرعة تلك الميزات المدهشة التي كانت يوماً ما ، تفرق ما بين المادة والعقل . فالعقل لا يقل عن المادة في انه « غير هيولي » والمادة لا تقل عن العقل في انها « معترف بها » ولتعليل تطور الكون وتاريخه وسلوكه ، او لتعليل ذلك بالنسبة لاي كائن متضمن في الكون ، تعليلًا يتصل بالعقل او الحياة او المادة فان اولى قواعد العلم يجب ان تتضمن في النهاية ، عدا القوانين الميكانيكية ، شيئاً من حركة التكيف والا تتخاب والقود

« الدكتور شارلز س . مايرز »

لو أن عالماً سيكولوجياً غير سلوكي ^(١) كان مصغياً للحوار السابق لندخل فيه قائلاً « هل يرى الفيزيقي جاداً أن علينا أن نحاول إبعاد العقل عن الصورة التي نرميها لجسد الانسان ؟ وحتى إذا استطعنا في النهاية أن نفسر الأغراض غير الواعية لدى الكائنات الحية الدنيئة بأنها نهايات تدفع إليها بقوانين فيزيقية ، فان الانسان مع ذلك يظل صاحب الميزة الكبرى ميزة العقل الواعي . فهو يستطيع أن يختار له غرضاً . وهو إذا شاء نبذه لغيره . ولذا وجب عليك في الصورة التي رسمتها أن تسلم بظهور العقل عند نقطة ما خلال التطور »

فيجيبه الفيزيقي « على رسلك يا صاحبي ! إن نظرتك الفاحصة كلها صوب الشعور أو الوعي لا تتم فقط إلا على رأي مقتصر على مرحلة واحدة من مراحل نمو الانسان فلا توجد البتة حالة يمكن أن تعبر عنها كلمة « واع » تعبيراً ملائماً . وتوجد في الحقيقة حالات شعور كثيرة جداً ومختلفة أيضاً متدرجة بعضها مع بعض ، أو تؤلف بعضها مع بعض ، سلسلة حالات متميزة . ونحن لا نعرف الكثير عنها ولكن تنوعها مدهش للغاية . وهناك ذلك النوع الغامض من الحس حين نقيق من الكلوروفورم ، وحين تعترينا الأحلام ونحن نيام ، وذلك الاحساس السلبي الذي يصحب النشاط المنظم كما في حالة الجري . وتوجد عدا ذلك حالات أخرى معروفة مختلفة

(١) السلوكية behaviourism مذهب سيكولوجي مبني على دراسة السلوك دراسة موضوعية

عن ذلك كل الاختلاف في أحلام اليقظة ، وفي التركيز الذهني وفي شبه الوعي لدى الفكر المبكر المبدع . وتصور على الأخص حالات الشهور المرتبطة بالحب ، أو بحركات العقل العليا المبدعة . فالارادة الحرة أو حرية الاختيار تنعدم بناتما في حالة الوله كما تنعدم لدى الفنان الذي يضطر إلى اتباع ما يوحى به إليه إلهامه شبه الوعي لأداء ما عليه . وفي أمثال هذه الظروف تختفي الارادة الحرة وتنعدم إزاء حاسة عوز عضوي داخلي

« إدخال هذه الأمثلة قد يثبت أن الغرض الواعي ليس بأي حال التشخص النهائي أو التشكل الأرفع للسلوك عند الانسان ، وأن الارادة الحرة لا يمكن أن يفهم منها من ثم القدرة على تخطي قوانين الطبيعة . وما الارادة الحرة في نظري إلا خاصية ظاهرية للسلوك العضوي عندما لا يكون قد تم تكامل الشخصية ، وحينما يكون العقل قادراً على أن يتردد بين غرضين . فعملينا في الحقيقة أن نتناول بالبحث عند الانسان سلسلة كاملة من صنع السلوك ذي التعميد والتكامل الباقين الحد ، كالأفعال العكسية والفرزية ، والحركة الاختيارية ، وأخيراً كوظيفة الألهام الابتكارية التي تؤدي إلى نهايات لا يمكن إدراكها ولا التنبؤ بها عقلاً . فيجب أن يقابل كلا من هذه نوع ما من الشهور ، هو في نظري عملية حجة ذات درجة تعقيد معينة . وبمقارنة ذلك بتجاريدنا بخصوص أساليب الشهور المختلفة يمكن أن نستنتج من بناء الجهاز العصبي المركزي لأي كائن حي نوع الشهور الذي عارسه

« وأخيراً فلا بد أن نتوقع يوماً أن نصل إلى وضع منهاج للسلوك العضوي كله بدلالة العمليات العنصرية وقوانينها ، ولكن قد يكون أسهل كثيراً في بعض الحالات أن نفسر ما يحدث للانسان بألفاظ تعبر عن مجريه الوعي . وينكر السلوكي الدلالة العلمية لسل شيء إلا دلالة عناصر التجريب الواعي البالغة غاية الوضوح ، ولكن كان عليه بالطبع أن يبدأ بأدراك الانسان الضوء واللون إدراكاً كاملاً . إن العلم لا يمكن أن ينجح بغير آراء تكسب كل فواها من صفات التجريب الواعي ، ومن ثم يكون موقف السلوكي المتطرف قد نشأ من حكم سابق يعوق سلامة التفكير . على أن السلوكية ، باعتبارها حيلة موجهة لتدعيم الملاحظة المباشرة لما يحدث حقيقة للكائنات الحية من حيث الحركات الفيزيائية ، تحسن صنفاً إذا هي جاءت لنا بعمليات غير مفرضة ولا متحيزة عن الحياة « أما تفسيرنا للمسألة فيمكن وصفه بالطريقة الآتية : إن الشيء الذي يعلم لنا في الطبيعة إنما هو عملية في الزمن . وتختلف درجات الشهور في العملية العنصرية تبعاً لتعقدها ودرجة تضامن عمل الأعضاء . ولا توجد هناك حالة تسمى الوعي عند الانسان لأن جسمه يمكنه أن يؤدي وظائفه بدرجات تضامن مختلفة في عمل أعضائه . وإذا ما سألنا عما إذا كانت الذرة عند امتصاصها الضوء تعي أو لا تعي فالسؤال يكون غير ذي معنى معين . ولكن بعد بضع سنين سيتمكن

المتممكون في دراسة فسيولوجيا الجهاز العصبي المركزي من بيان عدد خطى التركيب والتكامل الحادثة ابتداءً من أبسط خلية إلى الانسان المفكر المبكر المبدع ، وسينسب لسلك مرحلة من هذه المراحل أسلوب وعي خاص . ولكن هذا الوعي أو هذا الشعور ، قبل الوصول إلى درجة تفقد عضوي خاص ، لا يمكن أن يكون شيئاً يستطيع الانسان أن يتخيله ، مثال ذلك أن الانسان قبل الوصول إلى أغراض الشعور والوعي يصبح أن يسلم بوجود معرفة متواصلة غير مميزة مبنية بدورها على نبض متزن منظم للخلايا الأولية »

فيقول السيكلوجي « إن رأيك هذا لا يزال بطبيعة الحال مبهماً ، غير أنه يبدو في مجمله ملائماً . ولكن اخبرني هل يستطيع العقل أن يؤثر في المادة ؟ فأنت تشير ، على قدر ما فهمت منك ، إلى أن المادة تؤثر حقيقةً في العقل »

فيجيبه الفيزيقي « إنني لم أقل ذلك ، وأراك قد عدت إلى تلك الأسئلة الخرقاء التي أضع الفلاسفة فيها دون طائل وقتاً طويلاً . فأنت بسؤالك عما إذا كان العقل يستطيع أن يؤثر في المادة أم لا تكون قد سألت سؤالاً عديم المعنى ما لم تكن تعرف ماذا تعني بالعقل والمادة ، ومعنى العقل والمادة في نظر الرجل العلمي معرفة القوانين التي يخضعان لها . فمن جهة تدل نظرية النسبية ونظرية الكم الحديثة على أنه لا توجد هناك مادة بالمعنى القديم ، معنى الجسيمات المصنوعة من سلمة لا تتغير ، وعلم الفيزيقا يقول بأن العمليات الذرية وغيرها هي التي يجب أن تحل محل المادة ، حتى لقد استراب العلامة جينز الأمر فاضطر أن يقول بأن العقل لم يعد بعد ذلك دخیلاً على دولة المادة ، وأن علينا من باب أولى أن ننادى به خالقاً لها وحاكماً عليها . وهو بذلك يقترب كثيراً من العلم الروحي الحديث . ومن جهة أخرى أراك تعني بالعقل في الحقيقة صيغة نشاط واع خاصة ، ألا وهي حرية اختيار الفرض . ولذا فلا كي أكتب سؤالك معنى حقيقياً وجب أن نستبدل به السؤال الآتي : هل الاختيار الواعي لفرض ما يغير العمليات الفيزيقية الجارية باستمرار في جسم الانسان ؟

« ولكن هذا بدوره سؤال سخيف أيضاً لانه يشبه السؤال : هل الانعاج البسيط في خارج الطربوش يحدث تغيراً في شكله الداخلي ؟ والجواب الوحيد لهذا السؤال هو أن الانعاج في الخارج ما هو إلا طريقة أخرى لوصف الانعاج في الداخل . فلم يكن أحدهما سبباً للآخر ، كما أنك إذا تبيت قطعة من الورق فانك لا تستطيع أن تقول إن تجعد أحد وجهيها يسبب تجعد الوجه الآخر . إنهما متطابقان وصيغة السؤال المزدوجة هي التي تخلق لنا مسألة خرقاء لا معنى لها »

« فالاختيار الواعي للفرض طريقة لوصف عملية خاصة ، والمنع بعد حدوث هذه العملية يختلف عنه قبلها . ولقد سبقت النظريات القديمة الخاصة بتلازم العقل والمادة أو بتبادل الفعل

بينهما فافتترضت أنهما في نفسيهما شيئان منفصلان . إن هذه الأسئلة المهمة تختلف كل الاختلاف لو أدرك الإنسان أن العقل والمادة لا يوجدان منفصلين ، وأنهما كليهما ليسا سوى طرفين ناقصين لوصف بعض أوجه عملية عضوية واحدة ^(١) . فأما الوجه الفضائي للعملية العضوية فيسمى الجسم الفيزيقي . وأما الوجه الزمني لها فيقابل الشعور بمحتوياته . والجسم الفيزيقي مجموعة بخواص فضائية ، وأما الشعور فيجموعة عناصر زمنية ، كالذاكرة والاشغال والأمل والخوف والشوق ، وهذه كلها أمور تظهر في الزمن

« ولقد قال أحد العلماء «إن الزمن عقل الفضاء» وهو بذلك يحاول أن يفسر الفضاء والزمن بتشبيه آدمي . وذلك رأي إيماني جداً ، وإن يكن الأفضل للباحث الذي غرضه الوصول إلى طبيعة الشعور نفسه أن تكون العبارة هكذا : «العقل هو الوجه الزمني والجسم هو الوجه الفضائي» وما يجب ملاحظته أننا لم نصل بعد إلى ألفاظ وعبارات تصلح لوصف هذين الوجهين فالمادة لا تتلئم الوجه الفضائي ، إذ لا توجد جسيمات غير متغيرة ، والعقل لا يتلئم الوجه الزمني لأنه يوجد وجه زمني في عملية اتحاد ذرتي إيدروجين ، وفي العمليات الكيميائية والفيزيائية ، ولا يجوز مع هذا أن نقول بوجود عقل في هذه الأحوال . وحينما نتذكر ألفاظ جديدة للتعبير عن هذين الوجهين فإن هذه الألفاظ تقدم لنا أساس التركيب العلمي الذي أترقبه »

فيقول السيكولوجي «حسن وإني في قرارة نفسي ، كما فهمت منك ، قدرتي ^(٢) صمم مثلك ، وعلى الأقل في مواجهة مرضاي . ولقد كنت دائماً أضمن الصورة التي أرسمتها للمريض نوعاً من الحث على الحياة يمكن أن يتأثر بشخصيتي . فإذا كان سلوك مريض قد قدر حتماً فإن الشروط التي تعين ما يحدث له تتضمن نوعاً من ميل داخلي للحياة ، وكذلك تتضمن هذا الميل جميع التأثيرات التي يحدثها فيه كل من يصادفه من الناس . ولكن إذا حاول أحداً وضع قانون لهذا القدر المطلق المحتوم ، أو حاول تطبيقه على نفسه فانه يغوص في لجة عميقة . ولست أجد من الشجاعة

(١) يقول آرثر إندلاري رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن في كتابه «على حافة العالم الانثري» ما يأتي : « أنه لا مادة حيث لا عقل ، وإن السكون يمكن أن يختزل إلى شيء واحد هو الذي نسميه العقل ولكن هل نستطيع أن نتصور العقل بدون شيء يؤثر فيه العقل ؟ إنما نحن نقدر وجود العقل وهو يؤثر في المادة ، فالعقل والمادة لا بد أن يكونا متلازمين على الرغم من تباينهما — إذ أن أحدهما إيجابي والآخر سلبي . وعلى ذلك فلا سمح الله ألقناه على الشيء الذي يتكون السكون منه ، وهو المادة ، لا بد أن يتضمن هاتين الحالتين الإيجابية والسلبية . يجب أن يكون انبثاقاً في طبيعته ، إذ أن الواحد بدون الآخر لا يمكن تصوره . وهكذا يرتبط العقل والمادة معاً ، ويستحيل عليك أن تفكر في أحدهما وهو بمنزل عن الآخر . وقد مر ذكر ذلك في الفصل الثالث

(٢) مذهب القدرية determinism هو مذهب تنبؤ الاختيار

ما يحفزني على هذه المحاولة . ويبدو لي أنك لابد أن تكون صادقاً ، وإن يكن علم ذلك متروكاً لله الواحد المتعال »

فيجيبه الفيزيقي « وهنا أتفق معك ما دام الواحد منا لا يمكنه في برهة أن يصحح وجهة نظره كلها في الحياة بدلالة هذه المعلومات العضوية الجديدة فذاك بلا نزاع عمل كبير جداً ، وأرجو أن أحاوله يوماً ما . ويدفعني لتصحيح هذه التقديرات أمران : أولاً أن أولئك الذين يحب عليهم قبل غيرهم أن يكونوا أكثر الناس وقوفاً على بواطن الأمور ماضون في صوغ قوانين أدبية أخلاقية تجمع ما بلغت دراياتهم ومعلوماتهم . ولكننا نعلم مبلغ عمق تأثير سني الطفولة الخس الأولى في حياة الطفل ، ولذا فإن هذه القوانين تكون رثة بالية لا نتم إلا عن أن من يصوغها لم يتعلم بعد كيف يصل إلى إرضاء العاطفة وتهدئتها بوسائل أسلم وأصح . وربما أدى تحليل السلوك الانساني في حدود مذهب القدرة العضوية إلى ما يبرهن على أن الأحكام الأدبية التي تدن أي مذهب اجتماعي مثلاً أو أي أنواع الخطايا لن تكون منتجة ما لم يصحبها على الفور مثل إيجابي أو إيجابي إبداعي إبتكاري

» على أنه يوجد سبب آخر أكثر لفتاً للنظر من أجله أرغب في تقدير المعاني والقيم . فإذا كان مذهب القدرة العضوية صحيحاً فإن الإلهام الذي يوحى إلى الفنان أن يدع ويتكر نتيجة لزومية طبيعية لقانون عضوي ما . ومن ثمّ يصح اعتبار الإلهام الإبتكاري المبدع القضاء المقدور على أناس دون آخرين ، وإن يكن هؤلاء كذرتي الإبدروجين لا يعرفون إلى أي طريق هم مسوقون . ولكن مذهب القدرة العضوية يجعلنا نفهم لماذا كان غير مهم ألا يعرف الفنان ما سيبتكره قبل أن يبتكر بالفعل . والظاهر أن جسمنا العضوي يكون في بعض الأمور أكيس منا وأحسب ، أو بالأحرى أكيس وأحسب من شعورنا الذي الفطير جداً . وحينما نسمي شعورنا ونزقيه باستكشاف القوانين العضوية التي تخضع لها الطبيعة البشرية فإنا قد تمكن من جعل حياة الإنسان أكثر حسناً وجمالاً »



الفصل العشرون

مستقبل العلوم

يؤدي بنا كل طريق علمي نسلكه الى سياحات سحرية في الماضي السحيق والمستقبل البعيد . وسواء كنا نصحب الرواد أو نتقن أثرهم ولو الى مسافات قصيرة في الطرق التي يشقونها فاننا نجد أنفسنا محاطين بعوالم كبيرة وصغيرة . وسندعو لوجدتنا ذلك الساحر العظيم ، ونقصد به العلم ، فيحملنا على بساطه السحري ، فنواصل أسفارنا ونحن في كنف حجرنا التي فيها وضعنا الحجر أو المنظار . لم يكن كولبس آخر رجل قدر له أن يستكشف دنيا جديدة ، وسيجيء ذلك اليوم الذي يقسق الرواد فيه أعلى جبل ، ويعرفون كل ركن من أركان الأرض ، ولكن سنبقى بعد ذلك قم ومحاطات أخرى كثيرة تنتظر أولئك الذين لا يزالون في ريمان الشباب . لقد بكى الاسكندر الأكبر لأنه لم يجد دنيا أخرى يفزوها ، ولكن رجل العلم لن يبكي ابداً لذلك السبب ، فهو يعرف أن امامه دنيا كثيرة ، وكثيرة جداً ، عليه أن يرثاها ويستكشفها من مقال يهتم ان « بساط العلم » في كتاب « عجائب العلم »

لقد أوضحنا في الصفحات الماضية الطريقة التي قد تؤثر بها البحوث الفيزيائية الجارية في الآراء العلمية الخاصة بمسائل المادة والحياة والعقل . ولقد أسفر البحث عن أننا وقوف في ليل سينحصر صحبه عن تركيب علمي عميق تعينت فعلاً حدوده الرئيسية : والسكل ماضون في ضبط هذه الآراء وسبكها لكي تنهأ لكل من يهيم الأمر فرصة اختبارها بنفسه بعض ما تنبأ به العلميون عن مستقبل الفكر العلمي . ولن يتضمن ما سنبسطة هنا أي إنباء بالمستقبل يكون خارقاً للطبيعة ، بل سيكون ما نبسطه مبنيًا على اتجاهات هي فعلاً من لوازم فروع العلم المختلفة . وللسهولة قد وضعناها على صورة بيانات منفصلة عن مستقبل كل من الفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا

— ١ —

قبل سنة ١٩٤٥ سيصل علماء الفيزياء إلى تبسيط النظرية الذرية تبسيطاً كبيراً يكون من جرائه الوصول إلى معرفة حقيقة عمليات السكم ، ونستطيع في الوقت الحاضر أن نعتبر جوف الذرة متقدماً بدرجة كبيرة . أما البرهان على صحة هذه النهاية الظاهرية—إن لم تكن المطلقة—

التي وصلنا إليها في بناء الطبيعة الذرية فيكون قاصراً على إيجاد علاقات بسيطة تربط ثوابت البناء الذري المرموز لها بالرموز «ش» «ك» «ل» «ك» «ل» «ك» «ل» «ك» «ل» (أي الشحنة الكهربائية والكتلة وكتلة البروتون وسرعة الضوء وثابت بلانك) . وهذه العلاقات معروفة فعلاً ولكنها معتبرة عدمة الدلالة والأهمية نظراً لأنه قد قلبت عليها نظرية الأبعاد الكهربائية المقبولة لدى العلماء

ومع ذلك فهذه المجموعة البعدية ليست مبنية على المشاهدة المباشرة ، ولكن أهمية هذه العلاقات ستصبح بسرعة من التجارب التي يكون الفرض منها تعيين السرعة الإلكترونية في مسار منعزلاً تعييناً مباشراً . وستكون السرعة الإلكترونية المحسوبة من تجارب الانحراف غير مطابقة لتلك المحسوبة مباشرة والتي قدرت ، بكذا ستتمتعات في الثانية . وأما في حالة المسارات الإلكترونية المستقيمة فتستكون السرعة المقاسة مساوية دائماً لسرعة الضوء ، وإن يكن هذا لا يهم كثيراً ما دامت سرعة الضوء في اتجاه واحد لم تقس قط

وبدلاً من المجموعة النيوتونية القابلة للانقلاب ستوضع مجموعة آراء فيزيقية جديدة تلائم العمليات غير القابلة للانقلاب ، وذلك سيكون نتيجة لدراسة مسارات الاشعاع الفردي كما في انعكاس إلكترونات بالبلورات مثلاً . ويحتمل أن يؤسس النظام الجديد على اعتبار أن الذرة بأفلاكها الإلكترونية المشعة ساعة طبيعية لا نستخدمها فقط في قياس الفترات الزمنية وتعيين المتساوي منها ، بل سنجد فيها أيضاً نموذجاً تشخيصياً موضوعياً للماضي والمستقبل . ولكي يكون هذا الرأي ، أو بعضه على الأقل ، صالحاً للاختبار التجريبي يوضع التعريف الآتي : « الفترة الزمنية التي تفصل ما بين أي اثنين من الحوادث النقطية الواقعة على أي مسار إلكتروني ليست إلا دلالة بسيطة لطول جزء المسار بين النقطتين ولتقوسه » وهذا التعريف

يخالف تفسير النظرية الإلكترونية الحالي في نقطة لم تعرض بعد للاختبار التجريبي وستجمع الآراء التي ستبني على أساس تجارب السرعة الإلكترونية حقائق الاتحاد الكيميائي والعمليات الغروية في نظرية بسيطة واحدة ، لأن هذه تتوقف على التأثيرات غير القابلة للانقلاب المتعلقة بالاشعاع والإلكترونات ، وهي لذلك ستكون طيبة في معالجتها بالآراء الجديدة لنفس السبب الذي أبعدنا عن تناول القوانين النيوتونية

— ٢ —

ونتيجة لتغير الآراء الفيزيكية ستكف البيولوجيا عن المضي في وضع حد معين للتفرقة بين المجموعات الحية وغير الحية . وستبين العلماء أن سمات الحياة تظهر لهم متدرجة إذا هم تدرجوا مع السلسلة الآتية وهي الذرة فالجزيء فالنروبي فالبروتوبلازم فالخلية فما بعد ذلك من المراحل

إلى الحيوانات الثديية حتى الإنسان . وفي كل قسم من الكائنات الحية ستكشف عملية مركزية ضابطة ، وتصاغ لها قوانين محكمة بدلالة الصليات الكهربائية الكيميائية غير القابلة للانقلاب . أما العملية التي تمثل في كل كائن حي عامل التضامن العضوي والتي هي حياة السكان باعتباره وحدة فسيولوجية عنها بدلالة كمية يرمز لها بالحرف (ع) مثلاً . وهذه الكمية (ع) باستمرار ترايدها بقي السكان حياً ، فإذا ما سكنت فارق الحياة . ومعدل زيادة (ع) يدل على سرعة انتظام السكان أو على شدة الحياة لديه . فكأنما الحياة سرعة متزايدة منتظمة التغير عجلتها (ع) هذه وفي الحالات البسيطة قد تناسب (ع) تناسباً طردياً مع مقدار ما يأخذه السكان الحي من طعام أو أكسجين . ولما كان التنفس والتخيل غير قابلين للانقلاب كذلك تكون (ع) غير قابلة للانقلاب . ولا بد لها إذن من المضي في الزايد ، وإلاً فلها تكلف عن أن تمثل أية كمية في الطبيعة . وبمجرد وقوف ترايدها تقف العملية المقابلة لها وتمحى آثارها

وسيعرف العلماء قبل سنة ١٩٥٠ أهم العوامل التي تؤثر في دالة الحياة (ع) ، وهي العوامل التي تؤثر في العملية المركزية الضابطة في أي كائن حي ، وتكون نتيجةها ألا توقف فقط بعض الثورات المرضية كالسرطان مثلاً بل تمتنع بناتاً . وستستكشف وسائل غير ضارة لزيادة معدل تغير (ع) أي لزيادة الوثوب الحيوي لدى السكان الحي ، فتقل مثلاً مدة الحمل حتى تصل إلى نهايتها الصغرى الطبيعية . وإذا كان الحمل يستغرق في أيامنا هذه زمناً طويلاً فهذا لأن جسم المرأة صار متعباً منهوكة ، أو لأنه تسمم جزئياً بسبب نسق معيشتها . فبرفع حيوتها في اللحظة المناسبة ينظر أن تسير العملية بسرعتها الطبيعية . ولا بد أن تكون هناك نهاية صغرى للزمن اللازم للعملية لأن عدداً كبيراً من العمليات العضوية المعقدة يتم بترتيب خاص . ويحتمل أن يكون هذا الزمن أقصر كثيراً من الزمن الذي تستغرقه كثرات من النساء

ومعلوم أن التوالد المندلي (نسبة إلى Mendel) الذي يعين الوراثة يرجع إلى تكشف عمليات خاصة في السكان الحي . ففى ما أمكن ضبط سرعة انتظام الحياة ، أو معدل زيادة الدالة (ع) في أي كائن حي أو في أية مجموعة من الخلايا داخل السكان الحي نكون قد وصلنا إلى طريقة جديدة لبحث موضوع الوراثة العملي . ومن الجائز أن يتقلب على الضعف الوراثي أو المرض الوراثي بتعجيل أو إعاقة حركة تكشف جسم الإنسان في لحظة ما ، ما بين حدوث الحمل وسن البلوغ وسيكون تجديد الشباب مأموناً وناقماً ، وليكن لا كوسيلة لمحاولة الخلود والتعلب على الموت وسيتبر من الوجهة الاجتماعية قانونياً حينما يباشر فقط في حالة الشيخوخة التي تصيب البعض قبل الأوان بسبب الكبح أو السكت أو المرض أو الهم أو القلق . وليس معنى محو الأمراض المعروفة بوسائل بيولوجية صحيحة أن تظهر أمراض أخرى أفنك من سابقتها . إن علم الحياة

النظري سليم بحقيقة الأمراض كلها ، وإن يكون منه لأحدها سبباً في ظهور غيره . وإن فجهز بعد ذلك حملات صحية لمقاومة الانفلونزا مثلاً ، أو أي مرض آخر ، بل سيعين هذا العلم الفهم الصحيح للحالات التي لا يمكن لأي مرض فيها أن يظهر ويتكرر ، وبذلك تتمحي بالتدريج جميع الأمراض المصوبة التي تهاجم جسم الانسان

وهذا أيضاً ليس معناه الحصول على نظام صحي خيالي تتكامل فيه الحياة من تلقاء نفسها بل معناه أن السرطان والزهرى مثلاً سينعدمان ، لا لأن أمراضاً أخرى ستحل محلها بل نتيجة للزيادة من ثم في حساسية المخ . أما عمل المائة سنة التالية فسيكون شاقاً لأنه سيخصص بحفظ عقل الجنس سليماً رصيناً خلال مدة الحساسية المتقلبة . إننا في طور انتقال عفيف القلب ، شديد القسوة المقرونة بالرحمة ، طور يحب الحرية ويموزه النظام ، طور ذي ديانات وحروب عاطفية ولكن ينبغي علينا أن نتوقع منه أن يصل بنا إلى نسق من الحياة يكون ذا استقرار داخلي أشد وأمتن

— ٣ —

أما السيكولوجيا فشغولة الآن بكشف أن استجابة الانسان للادراكات الحسية ليست ترايدية ، أي كشف أن التأثير الحادث من مجموعة أصوات أو ألوان يتوقف على كيفية ترتيبها في الفضاء والزمن (نظرية جستالت Gestalt) فمثلاً التأثير الحادث في شخص عند سماعه نغم النشيد الوطني يعزف على غير ترتيبه الصحيح يكون عديم المفعول ، ولا تكون له أدنى علاقة باستجابة الشخص عندما يسمع النشيد يعزف في اجتماع ما أو في أحد الملاهي فيذكره بالقومية والعزة الوطنية وبالخرب . وحتى اليوم لم يثر على طريقة عامية تبين لنا متى يصح أن تعالج طائفة من العناصر باعتبار أنها « كل » في أغراض السيكولوجيا . والمتوقع أن يكون النجاح عظيماً في هذا الصدد إن معظم الآراء العلمية مؤسسه على طريقة التحليل الفضائي ، أي إختزال الشيء إلى أصغر عناصره الفضائية كلما أمكن ذلك الإختزال . والفيزياء والبيولوجيا والسيكولوجيا يعوزها ثلاثتها الاستعداد لوصف ما يحفل الذرة أو البكائن الحي أو النموذج يعمل كوحدة ، وينقصها كذلك أن تبين لنا كيف يتسنى لنا أن نعرف هل مجموعة ما تؤلف وحدة أم لا . إن الطريقة التحليلية قد بلغت منتهى رقيها . أما طريقة التركيب فلم تبلغ شيئاً ، بل إننا لانجد فيها حتى الأساس اللازم للمعالجة التركيبية وقد أدى هذا ببعض العنيد من العلماء الماديين أن يجزموا بأنه لا يوجد شيء اسمه « تركيب » وبأن هذا رأي صوفي من بقايا الوثنية الأولى التي كانت تصور الاله بشراً . على أن مسألة التركيب هذه واضحة يفهمها أي عقل غير مغرض رائده البحث عن الحقيقة على الرغم من عدم صوغ قانون صحيح لذلك

وهنا نستطيع الفيزيكا الحديثة أن تغير لنا الطريق ولو قليلاً . فالتحليل هو الطريقة التي نلزم عند التفتيش عن بناء فضاءي عارض ، وأما الطريقة التركيبية التي نحتاج إليها فيجب أن نتناول تاريخ المجموعات وسلوكها الموقوتين ، وأما كون الانسان يرد على التأثيرات كما في حالة سماعه بعض الأغاني فدليل على وجود شيء في تاريخه ، وهو سماعه هذه الأغاني غير مرة في حالات انفعالية خاصة . على أن وحدة أي تركيب ، أو أي كلاً ، أو أي كائن حي ليست أمراً عارضاً يمكن توضيحه بدلالة البناء والانشاء ، لأننا نستطيع أن نبتين هذه الوحدة من مجرد المشاهدة المتواصلة خلال فترة زمنية ما . وتستطيع الفيزيكا أن تبكر قانوناً يصف اقتراب ذرتي إيدروجين لكي تكونا معاً جزئياً ، وهي بذلك تعتبر الانتين وحدة ، وفي هذا ما يشير إلى أن حقيقة الوحدة العضوية يمكن أن يوضع لها تعريف وأن يمر عنها بدلالة قانون غير قابل للانقلاب فنضم له المجموعة كلها ، وعلى ذلك فطائفة الذرات أو الخلايا أو أي العناصر الأخرى تسمى وحدة حيناً (و فقط حيناً) يعثر على قانون واحد غير قابل للانقلاب يفسر مسلك العناصر المختلفة بأنه تعاوّن للوصول إلى نهاية واحدة مشتركة كتكوين الجزيء في حالة ذرتي الايدروجين

بعد هذا نستطيع أن نحدد عملياً مستقبل السيكلوجيا التي هي في أشد الحاجة إلى قاعدة أدبية تشرف عليها عندما تعالج شخصية الانسان المفككة ، وعلى مقتضى مثال الذرتين يصبح اعتبار الانسان وحدة حيناً بيدي مسلكه الكلي تضامناً متواصلاً بين أعضائه قصد الوصول إلى نهاية ما . ولكن يوجد فرق مهم بين الحالتين : فالذرتان تسيران صوب نهاية معلومة لدينا لأنها وقعت غير مرة في التاريخ ، على حين أن تكشف الانسان ابتكارياً ، بمعنى أنه يسير صوب نهاية لا يمكن معرفتها أو استنتاجها أو التنبؤ بها قبل أن تظهر هي فعلاً في الوجود . وعلى ذلك فلا خير على الأب أو على السيكلوجي إذا لم يستطع الأول أن يفهم الغرض الذي يرمي إليه ولده ، ولم يستطع الثاني أن يدرك ما سينتهي إليه موضوعه . وما دام يوجد في تأدية الوظيفة شيء من التوافق والتناسق فإن « النهاية » يمكن تركها للطبيعة تبحث عنها . لأن مثل هذا التناسق معناه أن الكائن الحي يتجه صوب حالة قصوى نهائية

فعلى علماء السيكلوجيا في المستقبل من ثم أن يكون قصدهم الصحيح استبقاء وتحديد التضامن المترن بين جميع الوظائف في جسم الانسان ، وألاً يعيروا المثل السامية القصوى الذهنية أو الروحية كل اهتمامهم . وبالطبع إذا كان الشخص الجاري فحصه يعيل ظاهره إلى حالة انحطاط يعرفها الفاحص لأنها ليست أمراً جديداً بل تكررأ لما حدث لكثيرين من قبل ، فإن هذا الميل يمكن أن يوقف ويغير ، وهو على الأقل يمكن تغييره إذا استطاع الفاحص أن

يكشف بصيرته الملهمة الفطاء عن علامات الصراع المكظوم الذي يدل على أن هذا الميل المباشر ليس كلاً قائماً بذاته ، بل أساسه زهد شديد وكبت للشهوات وكظم لأعق أنواع التوقان . فإذا ما أرضيت هذه الرغبات المكظومة فقد يمكن أن يوقف هذا الميل إلى الانحطاط . ولكن هذه الرقابة التي يصبح بسطها على حياة الغير يمكن فقط أن تمارس ممارسة منتجة عن طريق أن الميول الظاهرة ليست كلاً في ذاتها

إن يكون التنبؤ بالظيب أبداً أمراً علمياً ، بل ربما كان تدبر العواقب في حدود العلم أخطر صيغ الوثب الذهني . فالعلم لا بد أن يكون باناً صادقاً ، وكل حدس مبهم غامض منافٍ للعلم بل هو عدوه . ولكن التنبؤ يستطیع اليوم أن يلتفت الأنظار إلى ما يلصق بالفكر العلمي الحاضر من تحديات لا يبررها مبرر ، وأن يدعو الباحثين في المادة والحياة إلى أن يتعاونوا معاً لكي ينسكفوا القانون الطبيعي الوحيد الذي يسيطر على كل من المادة والحياة . وستكون جائزة ذلك عظمة بلا شك

أما عدم الاكتراث بإبادة الحياة ، وهو ما امتازت به السنوات الأخيرة فلا يصح أن يثير دهشة أو بيعت بأساً في زمن فشا فيه خليط من العقائد الصالحة والطارحة ، واقرن ذلك بمسلم معنوي يجريدي يبحث في المادة . ولا يستطيع أن يقود الانسانية إلى حياة أرفق وأرقى بعدئذ إلا شيء واحد هو معرفة الحياة وقدرها قدرها . وهذا الشيء لا ينهض به إلا العلم والفن ، لأن هذين معاً يكشفان لنا الحياة في جميع صيغها الخطيرة العظيمة . غير أن جذور الفن الضاربة في الأعماق قد أتلها طغيان العلم الذي لم يكن قد تبين خطر الحياة وأهميتها وقد خضعت لسلطان قانون طبيعي . وذلك لأن الفن لا يمكن أن ينهض إلا من احترام الحياة أبلغ احترام ، تلك الحياة التي بدت لآراء الحالة العلمية في هذه الفترة كأنها حركة غير مقيدة تصارع قوانين المادة صراعاً مستمراً

والفيزياء تدرس الضوء الآن . فالضوء بتأثيره الاشعاعي ينشئ الحياة ، ويكون في داخل الجسم نسج الشعور . ونحن كائنات حية نعي وتدرك ، ولكن وعينا وادراكنا هذين غير ناضجين لأننا لم نصل بعد إلى معرفة القوانين التي تخضع لها حياتنا . ويخضع لها تفكيرنا . ومع ذلك فقد صار محققاً أن الضوء والحياة والشعور مرتبطة كلها معاً بقانون ما لم يستكشف بعد . ومن الغريب أن سر كيمياء الطبيعة مخبوء في داخل جسيمونا وبكشف هذا البسر الفاضل ستوجد الفيزياء للإنسان مجالاً جديداً لآمال وأمانٍ جديدة



— ١ —

جدول الثوابت الفيزيائية

التي تتجنب كثرة الأرقام كتبت الأعداد على صورة قوى ١٠ فتلاً ١٢١٠ منها واحد صحيح متبوع من جهة اليمين بأصفار عددها ١٢ (أي بليون) ١٠-١٢ منها واحد صحيح مقسوم على ١٢١٠ أي جزء من بليون

- كتلة الإلكترون (وهو في حالة سكون) $= ٩.١٠٨ \times ١٠^{-٢٨}$ جم .
- كتلة البروتون أو ذرة الهيدروجين $= ١.٦٦ \times ١٠^{-٢٤}$ جم .
- عدد الذرات الموجودة في قطعة grain من الحديد $= ٨٧ \times ١٠^{٢٢}$
- قطر ذرة الهيدروجين $= ١.٠٧ \times ١٠^{-٨}$ سم .
- الشحنة الكهربائية التي تساوي بروتوناً أو إلكترونات $= ١.٥٥ \times ١٠^{-١٩}$ كولوم .
- سرعة الضوء في الثانية $= ٣ \times ١٠^{١٠}$ سم .
- أو ١٨٦٠٠٠ ميل

— ٢ —

جدول العناصر

وبه تفصيلات البناء الذري

| الترتيب | الاسم | البروتونات | الإلكترونات الخارجية |
|---------|-----------------------|------------|----------------------|
| ١ | إيدروجين Hydrogen | ١ | ١ |
| ٢ | هيليوم Helium | ٤ | ٢ |
| ٣ | ليثيوم Lithium | ٦ أو ٧ | ١٤٢ |
| ٤ | بريليوم Beryllium | ٩ | ٢٤٢ |
| ٥ | بورون Boron | ١٠ أو ١١ | ٣٤٢ |
| ٦ | كربون Carbon | ١٢ | ٤٤٢ |
| ٧ | نيتروجين Nitrogen | ١٤ | ٥٤٢ |
| ٨ | أكسجين Oxygen | ١٦ | ٦٤٢ |
| ٩ | فلور Fluorine | ١٩ | ٧٤٢ |
| ١٠ | نيون Neon | ٢٠ أو ٢٢ | ٨٤٢ |
| ١١ | صوديوم Sodium | ٢٣ | ١٤٨٤٢ |
| ١٢ | مغنسيوم Magnesium | ٢٤، ٢٥، ٢٦ | ٢٤٨٤٢ |
| ١٣ | ألومنيوم Aluminium | ٢٧ | ٣٤٨٤٢ |
| ١٤ | سليكون Silicon | ٢٨، ٢٩، ٣٠ | ٤٤٨٤٢ |
| ١٥ | فسفور Phosphorus | ٣١ | ٥٤٨٤٢ |
| ١٦ | كبريت Sulphur | ٣٢، ٣٣، ٣٤ | ٦٤٨٤٢ |
| ١٧ | كلور Chlorine | ٣٥، ٣٧ | ٧٤٨٤٢ |
| ١٨ | أرجون Argon | ٣٦، ٤٠ | ٨٤٨٤٢ |

| الترتيب | الاسم | البروتونات | الالكترونات الخارجية |
|---------|---------------------|-------------|----------------------|
| ١٩ | بوتاسيوم Potassium | ٤١,٣٩ | ١٤ ٨ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٠ | كلسيوم Calcium | ٢٤,٤٠ | ٢ ٤ ٨ ٤ ٨ ٢ |
| ٢١ | سكنديوم Scandium | ٤٥ | ٢ ٤ ٩ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٢ | تيتانيوم Titanium | ٤٨ | ٢ ٤ ١٠ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٣ | واناديوم Vanadium | ٥١ | ٢ ٤ ١١ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٤ | كرونيم Chromium | ٥٢ | ١ ٤ ١٣ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٥ | منجنيز Manganese | ٥٥ | ٢ ٤ ١٣ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٦ | حديد Iron | ٥٦,٥٤ | ٢ ٤ ١٤ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٧ | كوبلت Cobalt | ٥٩ | ٢ ٤ ١٥ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٨ | نيكل Nickel | ٦٠,٥٨ | ٢ ٤ ١٦ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٢٩ | نحاس Copper | ٦٥,٦٣ | ١ ٤ ١٨ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٣٠ | خارصين Zinc | ٧٠,٦٨,٦٦,٦٤ | ٢ D |
| ٣١ | جاليوم Gallium | ٧١,٦٩ | ٣ D |
| ٣٢ | جرمانيوم Germanium | ٧٤,٧٢,٧٠ | ٤ D |
| ٣٣ | زرنيخ Arsenic | ٧٥ | ٥ D |
| ٣٤ | سيلينيوم Selenium | ٨٢ — ٧٤ | ٦ D |
| ٣٥ | بروم Bromine | ٨١,٧٩ | ٧ D |
| ٣٦ | كريبتون Krypton | ٨٦ — ٧٨ | ٨ D |
| ٣٧ | روبيديوم Rubidium | ٨٧,٨٥ | ١ ٤ ٨ ٤ ١٨ ٤ ٨ ٤ ٢ |
| ٣٨ | سترونتيوم Strontium | ٨٨,٨٦ | ٢ ٤ ٨ D |
| ٣٩ | إيتريوم Yttrium | ٨٩ | ٢ ٤ ٩ D |
| ٤٠ | زركونيوم Zirconium | ٩٤,٩٢,٩٠ | ٢ ٤ ١٠ D |
| ٤١ | نيوبيوم Niobium | (?) ٩٣ | ١ ٤ ١٢ D |
| ٤٢ | مولبدنيم Molybdenum | ٩٦ | ١ ٤ ١٣ D |
| ٤٣ | ماسوريوم Masurium | (?) | ١ ٤ ١٤ D |
| ٤٤ | روثينيوم Ruthenium | (?) ١٠٢ | ١ ٤ ١٥ D |
| ٤٥ | روديوم Rhodium | (?) ١٠٣ | ١ ٤ ١٦ D |
| ٤٦ | بالاديوم Palladium | (?) ١٠٧ | ١ ٨ D |

| الترتيب | الاسم | البروتونات | الالكترونات الخارجية |
|---------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| ٤٧ | فضة Silver | ١٠٩ ١٠٧ | ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ |
| ٤٨ | كاديوم Cadmium | ١١٠ — ١١٦ | ٢ » |
| ٤٩ | انديوم Indium | ١١٥ | ٣ » |
| ٥٠ | قصدير Tin | ١١٦ — ١٢٤ | ٤ » |
| ٥١ | انتيمون Antimony | ١٢١ ١٢٣ | ٥ » |
| ٥٢ | تيلوريوم Tellurium | ١٢٦ ١٢٨ ١٣٠ | ٦ » |
| ٥٣ | يود Iodine | ١٢٧ | ٧ » |
| ٥٤ | زينون Xenon | ١٢٨ — ١٣٦ | ٨ » |
| ٥٥ | سيزيوم Caesium | ١٣٣ | ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ |
| ٥٦ | باريوم Barium | ١٣٨ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ |
| ٥٧ | لانثانوم Lanthanum | ١٣٩ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ |
| ٥٨ | سيريوم Cerium | ١٤٠ ١٤٢ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ |
| ٥٩ | براسودينيوم Praseodymium | ١٤١ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ |
| ٦٠ | نيودينيوم Neodymium | ١٤٢ ١٤٤ ١٤٦ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ |
| ٦١ | النيوم Ilinium | ? | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٢ | سماريوم Samarium | ١٥٠ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٣ | يوربيوم Europium | ١٥٢ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٤ | جادولينيوم Gadolinium | ١٥٧ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٥ | تربيوم Terbium | ١٥٩ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٦ | ديسبروزيوم Dysprosium | ١٦٢ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٧ | هولميوم Holmium | ١٦٣ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٨ | إربيوم Erbium | ١٦٤ إلى ١٧٦ | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٦٩ | ثولوم Thulium | ١٦٨ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٧٠ | يتربيوم Ytterbium | ١٧٣ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |
| ٧١ | لوتيسيوم Lutecium | ١٧٥ (?) | ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ |

| الترتيب | الاسم | البروتونات | الالكترونات الخارجية |
|---------|--------------------------------|------------|----------------------|
| ٧٢ | هافنيوم Hafnium | ١٧٨ | ٢٤١٠٤٣٢٤١٨٤٨٤٢ |
| ٧٣ | تنتالوم Tantalum | (?) ١٨١ | ٢٤١١ » |
| ٧٤ | تولجستن Tungsten | ١٨٤ | ٢٤١٢ » |
| ٧٥ | رينيوم Rhenium | ? | ٢٤١٣ » |
| ٧٦ | أوزميوم Osmium | (?) ١٩١ | ٢٤١٤ » |
| ٧٧ | إيريديوم Iridium | (?) ١٩٣ | ٢٤١٥ » |
| ٧٨ | بلاتين Platinum | (?) ١٩٥ | ٢٤١٦ » |
| ٧٩ | ذهب Gold | (?) ١٩٧ | ٢٤١٧ » |
| ٨٠ | زئبق Mercury | ٢٠٤ — ١٩٨ | ٢٤١٨ » |
| ٨١ | ثاليوم Thallium | ٢٠٤ | ٣٤١٨٤٣٢٤١٨٤٨٤٢ |
| ٨٢ | رصاص Lead | (?) ٢٠٧ | ٤ » |
| ٨٣ | بزموت Bismuth | ٢٠٩ | ٥ » |
| ٨٤ | بولونيوم Polonium | ٢١٠ | ٦ » |
| ٨٥ | لم يستكشف بعد | | ٧ » |
| ٨٦ | رادون Radon | ٢٢٢ | ٨ » |
| ٨٧ | لم يستكشف بعد | | ١٤٨٤١٨٤٣٢٤١٨٤٨٤٢ |
| ٨٨ | راديوم Radium | ٢٢٦ | ٢٤ ٨ » |
| ٨٩ | اكتينيوم Actinium | ٢٢٧ | ٢٤ ٩ » |
| ٩٠ | ثوريوم Thorium | (?) ٢٣٢ | ٢٤١٠ » |
| ٩١ | بروتواكتينيوم Protoactinium | ٢٣٠ | ٢٤١١ » |
| ٩٢ | أورانيوم Uranium | ٢٣٨ | ٢٤١٢ » |

— ٣ —

جداول النظام

للملاحة انقلد الالماني

(النظائر الأكثر وجوداً في المنصر ذكر وزنه النري أولاً فالذي يليه في الكتلة ثانياً وهكذا)

| الترتيب | الاسم | عدد النظائر | الأوزان الذرية للنظائر |
|---------|----------|----------------|---------------------------------------|
| ٣ | ليثيوم | ٢ | ٦ — ٧ |
| ٥ | بورون | ٢ | ١٠ — ١١ |
| ١٠ | نيون | ٣ | ٢٠ — ٢٢ — ٢١ |
| ١٢ | مغنسيوم | ٣ | ٢٤ — ٢٥ — ٢٦ |
| ١٤ | سليكون | ٣ | ٢٨ — ٢٩ — ٣٠ |
| ١٦ | كبريت | ٣ | ٣٢ — ٣٤ — ٣٣ |
| ١٧ | كلور | ٢ | ٣٥ — ٣٧ |
| ١٨ | أرجون | ٢ | ٤٠ — ٣٦ |
| ١٩ | بوتاسيوم | ٢ | ٣٩ — ٤١ |
| ٢٠ | كلسيوم | ٢ | ٤٠ — ٤٤ |
| ٢٦ | حديد | ٢ | ٥٤ — ٥٦ |
| ٢٨ | نيكل | ٢ | ٥٨ — ٦٠ |
| ٢٩ | نحاس | ٢ | ٦٣ — ٦٥ |
| ٣٠ | خارصين | ٦ | ٦٤ — ٦٦ — ٦٨ — ٦٧ — ٦٥ — ٧٠ |
| ٣١ | جاليوم | ٢ | ٦٩ — ٧١ |
| ٣٢ | جرمانيوم | ٨ | ٧٤ — ٧٢ — ٧٠ — ٧٣ — ٧٥ — ٧٦ — ٧١ — ٧٧ |
| ٣٤ | سلينيوم | ٦ | ٨٠ — ٧٨ — ٧٦ — ٨٢ — ٧٧ — ٧٤ |
| ٣٥ | بروم | ٢ | ٧٥ — ٨١ |
| ٣٦ | كروميوم | ٦ | ٨٤ — ٨٦ — ٨٢ — ٨٣ — ٨٠ — ٧٨ |
| ٣٧ | روبيديوم | ٢ | ٨٥ — ٨٧ |

| الترتيب | الاسم | عدد النظار | الأوزان الدرية للنظار |
|---------|----------|---------------|---|
| ٣٨ | سترونيوم | ٢ | ٨٨ — ٨٦ |
| ٤٠ | زركونيوم | ٣ | ٩٠ — ٩٢ — ٩٤ |
| ٤٧ | فضة | ٢ | ١٠٧ — ١٠٩ |
| ٤٨ | كاديوم | ٦ | ١١٤ — ١١٢ — ١١٠ — ١١٣ — ١١١ — ١١٦ |
| ٥٠ | قصدير | ١١ | ١٢٠ — ١١٨ — ١١٦ — ١٢١ — ١١٩ — ١١٧ — ١٢٢ — ١٢١ — ١١٢ — ١١٤ — ١١٥ |
| ٥١ | أنتيمون | ٢ | ١٢١ — ١٢٣ |
| ٥٢ | تلوريوم | ٣ | ١٢٨ — ١٣٠ — ١٢٦ |
| ٥٤ | زنيون | ٩ | ١٢٩ — ١٣٢ — ١٣١ — ١٣٤ — ١٣٦ — ١٢٨ — ١٣٠ — ١٢٦ — ١٢٤ |
| ٥٨ | سريوم | ٢ | ١٤٠ — ١٤٢ |
| ٦٠ | نيودنيوم | ٣ | ١٤٢ — ١٤٤ — ١٤٦ |
| ٨٠ | زئبق | ٧ | ٢٠٢ — ٢٠٠ — ١٩٩ — ١٩٨ — ٢٠٩ — ٢٠٤ — ١٩٩ |
| ٨٧ | رصاص | ٣ | ٢٠٨ — ٢٠٦ — ٢٠٧ |

— ٤ —

جدول النظائر

للاملاحة ما كس بورن الالماني

النظائر الأكثر وجوداً في العنصر ذكرت أوزانها الذرية أولاً فالذي يليها في الكثرة ثانياً وهكذا وقد وضعت النظائر المشعة بين أقواس . أما النظائر المشعة المستجدة صناعياً فلم تذكر في هذا الجدول

| الترتيب | الاسم | عدد النظائر | الأوزان الذرية للنظائر |
|---------|----------|----------------|------------------------|
| ١ | ايدروجين | ٣ | ١ ٣٤٢٤ |
| ٢ | هليوم | ٢ | ٤ ٣٤ |
| ٣ | ليثيوم | ٢ | ٧ ٦٤ |
| ٤ | بريليوم | ١ | ٩ |
| ٥ | بورون | ٢ | ١٠ ٤١١ |
| ٦ | كربون | ٢ | ١٢ ١٣ ١٢ |
| ٧ | نيتروجين | ٢ | ١٤ ١٥ |
| ٨ | اكسجين | ٣ | ١٦ ١٨ ١٧ |
| ٩ | فلور | ١ | ١٩ |
| ١٠ | نيون | ٣ | ٢٠ ٢٢ ٢١ |
| ١١ | صوديوم | ١ | ٢٣ |
| ١٢ | مغنسيوم | ٣ | ٢٤ ٢٥ ٢٦ |
| ١٣ | ألومنيوم | ١ | ٢٧ |
| ١٤ | سليكون | ٣ | ٢٨ ٢٩ ٣٠ |
| ١٥ | فسفور | ١ | ٣١ |
| ١٦ | كبريت | ٣ | ٣٢ ٣٤ ٣٣ |
| ١٧ | كلور | ٢ | ٣٥ ٣٧ |
| ١٨ | ارجون | ٣ | ٤٠ ٣٦ ٣٨ |

| الترتيب | الاسم | عدد النفاثر | الاوزان الذرية للنفاثر |
|---------|-----------|----------------|-----------------------------|
| ١٩ | بوتاسيوم | ٢ | ٤١٤٣٩ |
| ٢٠ | كلسيوم | ٤ | ٤٣٤٤٢٤٤٤٤٠ |
| ٢١ | سكندريوم | ١ | ٤٥ |
| ٢٢ | تيتانيوم | ٥ | ٤٩٤٤٧٤٤٦٤٥٠٤٤٨ |
| ٢٣ | واناديوم | ١ | ٥١ |
| ٢٤ | كروميوم | ٤ | ٥٤٤٥٠٤٥٣٤٥٢ |
| ٢٥ | منجنيز | ١ | ٥٥ |
| ٢٦ | حديد | ٣ | ٥٧٤٥٤٤٥٦ |
| ٢٧ | كوبلت | ١ | ٥٩ |
| ٢٨ | نيكل | ٦ | ٥٦٤٦١٤٦٢٤٦٠٤٥٨ (٢)٦٤٤ (٢) |
| ٢٩ | نحاس | ٢ | ٦٥٤٦٣ |
| ٣٠ | خارصين | ٥ | ٧٠٤٦٧٤٦٨٤٦٦٤٦٤ |
| ٣١ | جاليوم | ٢ | ٧١٤٦٩ |
| ٣٢ | جرمانيوم | ٥ | ٧٦٤٧٣٤٧٠٤٧٢٤٧٤ |
| ٣٣ | زرنيخ | ١ | ٧٥ |
| ٣٤ | سليسيوم | ٦ | ٧٤٤٧٧٤٨٢٤٧٦٤٧٨٤٨٠ |
| ٣٥ | بروم | ٢ | ٨١٤٧٩ |
| ٣٦ | كربون | ٦ | ٧٨٤٨٠٤٨٣٤٨٢٤٨٦٤٨٤ |
| ٣٧ | روبيديوم | ٢ | ٨٥ (٨٧) |
| ٣٨ | سترونتيوم | ٣ | ٨٧٤٨٦٤٨٨ |
| ٣٩ | إتريوم | ١ | ٨٩ |
| ٤٠ | زركونيوم | ٥ | ٩١٤٩٦٤٩٢٤٩٤٤٩٠ |
| ٤١ | نيوبيوم | ١ | ٩٣ |
| ٤٢ | مولبدنيم | ٧ | ٩٧٤١٠٠٤٩٤٩٢٤٩٥٤٩٦٤٩٨ |
| ٤٣ | ماسوريوم | صفر | |
| ٤٤ | روثينيوم | ٧ | ١٠٢ ١٠١ ١٠٠ ٩٩ ٩٨ ٩٦ ٩٥ (٢) |

| الأوزان الفدية للنظائر | عدد النظائر | الاسم | الترتيب |
|---|----------------|------------|---------|
| ١٠٢٠ | ١ | دوديوم | ٤٥ |
| | صفر | بالاديوم | ٤٦ |
| ١٠٩١٠٧ | ٢ | نضة | ٤٧ |
| ١١٥٤١٠٨٤١٠٦٤١١٦٤١١٤١١٣٤١١٠٤١١٢٤١١٤ | ٩ | كديميوم | ٤٨ |
| ١١٣٤١١٥ | ٢ | إنديوم | ٤٩ |
| ١١٥٤١١٤٤١١٢٤١٢١٤١٢٢٤١٢٣٤١١٧٤١١٩٤١١٦٤١١٨٤١٢٠ | ١١ | قصدير | ٥٠ |
| ١٢٣٤١٢١ | ٢ | أنتيمون | ٥١ |
| (٢)٤١٢٧٤١٢٣٤١٢٢٤١٢٤٤١٢٥٤١٢٦٤١٢٨٤١٣٠ | ٨ | تاليوم | ٥٢ |
| ١٢٧ | ١ | يود | ٥٣ |
| ١٢٦٤١٢٤٤١٢٨٤١٣٠٤١٣٦٤١٣٤٤١٣١٤١٣٢٤١٢٩ | ٩ | زئبق | ٥٤ |
| ١٣٣ | ١ | سيزيوم | ٥٥ |
| ١٣٧٤١٣٦٤١٣٥٤١٣٨ | ٤ | باريوم | ٥٦ |
| ١٣٩ | ١ | لاتانوم | ٥٧ |
| ١٤٢٤١٤٠ | ٢ | سيريوم | ٥٨ |
| ١٤١ | ١ | براسوديوم | ٥٩ |
| ١٤٣٤١٤٥٤١٤٢٤١٤٤٤١٤٦ | ٥ | نيوديميوم | ٦٠ |
| | صفر | إربيوم | ٦١ |
| ١٥٤٤١٥٢٤١٥٠٤١٤٩٤١٤٨٤١٤٧٤١٤٤ | ٧ | سماريوم | ٦٢ |
| ١٥٣٤١٥١ | ٢ | يورانيوم | ٦٣ |
| ١٦٠٤١٥٨٤١٥٧٤١٥٦٤١٥٥ | ٥ | جادولينيوم | ٦٤ |
| ١٥٩ | ١ | تريوم | ٦٥ |
| ١٦٤٤١٦٣٤١٦٢٤١٦١ | ٤ | دسبيريوم | ٦٦ |
| ١٦٥ | ١ | هولميوم | ٦٧ |
| ١٧٠٤١٦٨٤١٦٧٤١٦٦ | ٤ | إربيوم | ٦٨ |
| ١٦٩ | ١ | تولميوم | ٦٩ |
| ١٧٦٤١٧٤٤١٧٣٤١٧٢٤١٧١ | ٥ | إثريوم | ٧٠ |

| الترتيب | الاسم | عدد النظائر | الأوزان الذرية للنظائر |
|---------|---------------|-------------|---|
| ٧١ | لوتسيوم | ١ | ١٧٥ |
| ٧٢ | هافنيوم | ٥ | ١٧٩، ١٧٧، ١٨٠، ١٧٨، ١٧٦ |
| ٧٣ | نتاليوم | ١ | ١٨١ |
| ٧٤ | توتنجستن | ٤ | ١٨٣، ١٨٢، ١٨٦، ١٨٤ |
| ٧٥ | رينيوم | ٢ | ١٨٥، ١٨٧ |
| ٧٦ | أوزميوم | ٦ | ١٨٧، ١٨٦، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٢ |
| ٧٧ | إيريديوم | صفر | |
| ٧٨ | بلاتين | صفر | |
| ٧٩ | ذهب | صفر | |
| ٨٠ | زئبق | ٧ | ١٩٦، ٢٠٤، ١٩٨، ٢٠١، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٢ |
| ٨١ | تاليوم | ٥ | (٢١٠)، (٢٠٨)، (٢٠٧)، (٢٠٣)، (٢٠٥) |
| ٨٢ | رصاص | ١٢ | ٢٠٨، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٥، (٢٠٥)، (٢٠٠)، (٢٠٩)، (٢١٠)، (٢١١)، (٢١٢)، (٢١٤) |
| ٨٣ | بزموت | ٥ | (٢١٠)، (٢١١)، (٢١٢)، (٢١٤)، (٢١٥) |
| ٨٤ | بولونيوم | ٧ | (٢١٠)، (٢١١)، (٢١٢)، (٢١٤)، (٢١٥)، (٢١٦)، (٢١٨) |
| ٨٥ | لم يستكشف بعد | | |
| ٨٦ | رادون | ٣ | (٢٢٢)، (٢١٩)، (٢٢٠) |
| ٨٧ | لم يستكشف بعد | | |
| ٨٨ | راديوم | ٤ | (٢٢٦)، (٢٢٣)، (٢٢٤)، (٢٢٨) |
| ٨٩ | أكتينيوم | ٢ | (٢٢٧)، (٢٢٨) |
| ٩٠ | ثوريوم | ٥ | (٢٣٢)، (٢٣٧)، (٢٢٨)، (٢٣٠)، (٢٣٤) |
| ٩١ | بروتواكتينيوم | ٢ | (٢٣١)، (٢٣٤) |
| ٩٢ | أورانيوم | ٢ | (٢٣٨)، (٢٣٤) |

من لفظة الى هذا الجدول يتضح ان العناصر الكيميائية كلها تكاد تكون خليطاً من النظائر وهذا هو السبب في أن كثيراً من الأوزان الذرية ليس أعداداً صحيحة . وقد بذلت بطبيعة الحال

جهوده للحصول على النظائر نقية في حالة افراد، وقد أمكن فملاً الحصول على هذه النظائر في كثير من الحالات . فمثلاً نظير الليثيوم الذين وزناهما 6Li و 7Li يمكن فصلهما بانحراف أيوناتهما الموجبة انحرافاً كهربائيسياً . وفي حالة الزئبق حدث الاتصال لأن النظير الأثقل وزناً أبطل انحرافاً من الأخف . وكثير من الغازات يمكن فصل نظائرها بطريقة هرز أي تمريرها خلال مسام أسطوانات خزفية ، فالذرة الأخف وزناً تسبق الأثقل في المروق من المسام وإذا ما تكررت العملية مرات كافية كان انفصال النظائر تاماً في الغالب .

وهذا مهم بالطبع لأننا إذا أردنا فحص النواة فحصاً دقيقاً وجب علينا أن نتأكد من أن لدينا نوعاً معيناً منها تجري تجاربنا عليه . ولكن نواتي نظيري البورون اللتين وزناهما 10B و 11B كما هو مذكور في الجدول تختلفان الواحدة عن الأخرى كما تختلفان عن نواتي النضر التالي وهو الكربون . ووزن نواتي الكربون 12C و 13C . أما أنهما تحاطان بأسراب متطابقة من الإلكترونات بسبب تساوي شحنتيهما فيعتبر من ثم التمييز بينهما فأمراً قليل الأهمية من حيث النواة . وتكون الطاق الإلكترونية بمثابة قنص تخفي مظهر النواة الحقيقي .

وبالعكس توجد قنص تؤكد الخلاف . فمثلاً للكور نظير وزنه 39K أي قدر وزن النظير الأساسي للبتاسيوم . فأمثال هذه النويات تسمى نويات أيسوبارية isobaric أي متساوية الوزن فهي تشمل على نفس عدد البروتونات ولكنها تختلف في عدد الإلكترونات . ويوجد في هذا الجدول عدد من أمثال هذه الحالات

قيل

يتضمن أحدث الكشوف الفيزيائية

هذه الكشوف خمسة : أولها تحطيم الذرة باطلاق أشعة البروتون عليها لا أشعة ألفا ، وقام بذلك كوككرت Cockerft والثاني ، وثانيها كشف النيوترون neutron وقد قام به شادوك Shadwick ، وثالثها كشف البوزترون positron ، وقد قام به بلاكت Blackett وأوكياليني Occhialini . وقد ظهرت هذه الكشوف إثر تجارب أجريت في معمل كافنديش بكمبردج ، ونشرت في مجلة نايتشر Nature وقد أحدث ظهورها رجة في عالم العلوم . ورابعها كشف الديوترون deuteron وقد قام به اوري Erey وبركويد Birkwedde ومورفي Murphy . وخامسها كشف الميزوترون Mesotron وقام به الدكتور كارل اندرسون Dr. Carl Anderson والدكتور سيث ندرماير Dr. Seth Neddermeyer

— ١ —

فأما كشف كوككرت وزميله والتن فيرجع الفضل فيه إلى تأثير الاشعاع الصناعي . وكان رذرفورد قد سمي لتحطيم الذرة باطلاق جسيمات ألفا عليها . ويمكن تلخيص نتائج رذرفورد في المعادلة الآتية : —

نواة الذرة + جسيم ألفا = نواة ذرة أخرى + بروتون
وامتازت تجارب رذرفورد بأمرين (١) أن النقذوقات المحطمة للنواة كانت جسيمات ألفا ، (٢) وأن ما كان يفتل من النواة المحطمة هو البروتون . وهناك فرق أساسي بين هذا التحطيم الصناعي للنواة وبين تحطيمها الطبيعي عن طريق انحلالها الاشعاعي كما يحدث في العناصر المشعة من أمثال الراديوم . ففي أولها تحصل على بروتونات فقط ، وفي ثانيها تحصل على جسيمات ألفا فقط . وإذن فتجارب كوككرت وزميله والتن يمكن أن تعتبر مكملة لتجارب رذرفورد أو وجهاً ثانياً لها . وأما ما أسفرت عنه هذه التجارب فهو « أن الذرة التي تحطمها أشعة البروتون تطرد نواة هليوم » . فهذه التجارب إذن تحول المعادلة السابقة إلى المعادلة الآتية :

نواة الذرة + بروتون = نواة ذرة أخرى + جسيم ألفا

وبالموازنة بين هاتين المادتين نرى أن عجزنا عن فهمهما قد تبادلا . فلفصل هذه التجارب إذن تفصيلاً أوفى

إن الليثيوم كما نعلم هو العنصر الثالث في الخفة . ووزنه الذري المتوسط 7.016 ، وأنه خليط من نظيرين وزناهما الذريان 6 و 7 ، ولننظر الأكبر وزناً ذرياً يرجح الفضل في الظاهرة التي سنأتي على وصفها . ولا غرابة في ذلك فهذا النظير ، كما هو مذکور في جدول النظائر ، هو الأكثر وجوداً في العنصر . ويجب ألا ننسى أن الليثيوم أحد العناصر الخفيفة القليلة التي يمكنها أن تتألف من جسيمات ألفا إذا أطلقت عليها . وتحطم الليثيوم بإطلاق قذائف من الهليوم عليه لا يمكن أن يسفر عن انبعاث أي بروتون ، فكان طاقة المقذوفات المكونة من جسيمات ألفا صغيرة لا نستطيع أن نحطم نواة الليثيوم . ولكن إذا قذف الليثيوم بقذائف أخف وطاقة أقل (والقذائف البروتونية أقل طاقة في الحقيقة) فقد يكون ذلك أثر جديد غير متوقع

ويمكن الحصول على هذه القذائف البروتونية في المعمل بتجربة بسيطة فقد فيها ذرة الايدروجين إلكتروناتها عن طريق الاصطدامات الالكترونية ، فلا يبقى منها إلا البروتون الذي يمرض بمدثر لفل مجال كهربائي يزيد سرعته . ومن ثم يمكن الحصول على قذائف تكون أقوى طاقة كلما كان المجال الكهربائي أقوى . ففي التجارب التي نحن بصدها كانت طاقة هذه المقذوفات (بقطع النظر عن المجال الكهربائي الشديد الذي يزيد السرعة) صغيرة إذا هي ووزنت بالطاقة التي خصصت بها الطبيعة أشعة ألفا . ولما أطلقت هذه القذائف البروتونية على الليثيوم وجد أن كل طلفة صائبة قد أحدثت تلفاً بالذرة ، لأن الإصابة سببت انطلاق جسيمين من جسيمات ألفا من نواة الليثيوم حاملين معها قدراً عظيماً من الطاقة . فكيف نفسر إذن هذا التحويل الكيميائي ؟ نحن نعلم أن للعنصر الثالث في الترتيب الذري وهو الليثيوم نظيراً وزنه الذري 7 ، وإذن يمكن أن نستنتج أن نظير الليثيوم هذا نواة لها هذا التركيب :—

نواة الليثيوم = جسيم ألفا + ٣ بروتونات + إلكترونين

والواقع أن الترتيب الذري أو الرقم الذري هو $2 + 3 = 5$ وأن الوزن الذري هو $4 + 3 = 7$ فإذا حطم الليثيوم بطلقات من البروتونات فإن الطلق المحكم يصيب النواة ويستقر فيها ، فتتكون نواة جديدة . فما هو تركيب هذه النواة الجديدة إذن ؟ هو نفس التركيب السابق مضافاً إليه بروتون أي :—

جسيم ألفا + ٤ بروتونات + إلكترونين

وبن ٤ بروتونات تكون مما جسيم ألفا . ويمكن التعبير عن النتيجة النهائية هكذا :—

نواة الليثيوم + بروتون = جسيم ألفا

واليك إذن تفسير تجارب كوككرت ووللان العظيمة : يمكن الحصول على ذرتي هليوم من ذرة ليثيوم ونواة إيدروجين ١

وأمر الطاقة هنا في هذه الظاهرة يحلب العقل . ذلك أن الجسيم ألفا الحاديس سرعة عظيمة جداً . فالذي يتوقعه الباحث أن تكون طاقة حركة القذبة البروتونية مساوية لطاقة اثنين من القذائب الهليومية الهاربة . ولكنه يصطدم هنا بنتيجة مذهلة : هي أن الطاقة الناتجة من هذا الاصطدام أكبر كثيراً من الطاقة الأصلية المسببة للاضطراب . وإذا لم يمكن الحصول على قذائب هليومية طاقتها أكبر مائة مرة من طاقة القذبة البروتونية التي سببت الاضطراب . ولقد أدى تحطيم نواة الألومنيوم بإطلاق جسيمات ألفا إلى القول بأن طاقة البروتون الهارب أكبر من طاقة القذبة المحطمة . ولكن زيادة الطاقة هذه كانت صغيرة نسبياً . أما هنا فلدينا عملية يخرج لنا طاقة عاثلة من خوف المادة . وما كانت قذبة البروتون إلا الحلقة المفتوحة التي نحتاج إليها في بناء نواة الهليوم . ونحن نعلم مما مضى بنا أن تكون نواة الهليوم يصعبه نقص في الكتلة ، فنقص من ثم في انبعاث الطاقة المجموعة . ولقد شاهدنا في هذه التجارب ذلك الخلق أو ذلك التكون . إن جزءاً صغيراً من كتلة نواة الليثيوم قد استحالت طاقة حركة في ذرتي الهليوم . فهذا النقص في الكتلة يضمن استقرار المجموعة المتكونة ، وعلى ذلك فإن استحالة المجموعة الجديدة ليثيوماً من جديد تستلزم طاقة أكبر كثيراً من تلك التي تحتوي عليها القذائب البروتونية . ومن ثم تكون الطاقة المعادلة لهذا النقص في الكتلة كبيرة . فما أغنى هذا الكشف العلمي العظيم ! وهل بعد ذلك نحتاج إلى فحم وبترول ومشالات ومساقط مائة لاحداث الطاقة ؟ ترى هل عرفنا على ما سوف يحقق الحصول على تلك الثروة العظيمة من الطاقة الكامنة في قطعة من الحديد أو الليثيوم أو أية مادة أخرى ؟ إنما لا نعلم مدى ما سيصل بنا العلم إليه ، واسكننا في الوقت الحاضر ما زلنا عاجزين كثيراً عن الوصول إلى استخدام وسائل فنية للسيطرة على مخازن الطاقة الهائلة الموجودة في المادة والتحكم فيها . وإذا كانت فرص إصابة النواة قليلة جداً واحدة في كل مائة مليون كما يقول العالم انفيلد Infield فإن استخدام الطاقة هذا لم يعد البحث النظري المحض . ويجدر بنا أن نذكر أن تجارب مشابهة هذه قد أجريت على عناصر أخرى غير الليثيوم ، وقد لوحظ في حالات كثيرة انبعاث أشعة ألفا بتأثير إطلاق القذائب البروتونية

وأما الكشف المهم الثاني فقد حدث سنة ١٩٣٢ وهو كشف النيوترون . لقد خرج وذر فورود من تجاربه بصدد تحطيم النواة بأشعة ألفا بأن البريليوم ، كالهليوم والليثيوم ، من تلك العناصر

التي عندما تحطم نويها ينوي المليون لا يثبت منه أي بروتون . ولكن سلسلة التعارب التي أجريت على هذا المنهج قد أدت إلى ظاهرة جديدة غريبة . ذلك أن البريليوم إذا أطلقت عليه قذائف ألفا المرمية الخارجة من مادة مشعة فإنه هو نفسه يصير مصدر إشعاع جديد خفي تكتفه الأسرار . ولنسمة الآن الإشعاع البريليومي، لأننا لاستطيع تسميته بأي أسماء الإشعاع المعروفة . فما هو بهمة بروتونات ولا بهمة جسيمات ألفا أو بيتا ، ثم هو لا يمكن أن يكون إشعاع المادة السادي . وذلك لقوة ففاده العظيمة إذ لا توقفه الألواح الفلزية إذا اعترضت سبيله ، وما هو أيضاً بإشعاع كهربي في قصير الموجة من طراز أشعة جاما . وكان العالم شادوك هو الذي يبحث في هذه الأشعة البريليومية في معمل رذرفورد فكان أول من جهر بأنها نوع جديد من الأشعة وسماها الأشعة النيوترونية نسبة إلى جسيم جديد هو النيوترون . وهذا قول جديد لم يسبقه به أحد ، وكشف علمي لم يبلغ من العمر وسمن في أواخر سنة ١٩٤٠ ثمانية أعوام . ومع ذلك فقد ثبت أنه رأي حصيف مثير يحلو بناء النواة الذرية بضوء جديد

فما هو ذلك النيوترون ؟ في ذرة الابدروجين بدور إلكترون حول بروتون . وأبعاد هذه المجموعة الشمسية الصغيرة جداً من رتبة جزء من مائة مليون جزء من السنتيمتر . تصوّر إلكتروناتاً بدور في فلك قطره أصغر من قطر ذرة بوهر عشرات ألوف المرات . فنحن لدينا إذن مجموعة كوكبية متعادلة كهربائياً أبعادها من الرتبة التي نسبناها للنواة . فهذا هو نموذج النيوترون إن علة البروتون بالإلكترون أقوى وأشد من ذلك مئات ألوف المرات ، وإذن فنمزع النيوترون أو شطر الإلكترون بعيداً عن البروتون يستلزم جهداً أكبر كثيراً من تمزق ذرة الابدروجين . إن كتلة النيوترون تساوي بالتقريب كتلة البروتون ، بل هي في الحقيقة أقل قليلاً منها لأن النيوترون مجموعة اتزنت واستقرت حيث أن جزءاً من كتلته (كما هو الحال في المليون) يثبت إشعاعاً خلال عملية خلقه أو تكوينه . ففي ضوء هذا أصبح واضحاً كيف أن المادة تكون شفافة بالنسبة للنيوترون ، وكيف أن همرات النيوترونات يمكن أن تنفذ خلال الألواح الفلزية السمكة . لقد كان الرأي أن المادة تتألف من إلكترونات وبروتونات تفصلها عن بعضها مسافات واسعة . فالنيوترون — وهو أصغر من المسافة الموجودة بين النواة والكواكب الالكترونية عشرات ألوف المرات — لا يجد من ثم عقية ما ، ولذا كان الفلز السميك كبير المسامية ، إذا صح التعبير ، بالنسبة للإشعاع النيوتروني . وعدا هذا فإن المجالات الكهربائية لا تنوي وللالكترونات لا يمكن أن تحدث انحرافاً في مسار النيوترون لأنه من الوجهة الكهربائية متعادلاً

وإذن فلنلخص التحولات الكيميائية التي تصحب انبعاث النيوترون ، ولنأخذ البريليوم الذي

ورقه الذري ٤ ووزنه الذري ٩، فنعين نستطيع التوفيق بين هذين العددين إذا فرضنا أن:—

نواة البريليوم = جسيمين من ألفا + بروتون + إلكترون

والواقع أن $٩ = ١ + ٢ \times ٤$ و $٤ = ١ - ١ + ٢ \times ٤$

ويقول شادوك عدا ذلك أن هذا الإلكترون وهذا البروتون مقيان هما في نواة البريليوم متحدين فيها على صورة نيوترون. وإذن يمكن وضع المعادلة السابقة هكذا:—

نواة البريليوم = جسيمن ألفا + نيوترون

فلنعظم بعدئذ نواة البريليوم بجسيمات ألفا. وهنا سنصوره كما سبق، أن القذيفة ستستقر في النواة، فينطلق من النواة نيوترون، وتصير المعادلة هكذا:—

نواة البريليوم + جسيم ألفا = ٣ جسيمات ألفا + نيوترون هارب

والكربون هو العنصر الذي يخوي على ٣ جسيمات ألفا — فهو العنصر الذي وزنه الذري ١٢ ورقه الذري ٦. فإذا كان تصورنا هذا صحيحاً فالبريليوم إذا أطلقت عليه جسيمات ألفا يخرج أشعة نيوترونية وذرات كربون.

وعلى ذلك فالراجح كثيراً أن يكون النيوترون داخلياً بالفعل في تكوين النواة. وقد تكون الإلكترونات النواة دائماً أبداً متحدة مع بروتونها على صورة نيوترونات. ولا يتغير العنصر بإضافة نيوترون إلى نواته، لأن هذه الإضافة لا تغير من شخصتها، ولكن الوزن الذري للعنصر يتغير. وإذن نصل إلى النتيجة الآتية: « إن العناصر التي تختلف ذراتها فقط في عدد ما بها من النيوترونات تكون نظائر. »

وهذا الاشعاع البريليومي الحادث على صورة نيوترون قد شوهد أيضاً في عناصر أخرى. وستؤدي هذه وغيرها من المسائل المتصلة بتكوين النواة في المستقبل القريب إلى تجارب جديدة وإلى نظريات جديدة، لأنه لما عرض الأورانيوم إلى قذائف نيوترونية ظهر نظير جديد للأورانيوم أدى بدوره إلى ظهور عنصر جديد مشع هو الثالث والتسمون في جدول العناصر

— ٣ —

وهنا ننقل إلى الكشف العظيم الثالث، ونقصده به كشف البوزترون الذي وصل إليه

بلاك و أو كالبيني في سنة ١٩٣٣

لقد مر بنا أن الإلكترون والبروتون هما المكونان فعلاً للمادة، وأن شخصتهما متساويتان في المقدار ومختلفتان في الإشارة، وأن كتلة البروتون قدر كتلة الإلكترون ١٨٥٠ مرة تقريباً. ولكن الكشف العلمية الحديثة قد دلت على أن الأمر أعوص من أن يفسر بهذا التفسير البسيط

فأولاً صارت لدينا نيوتونات كشف ظهورها عن مكونات جديدة للنواة لم تكن معلومة من قبل، وأن كتلتها تعدل كتلة البروتونات تقريباً، ولكنها لا تحمل شحنة كهربائية ما، وأنها تدخل فعلاً في تركيب النواة، ولكنها إذا أضيفت أو طرحت منها فلها لا تؤثر في شحنة النواة ولا يمكن أن تغير العنصر لأنها متعادلة في ذاتها وكل ما هنالك أنها تحول إلى نظير جديد ولكن قد ظهرت ثانياً لبنة جديدة أولية داخلية في تركيب المادة ألا وهي البوزترون .

إن الفاترة البطارية التي تجري فوق الفضبان الحديدية تترك وراءها ما يدل على مرورها إذ أنها تترك مسجلاً من البقاع والفبار. كذلك يترك الإلكترون أو البروتون وراءه علامات تدل على مروره حينما يترافق سائراً فيما يسمى مخدع أو حجرة ولسن القائمة، وقد مر بنا ذكرها في الباب الرابع الخاص بالراديوم، وصّرّ بنا أن الفيزيكا التجريبية استطاعت بها أن تصور (١) آثار مرور الإلكترونات والبروتونات، وأن تفحص كيف تتغير هذه المسارات إذا وقعت تحت تأثير مجالات كهربائية خارجية، وكيف يستطيع الفاحص من مدى هذه التأثيرات أن يستنتج ما شاء بخصوص سرعات هذه الجسيمات الأولية وكتلتها

نحن نعلم أن المواد المشعة مصدر تنبعث منه الإلكترونات (أشعة بيتا) ونوى الهليوم (أشعة ألفا) . فإذا وضع جهاز ولسن هذا بجوار مادة مشعة ظهر بوضوح مسار هذه الجسيمات : ويختلف مسار الإلكترون عن مسار جسيم ألفا ، وتقريب المادة المشعة ضروري لكي تتمكن من « رؤية » مسار هذه الإلكترونات أو البروتونات . والجهاز في الحقيقة يمكن وضعه في أي مكان لأن هذه المسارات توجد دائماً أبداً في كل مكان، ولكن عددها يزيد زيادة فاحشة إذا وضع في جوار المواد المشعة

فما هو مصدر الطاقة التي تحدث هذه المسارات؟ إنه الإشعاع الكوني وهو إشعاع يروى — كما مرّ بنا — كل مكان ويخترق كل زاوية وشق في الأرض، ويحدث اصطدامه العرضي بالذرة ظواهر آثارها هي تلك التي نشاهدها في جهاز ولسن

ولقد أدى هذا بأندرسون Anderson بأبيركا وبلاك ووايكاليني بكيردج إلى استكشاف قد يؤدي إلى تغيير جوهرى في آرائنا بخصوص الكون المادي . وما استكشفه هؤلاء هو أن بعض هذه المسارات لا يمكن أن تكون مسارات إلكترونات أو بروتونات أو جسيمات ألفا، فهي تسلك في المجال المغناطيسى كما لو كان لها فعلاً شحنة أولية موجبة وكتلة أقل كثيراً من كتلة البروتون . وبعبارة أخرى تسلك مسلك « شحنات أولية موجبة كتلة الواحدة منها تعدل

(١) يقول العلامة آرثر فندلاي في كتابه « الكون المنشور » أنه يمكن استخراجه هذه الحجرة في تصوير الروح، حيث أمكن تصوير أرواح الحيوانات وهي تنسل من أجسادها عند موتها

كتلة الالكترون». فهذه الجسيمات الجديدة التي كانت حتى ذلك اليوم مجهولة من المبادئ الأولية المكونة للمادة ولنسما «إلكترونات موجبة أو بوزترونات». ويقول العلامة إقليد الألماني الذي تنقل عنه هذا بأن استكشاف هذه الجسيمات لم يكن غير متوقع لأن البحث النظري قد أنبأ بوجودها

— ٤ —

وأما الكشف الرابع فهو كشف الديوترون deuteron وقد أدى إليه التقيب عن نظائر العناصر. ذلك أن نظيراً جديداً للأيديروجين قد استكشفه أوري وبركويدي ومورفي. ونحن إذا ألقينا نظرة على جدول النظائر رأينا أن النسب بين أوزان نظائر العنصر الواحد ضئيلة إلا في حالة الأيديروجين فإن النسبة بين وزني نظيريه مرتفعة. خذ مثلاً الليثيوم نجد كتلتي نظيريه 6.9 و 7 أما هذا النظير الأيديروجيني الجديد، أو الأيديروجين الثقيل، فوزنه ضعف وزن الأيديروجين العادي — وإن تكن ذرات الاثنين من الوجهة الكيميائية واحدة. ولقد سميت هذه الذرات الأيديروجينية الثقيلة ديوترونات (جمع ديوترون) وسمي الأيديروجين الثقيل ديوتريوم deuterium. ويحتوي غاز الأيديروجين العادي على جزء من ثلاثين ألف جزء من الديوتريوم. ويمكن عادة أن يمحصر أي مركب كيميائي يحتوي على أيديروجين عادي من الأيديروجين الثقيل — ومن أمثلة المركبات المحتوية على أيديروجين ثقيل الماء الثقيل والبرزين الثقيل. وزيد وزن جزيء الماء الثقيل عن وزن جزيء الماء العادي بمقدار 11% منه، ودلت كثافة الماء الثقيل المقيسة على أنها في الواقع 1.07 و 1.08 جم لا جراماً واحداً. وتختلف خواصه الطبيعية عن خواص الماء العادي اختلافاً عظيماً فدرجة تجمده 3.8° م ودرجة غليانه 101.4° م. وأما ما شاع في الصحف عند استكشافه من أنه سم قاتل فذاك فأمر ينافي الحقيقة، لأن الذين شغلوا بإجراء تجارب عليه قد تذوقوه وابتلعوه وقالوا إنه في مذاقه شبيه بالماء وإنه عديم الخطر بناتاً

وأهم ما في الديوترونات من الوجهة الفيزيائية أنها استخدمت كقذائف ذرية لاجداث تحولات عنصرية. والواقع أن العمل في هذا الصدد كان خصب النتائج. وجرت العادة أن يطلق على أمثال هذه التحولات «تحولات صناعية» للتمييز بينها وبين التحولات التلقائية في حالة العناصر المشعة. وابتعت هذه الطريقة الجديدة في استحداث التحولات فكان نصيبها النجاح في كبريدج. وفي أميركا بمدرسة الفيزياء في بركلي Berkley بكاليفورنيا تحت إشراف الاستاذ لورنس E. O. Lawrence. وتستخدم في هذا العدد ضغوط كهربائية مرتفعة جداً، وكلما

ارتفع الضغط زاد إنتاج التحول ، فقد بلغ مثلاً في حالة الصوديوم المحطم بالديوترونات أن زاد الإنتاج حتى بلغ سبعين ضعفاً حينما زاد الضغط الكهربائي من مليون فولط إلى مليونين . وكان لورنس هذا قد ابتكر جهازاً خاصاً لاستحداث بروتونات بطاقة تبلغ مليوني فولط ، فلبس استعملت الديوترونات كقذائف في هذا المدفع الكهربائي أمكن الحصول على نتائج هامة سواء في أميركا أو في كبرج

ولما حطم لورنس الصوديوم باستخدامه الديوترونات في جهازه هذا أمكنه الحصول على نظير صوديومي شعاع صناعي ، وقد حصل عليه بمقادير عظيمة . ووجد من تجاربه أن عمر هذا النظير المشع ١٥ ساعة ، على حين أن عمر الراديوم ألفا سنة . وقد وجد أيضاً أن نشاطه الاشعاعي يكاد يبدل نشاط الراديوم ، وأن لهذا الصوديوم الراديومي من الوجهة الطبية فائدة عظيمة ؛ ذلك أنه من الوجهة الكيماوية غير مؤذٍ لأنه يمكن إدخاله في الجسم فلا يختلف مسلكه فيه من الناحية الكيماوية عن ملح الطعام العادي ، ثم إن المادة التي يستحيل إلها وهي المغنسيوم ليست مؤذية أيضاً . وعدا هذا فإن نشاطه الاشعاعي يتناقص بسرعة فلا يكون له إلا أثر طفيف جداً بعد مضي بضعة أيام . وانتظر أن يستطيع لورنس في القريب العاجل استحداثه بمقادير تكفي لأجراء تجارب تستجلي خواصه البيولوجية

— ٥ —

إزاء ما عثر عليه الفيزيقيون من الجسيمات الداخلة في تكوين الذرة لا يسع الباحث إلا أن يدهش إذا هم عثروا على جسيم جديد . ترى هل يمضي العلماء العالميون في تصيد هذه الجسيمات وجمعها كما يتصيد الحشرات أنواعاً جديدة من البق مثلاً ، أو هل هذه الجسيمات هي التي تدفع بنفسها إلى الظهور ؟ لقد صرنا كيف أنهم عثروا على الالكترتون فالبروتون فالنيوترون فالنيوترون ، وقيل إنهم عثروا على جسيمين آخرين هما أصغر الجسيمات كلها حجماً وهما النيوتريون neutrino والنيوترون neutretto وظنَّ البحَّاث أن كرات البليارد الذري هذه قد اكتملت أنواعها ، ولكن ظهر جسيم جديد هو الميزوترون mesotron

وتعددت الآراء بصدد مصدر وجود هذا الجسيم في الطبيعة ، ولكن انتهى البحَّاث إلى أن مصدره الأشعة الكونية التي تعمُرنا باستمرارها باطة إلينا من رحاب الفضاء ، وقد عرفها العلماء منذ سنين ، ولكنهم لم يقفوا على بعض كنهها إلا حينما أنجها صوب حجرة ولسن القائمة لحبرها وبلو حقيقةها

وتتألف هذه الحجرة ، كما هو ظاهر من شكلها أمام صفحة ٣٦ ، من أسطوانة زجاجية

يفطها لوح من الزجاج . ويوجد بداخلها قليل من سائل كالماء أو الكحول . يتبخر باستمرار فيملا البخار فراغها باستمرار . وبأسفلها مكبس إذا سبب فجأة إلى الخارج بوسيلة آلية خاصة تمدد هذا البخار ثم تكاثف . فإذا ما ضبط التمدد بحيث منع حدوث التكاثف فإن أي إلكترونات أو أي جسيمات أخرى مشحونة تمر هذه الحجرة تترك وراءها مسارات ضعيفة لبخار متكاثف في مواضع سريانها ، وبصوير هذه المسارات تصويراً فوتوغرافياً يمكن معرفة الكثير عن طبيعة هذه الجسيمات ، كما مرّ بنا في آخر الفصل الرابع من القسم الأول من هذا الكتاب . فمثلاً يمكن إيجاد سرعتها إذا وضعت الحجرة بين قطبي مغناطيس كهربائي كبير . ويؤثر المجال المغناطيسي في الجسيمات المشحونة المتحركة فيجعلها تنحرف في اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي وعلى مسارها الأصلي . ومن ثمّ ينحني هذا المسار المغناطيسي مكوناً قوساً في دائرة . ويكون نصف قطر الدائرة مناسباً لكمية تحريك الجسيم . ولما كانت كمية التحرك تقدّر بحاصل ضرب الكتلة في السرعة فإن هذه السرعة يمكن تقديرها إذا عرفت الكتلة

وأعدّ الجربون في هذا الصدد أجهزتهم هذه متلصين فقط العنور عرضاً على مسارات الأشعة الكونية . وسرنا ما أثمر البحث في هذا الصدد ، فحينما وضعوا في داخل الحجرة حاجزاً من الرصاص أظهرت الصور الفوتوغرافية الكثيرة المأخوذة ظواهر غريبة . دخل جسم شعاع كوني الحجرة من عل وسار قدماً نحو لوحة الرصاص أو ذلك الحاجز الرصاصي ، ثم خرج من الجانب الآخر وخرجت معه همرة جسيمات أخرى غير فكتاً قد حدث انقجار وإلى هنا والنتيجة معقولة سليمة . فهناك من الأسباب القوية ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه المسارات التي شوهدت قد استحدثتها الإلكترونات . ودلت دراسة همرات الجسيمات على أن الجسيمات التي تحدثها همرات تستطيع هي نفسها أن تحدث همرات أيضاً ، ودلّ النقص الحادث في طاقتها من جراء اختراقها الحواجز الرصاصية على أنها كلها كانت إلكترونات . ولكن كثيرين من المشتغلين في تجارب الأشعة الكونية شاهدوا جسيمات أخرى ، وعلى الرغم من أن مساراتها بدت كأنها مسارات إلكترونية إلا أنها خالفت الإلكترونات في المسلك . ولكي نفهم كيف حيرت العاملين هذه الجسيمات وجب علينا أن نفهم كيف تفقد الجسيمات المشحونة طاقتها عند اختراقها المادة

فلنأخذ أولاً جسيماً قبيلاً كالبروتون . فلما كانت المسافة بين الذرات في لوحة الرصاص قدر ستمك البروتون مائة ألف مرة فإن هذا لا يمكن أن يفقد طاقته بالاحتكاك أثناء مروره خلال اللوحة كما تفقد الرصاصة المطلقة طاقتها وهي تحترق قطعة من الخشب . ومعروف أن معظم النقص في الطاقة التي يفقدها بروتون يرجع إلى القوى الكهربائية التي يؤثر هوبها في الإلكترونات

الموجودة في المادة التي يمر خلالها . ويحتاج الأمر إلى ثلاثين قوطاً تقريباً من الطاقة لكي نزع إلكترونًا من جزيء الهواء . وعدد هذه الجزيئات الهوائية المجدوعة ، أو الأيونات ، يمكن إيجاده . وقد وجد أن البروتون الذي طاقته مليون فولط يتحدث كثيراً من هذه الأيونات حتى أنه ليفقد كل طاقته تقريباً فيما يقل عن نصف بوصة من الهواء . أما في الرصاص فهذا البروتون يكاد لا يحترق البتة . ففقدان الطاقة بالتأين من خصائص الجسيمات الثقيلة التي لا تتحرك بسرعات كبيرة جداً . ولو أن العملية ممقّدة جداً إلا أنه وجد أن نقص الطاقة يكون أكبر كلما كان سير الجسيم أبطأ . ويقدم لنا قياس معدل النقص في الطاقة فكرة تقريبية عن سرعة الجسيم

وعرف كذلك نوع جديد غريب من هذا النقص الحادث في الطاقة يخالف المعروف منه فالجسيمات التي تتألف من الإلكترونات في خفة الوزن والتي تنطلق بسرعات عالية تفقد طاقتها إذا هي اجتازت موجات كهرومغناطيسية عند ما تسير خلال المادة . وذلك هو عين ما يحدث عند ما تصدم الإلكترونات الهدف في أنبوبة أشعة إكس ، وهو ما يسمى عملية فقدان الطاقة بالإشعاع مما مضى نستطيع أن نفهم أن دراسة الطريقة التي بها يفقد جسيم مشحون طاقته تقدم لنا ما يجعلنا نفهم شيئاً عن حقيقته هو نفسه . والواقع أن البحوث حاولوا إيجاد أقيسة لهذا النقص في الطاقة ولكنهم لا قوا عنه في هذا الصدد

فطاقات جسيمات الشعاع الكوني تبلغ بلايين الفولطاط ، وأمثال هذه الجسيمات تتحرك بسرعة عظيمة فلا يمكن لغير أشد المغناطيسات وأكبرها أن يثني مساراتها بالقدر الذي يخضعها للقياس . ومع ذلك فقد أمكن بالعمل الدقيق الحصول بالتدريج على المعلومات اللازمة المؤدية إلى التعجّاج . ولما تراكت الأقيسة على بطائها أصبح الشك يقيناً . وفقدت هذه المسارات — التي حدثت من همرات أو أحدثت هي نفسها همرات — طاقة على نفس النمط المتوقع من الإلكترونات ، فكانت دون شك إلكترونات . ومن جهة أخرى فإن تلك المسارات التي حدثت دون همرات كانت من نوع مخالف لأنها أظهرت قوة نفاذ أكبر من أي جسيمات أخرى مشحونة معروفة الآن . ولفقت النظر واحدة من تلك التجارب التي أجريت لظهور قوة النفاذ هذه ، لأن الجسيمات فيها دفعت إلى المرور خلال ما يزيد عن سبع عشرة بوصة من الرصاص . وهذه هي التي أجراها ستريت Street وودوارد Woodward وستيفنسون Stevenson في جامعة هارفارد

وفي سنة ١٩٣٧ قدم الدكتور كارل أندرسون والدكتور ست ندرمار الاستاذين في معهد الصناعات والفنون بكاليفورنيا رسالة نشرتها المجلة الفيزيقية The Physical Review واشتملت

هذه الرسالة على عرض طلي لفقدان طاقة جسيمات الشماع الكوني، وجاء فيها كيف أن الجسيمات التي لا تحيى مجتمعة في همرات تفقد من الطاقة أقل كثيراً مما تفقده همرة الجسيمات. وقد فرض الدكتور أن الجسيمات المجهولة هذه أثقل من الالكترونات وأخف من البروتونات. واذن فالجسيمات المملومة كمية تحركها تسير أسرع من البروتونات ولا تفقد طاقة كثيرة بعملية التأين. ثم لأنها من جهة أخرى لا تسير بسرعة الالكترونات ولا تفقد كثيراً من طاقتها بالاشعاع. وهذا قد يفسر ضالة نقصها في الطاقة وعظم قدرتها النفاذة

ولكي يحققوا صدق نظريتهما كان من الضروري أن يعينا كتلة هذه الجسيمات. وكانت العقبة أن كمية الحركة هي التي يمكن قياسها من انحراف الجسيمات بمغناطيس، وأن الكتلة لا يمكن أن تعرف إلا إذا عرفت السرعة. ومضى الجربون يحاولون قياس سرعات هذه الجسيمات المجهولة بالطريقة الآتية : —

إن الجسم المشحون الذي يخترق الحجرة الغائمة يترك وراءه مساراً بسبب الأيونات التي يحدتها في طريقه. وبعدد بخار الحجرة إلى التكاثف على هذه الأيونات، وبأحداث التمدد الملائم يلتقط كل أيون نظيرة من البخار المتكاثف. فإذا أمكن إعاقه هذا التمدد جزءاً من ثانية بعد مرور الجسم وجدت الأيونات وقتاً متزاح فيه متباعدة، فيمكن بميكروسكوب إيجاد عدد التقصات. وإذا أمكن إيجاد عدد الأيونات الموجودة في كل سنتيمتر من المسار أمكن تعيين معدل النقص في الطاقة، وهذا يقربنا كثيراً من معرفة سرعة الجسم. وإجراء أمثال هذه الأقيسة من الصعوبة بمكان فلا بد من مواناة الظروف وما كل صورة يخرجها المصور بنافعة. ومع ذلك فقد سار العمل حتى إذا كانت سنة ١٩٣٧ حصل كل من ستريت وستيفنسون، ثم بعدها بقليل أندرسون وندرمير، على الصور التي كانوا يطلعون إليها، وعرفوا حلقة الاتصال الأخيرة في سلسلة البيانات التي امتدت أجلاها سنين عديدة. ودلت الأقيسة المأخوذة لكتلة الجسيمات من هذه الصور على أن كتلة الجسم الجديد تعدل كتلة الالكترون العادي خمسين مرة. وقدمت اقتراحات عديدة بخصوص تسمية هذا الجسم الجديد، ولكن اسم الميزوترون الذي اقترحه الدكتور أندرسون هو الذي حاز القبول

وما كاد العالمون يمضون في البحث عن المكان الذي يضعون فيه هذا الجسم الجديد حتى عثروا خلال بحثهم على رسالة مذكورة في «محاضر جمعية اليابان الفيزيائية الرياضية». ففي هذه الرسالة التي ظهرت قبل كشف الميزوترون بسنتين تقريباً يعلن العالم الفيزيقي الياباني يوكاوا Yukawa عن نظرية يفسر بها قوة التجاذب بين النيوترون والبروتون. وترجمي هذه النظرية إلى أن تلك القوة المجهولة التي تجمع شتات الذرة يمكن تفسيرها إذا نحن فرضنا أن هناك جسماً

جديداً تعدل شحنته شحنة الالكترون وتكون كتلته أكبر من كتلة الالكترون . فإذا كان جسمهم يوكاوا هذا هو الميزوترون كما يعتقد الآن كثيرون من الفاعلين فلا يكون هناك ثمة تناقض تجريبي قد أزيل فحسب بل يكون قد سُدَّ أيضاً بكشف الميزوترون فراغ في البحث النظري ولا حاجة بنا إلى القول بأن ظهور الميزوترون قد أثار مجال البحث في الشعاع الكوني ودفع به إلى نشاط جديد . فالجربون يبدون تجاربهم للحصول على أقيسة صحيحة من مسارات الشعاع الكوني ، مستعملين أجهزة أكبر من السابق استخدامها سواء كانت مغناطيسات أو حجرات واسن . والمتنظر الحصول من وراء هذه الأجهزة الجديدة على معلومات أدق ولندم الآن إلى السؤال الذي افتتحنا به الكلام عن الميزوترون . هل صيد هذه الجسيمات نوع من جمع الحشرات أو هل العالم الفيزيقي سيمش على هذه الجسيمات وهو يشرب الحساء عند بدء تناوله الطعام ؟ أولى بنا أن نعود إلى أقدم عضو في أسرة هذه الجسيمات ونعني به الالكترون فنقول إن هذا الجسيم هو حلقة الاتصال في تقدم الفيزياء النظرية منذ سنة ١٨٧٥ إلى الآن . ونستطيع القول ونحن مطمئنون إنه بدون معرفتنا الالكترون ما كنا حصلنا على أشعة إكس ولا على الراديو ولا على التلفون للمسافات الطويلة . ومن بدري فلعل يوماً يجيء قريباً فلا يكون الميزوترون فيه أقل شأنًا من زميله الالكترون

وإذن يوجد في عالمنا المادي : —

شحنات أولية سالبة هي الالكترونات

شحنات أولية سالبة أكبر من هذه في الكتلة ٥٠٠ مرة هي الميزوترونات

شحنات أولية موجبة تعدل الالكترونات في الكتلة هي البوزترونات

شحنات أولية موجبة أكبر من هذه في الكتلة ١٨٥٠ مرة هي البروتونات

شحنات أولية موجبة ضعف البروتونات في الكتلة هي الديوترونات (أو الدبلونات diplons)

جسيمات أولية من المادة لاشحنة فيها وكتلتها أكثر قليلاً من البروتونات وهي النيوترونات

جسيمات تعدل كتلتها كتلة أربعة بروتونات وتعدل شحنتها شحنة بروتونين وهذه هي

جسيمات ألفا

وهذا عدا الفوتونات التي هي وحدات الضوء أو طاقة الاشعاع

ولإخال إتنا قد وصلنا الى آخر سياحتنا في أعماق المادة ، وعرفنا أننا في كون قلبي غير

مستقر . لقد بحثنا عن دنيا مستقرة فلم نجد هذه الدنيا وكلما أمعنا في التعمق بدا لنا الكون

أكثر اضطراباً وأشد تعمية وانهماماً . لقد قيل إن أرخيدس لما استكشف قانون الروافع أسرع

إلى ملكه يخبره في زهو بكشفه هذا قال « أعطني أيها الملك مكاناً أقص فيه خارج هذه الأرض أفلقها لك » ولكن لا يوجد في الكون مكان ثابت مستقر فالكون كله ماضٍ في رحله الوحشي بهز وبنفض . ولم يكن قول أرخميدس هذا باطلاً لهذا السبب وحده فلان تحريك العالم وتقليل الأرض معناه أنك تخالف القوانين الكونية — وهذه حاسمة ثابتة لا تتغير إن اهتمام العالم العلمي ، كأيما المبتدئين أو إلهام الفنان ، ليس إلا وصفاً لتطلع بني الانسان إلى شيء ما ثابت ، شيء مستقر في الدوام العالمية — هو تطلع إلى الله ، إلى الجلال ، إلى الحق والحقيقة

الحقيقة هي كل ما يتطلع إليه الرجل العلمي . إنه لا يجد في هذا الكون شيئاً مستقراً ، ولا شيئاً باقياً . ليس كل شيء يصح أن يعرف به أن يتنبأ به . ولكن عقل الانسان يستطيع إدراك جزء على الأقل من هذه الحقيقة . وبين سريان هذه الظواهر ومروقتها يقب قطب القانون السرمد الذي لا يتغير

ولكن مع كل هذا ألا يمكن تبسيط هذه الصورة التي رسمناها للعالم المادي بعض التبسيط ؟ ألا يمكن أن نقول إن البروتون ما هو إلا مجموع نيوترون وپوزترون ؟ وهل لا يمكن أن يكون جسم ألفا مجموع نيوترونين وپروتونين ؟ وهل لا توجد أيضاً شحنات أولية سالبة تعادل كتلة الواحدة منها كتلة البروتون ؟ وهل لا توجد جسيمات أولية لا شحنة فيها وكتلتها تعادل كتلة الاكترون أو أقل قليلاً ؟ لقد قالوا إنهم عثروا على هذا الجسم وسموه نيوترينو neutrino بل على ما هو أصغر منه وسموه نيوتريوترو neutretto ، ولعلمهم طازون على غيرها حتى يتم التماثل بين هذه الجسيمات الذرية . وهذه بعض المسائل الجديدة التي بدت في أفق البحث العلمي . وقد بدأ العلماء يواجهونها في كثير من المنايا ، وقد يصلون منها إلى جديد

قد يربكنا المرتاب بتذكيره إيانا بما سبق أن قلناه عن الالكترونات والپروتونات من أنهما لبنات هذا الكون المادي ، مع أن العلماء قد عثروا على غيرها . وقد يسألنا هل ما ذكر في هذا الكتاب مبنيًا على افتراض أنه لا مادة أولية غير الالكترونات والپروتونات صحيح أم غير صحيح ؟ وخير ما نعمله إزاء هذا السؤال الأخرق أن نشيح عنه معرضين قائلين له « أعد قراءة هذا الكتاب أعد قراءة هذا الكتاب »



صورة خطاب وزارة المعارف الى المؤلف بصدد هذا الكتاب
وكان قد قدمه اليها للفحص في شهر مايو سنة ١٩٣٥ واستفسر عنه في يناير سنة ١٩٣٧

وزارة المعارف العمومية
ادارة المحازن

بشأن كتاب الفيزيكا الحديثة
رقم ١٥١٩ في ٢٧ / ٧ / ١٩٣٧


حضرة المحترم أحمد فهمي أبو الخير اقنذي المدرس بالدرسة السنية

اشارة الى خطاب حضرتكم المؤرخ ٢٩ يناير سنة ١٩٣٧ بشأن كتابكم « الفيزيكا الحديثة »
نفيدكم أن الوزارة فحصت هذا الكتاب ورأت أن المعلومات الواردة به قد تناسب إدراك طلبة
الجامعة المصرية الذين يدرسون مواد متصل بعلم الطبيعة ، ولذا نعيده ل حضرتكم مع هذا للتقدم به
الى الجامعة فاذا طبعته على نفقتها أو قمتم أنتم بطبعه أمكن الوزارة شراء نسخ منه لمكتبات
المدارس — دون أن يفيد ذلك ارتباط الوزارة مع حضرتكم بشيء ما
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل المعارف


محمد المشاوي

(امضاء)



التفريغ الكهربائي في أنبوبة مخلخلة (أعلى الصفحة) سير الأشعة الكاثودية في خطوط مستقيمة . (الأيمن وسط الصفحة) . التأثير الديناميكي لأشعة الكاثود (الأيسر وسط الصفحة) . التأثير الحراري (الأيمن أسفل الصفحة) . تأثر أشعة الكاثود بالمجال المغناطيسي (الأوسط أسفل الصفحة) (الأيسر أسفل الصفحة)

انظر صفحة (٥)






الانوية اليسرى هي الانوية الغازية وفيها نحي.
الالكترونات من قايأ الغاز الموجود فيها
أما الوسطى فهي أنوية كوليغ (collide) ونحي.
الالكترونات فيها من سالك متوهج كما هو الحال في
العمام "الاسلكي" — وأما اليمى فهي الانوية الذرية
وتتبقى الالكترونات فيها كما تتبقى من سالك ساخن
والزجاج الداخلى للزورل

[انظر صفحة ٤٠]




منظار الشرد

ويرى فيه ابرة (١) سبق
أن عكس طرفها في ملح راديوي تم
وضعت بين حائلين ثوريين (ح) وتعدا
(ع) اذا استقبلت تماماً أمكن رؤية
الومضات وأتة غير منتظم بل يتألف
من عدة ومضات متقطعة تحدث كل
واحد منها من تحطيم جسيم من جسيمات الفا
[انظر الحاشية أسفل صفحة ٣٢]




١ — جهاز خلج ولين
الاناء المائي هو الخلج وفيه يتحدد البل في الهواء وتلتقط الصور
خلال زجاج قبة الاناء المائي
ب — مسارات الالكترونات المتحركة وقد كبرت بحيث
تظهر التقطعات المفردة
ج — مسارات جسيمات ألفا خلال غاز الهليوم وهي من جوا.
التصادم تشبه شوكة الطام

[انظر صفحة ٣٥]



تمثل الكرات السود ذرات الصوديوم وتمثل الكرات
اليغن ذرات الكلور
بلورة كلورور الصوديوم



تمثل الشكل ترتيب
ذرات الكربون فقط
[انظر صفحتي ٦٠ و ٦١]
بلورة الماس

الطيف بسبع النجوم


طيف الشمس

طيف النور الوافع

طيف السرى


طيف إحدى نجوم الدب الأكبر

طيف آخر لنفس النجم رسم بعد رسم الطيف الأول ويرى كل
شيء في الطيف وقد ازدوج لذلك على أن النجم ثنائي



مقياس الدخول النجمي

[انظر صفحة ٧٨]




رسم تخطيطي
يوضح تجربة ميكسون ومورلي



جهاز تجربة ميكسون ومورلي

توضيح تجربة ميكسون ومورلي بالقطار المتحرك والهدف المثبت فيه



يستطيع مسافر في القطار
ان يقيس سرعة تحركه باطلاق
الرصاص على هدفين مثبتين في
القطار كما في الشكل وذلك بايجاد
الفترة الزمنية بين عودتي الطلقتين.
ولا يمكن التغلب على مصاعب
إجراء هذه التجربة ولكن
أساسها المنطقي سليم


انحراف الضوء

الموضع الحقيقي
الموضع الظاهري




الأرض


[انظر صفحة ٨٧]



فلك عطارد



المسلك الجسيمي للإلكترونات (المسارات)



المسلك الموجي للإلكترونات (الحبيود)

[انظر صفحة ٩٩]

مراجع الكتاب

- 1 The New Physics, by Arthur Haas.
- 2 The New Background of Science, by Sir J. Jeans.
- 3 The Mysterious Universe. " " "
- 4 A Short History of Physics by H. Buckley.
- 5 Beyond Physics, by Sir Oliver Lodge.
- 6 Science & Human Experience, by H. Dingle.
- 7 The Universe of Science, by H. Levy.
- 8 Relativity : The Special & The general Theory, by A. Einstein.
- 9 Outline of Science, by J. A. Thomson.
- 10 Science To-day, by J. Lancelot Smith.
- 11 Stars, Atoms & God by H. E. Kirk.
- 12 The Foundations of Science, by H. Poincaré.
- 13 The Universe in the Light of Modern Physics, by M. Planck.
- 14 The World in Modern Science, by L. Infeld
- 15 New Worlds for Old, by R. G. Lunnnon.
- 16 The Mechanism of Nature, by Dr. Andrade.
- 17 The Restless Universe, by Max Born.
- 18 Encyclopaedia Britannica, 13th. 14th. editions.

فهرس

صفحة

| | |
|-----|--|
| ج | مقدمة |
| د | القسم الأول : حاضر الفيزياء وفيه أربعة عشر فصلاً |
| ١ | الفصل الأول — ذرات الكهربية |
| ٩ | الفصل الثاني — الموجات الأثيرية |
| ١٧ | الفصل الثالث — نظريات بناء الذرة |
| ٣٧ | الفصل الرابع — عجيبة الراديو |
| ٤٥ | الفصل الخامس — أشعة إكس والضوء فوق البنفسجي |
| ٥٢ | الفصل السادس — الموجات الكهربية الطويلة |
| ٥٧ | الفصل السابع — القوى السكاثية في داخل المادة |
| ٦٣ | الفصل الثامن — بناء البلورات |
| ٦٨ | الفصل التاسع — الطاقة |
| ٧٥ | الفصل العاشر — الهواء والصحور |
| ٨١ | الفصل الحادي عشر — في داخل النجوم |
| ٩٠ | الفصل الثاني عشر — الجاذبية والنسبية |
| ٩٦ | الفصل الثالث عشر — نظرية الكم |
| ١٠٧ | الفصل الرابع عشر — الميكانيكا الجديدة |
| ١٠٩ | القسم الثاني : مستقبل الفيزياء وفيه ستة فصول |
| | الفصل الخامس عشر — العلوم تتلاقى |

| | |
|-----|--|
| ١١٥ | الفصل السادس عشر — مبارزة حديثة : أينشتين وإدنجتون في جانب ٦ وبرجسون وهوايتهد في جانب آخر |
| ١٢١ | الفصل السابع عشر — الزمن في الفلك وفي الفيزيكا |
| ١٢٥ | الفصل الثامن عشر — تجربة تطورية |
| ١٣٢ | الفصل التاسع عشر — الفيزيكا والمقل |
| ١٣٧ | الفصل العشرون — مستقبل العلوم |
| ١٤٣ | جدول التوابت الذرية |
| ١٤٤ | جدول العناصر وبه تفصيلات البناء الذري |
| ١٤٨ | جدول النظائر (للعلامة انفلد الألماني) |
| ١٥٠ | جدول النظائر (للعلامة ماكس بورن الألماني) |
| ١٥٥ | ذيل يتضمن أحدث الكشوف الفيزيكية |
| ١٦٨ | صورة خطاب وزارة المعارف إلى المؤلف بصدد هذا الكتاب |
| ١٦٩ | مراجع الكتاب |



تأليف

إبراهيم بن عبد الله

الفيزياء الكلاسيكية

حَاضِرُهَا وَمُسْتَفِيدُهَا

كتاب هو الاول من نوعه في بسط نظريات العلم الحديث في غير تعمق ولا تبذل . يقدم لقارئة دنا جديدة في الفرات وفي النجوم ، ومعلومات شيقة عن الموجات الاتيرية ، والقوى الكامنة في المادة ، وتبادل التحول بين المادة والطاقة ، وبناء البلورات ، والجاذبية والنسبية ، ونظرية الكم والميكانيكا الموحية . ويفسر المادة والحياة والعقل تفسيراً علمياً . ويدرس مسألة الزمن على ضوء كل من علمي الفيزياء والفلك . قالت عنه لجنة الفحص بوزارة المعارف « ان المعلومات الواردة فيه قد تناسب ادراك طلبة الجامعة المصرية الذين يدرسون مواد تتصل بعلم الطبيعة » . موضح بالصور والرسوم
[أصدرته ادارة المتتطف]
الثنى ٢٥ قرشاً صاغاً والبريد ٣ قروش

عجائب الفيزياء

علم وقصص

نال هذا الكتاب جائزة مالية من وزارة المعارف العمومية في المباراة العلمية لتشجيع الانتاج الفكري بين المدرسين لعام ١٩٣٨-١٩٣٩ المدرسي . وهو الاول من نوعه . ويتضمن حقائق « علم الطبيعة » مبسطة كل التبسيط . وهو للطالب وغير الطالب علم ومثمة . خال من التعميدات الرياضية . تفرداً وكتاباً ثك
تقرأ قصة فتخرج منه بخلاصة وافية لقواعد « علم الطبيعة » الذي يدرس في المدارس والجامعات .
والكتاب مزين بصور كثيرة ومثمة ٢٥ قرشاً والبريد ٣ قروش
يطلب هذان الكتابان من مكتبة النهضة المصرية بشارع الداغ أمام جريدة الاهرام
ومن المؤلف بمنزله رقم ٢٣ بشارع المختار بالروضة بمصر تليفون ٥٤٩٩٦ هـ

ترجمته
أحمد فهمي أبو الخير
عَلَى حَافَةِ الْعَالَمِ الْأَشْرَى

تأليف العلامة ج . آرثر فندلاي رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي بلندن
أحدث هذا الكتاب ثورة في البينات العلمية والدينية في أوروبا وعلى الأخص في إنكلترا . ترجم إلى
عشرين لغة ، وطبع أكثر من أربعين طبعة عدا الطبعة الخاصة بالعرب . يحدّثك عن عالم الروح وكيفية
الاتصال به ، ويبيّن لك في خريطة الكون . الحقائق المذكورة فيه مبنية على أحدث نظريات العلم الحديث .
يثبت لك بشكل عملي أن الحياة خالدة ، وأن الموت ليس الا ولادة لحياة جديدة أرق وأرقى ، وأن من
نفسهم « موفى » تستطیع بتوافر شروط خاصة أن تراهم ونما تهم ونحس بهم وتتجاذب معهم أطراف
الحديث ، ونصورهم بالفوتوغرافيا ونسجل أصواتهم ونصورهم على شريط سينمائي ناطق
الكتاب مزين بالصور والرسوم ومثته ١٥ قرشاً صاغاً وأجرة البريد ٣ قروش

طواهر حجرة تحضير الأرواح

تأليف الطبيب الدكتور ادوين فردريك باورز
أستاذ الأمراض العصبية في جامعة منيا بوليس بالولايات المتحدة بأمريكا
جمع المؤلف في هذا الكتاب أهم ما حدث من التجارب الروحية في العصر الحديث ، وأعاد من جديد
تجارب التجسد التي كان أجرى مثلها سير وليم كروكس من كبار علماء الفيزياء والكيمياء في القرن الماضي
والدكتور باورز كرجل طبي أجرى كشفاً طبياً بسماع الصدر (استينوسكوب) على روح تجسد تجسداً
كاملاً مثل الإنسان والعماء ، وكتب نتيجة الفحص تقريراً أمضاه هو وطبيبان غيره . وذكر للاكتوبلازم
تحليلاً ميكروسكوبياً ، وقص خصلة من شعر روح والذته وقد تجسدت ، وبعد انصرافها فحص الشعر فحصاً
طبيعياً . والكتاب سلسلة من المفاجآت العلمية العملية المدهشة التي تحير الالاب . وكلها مؤيدة من رجال
مستولين بين أطباء وغيرهم من أعضاء جمعيات البحوث النفسية بأمريكا وأوروبا
التي ٢٠ قرشاً صاغاً وأجرة البريد ٣ قروش

[تحت الطبع]

يطلب هذان الكتابان من مكتبة النهضة المصرية بشارع المدايق أمام جريدة الاهرام
ومن المترجم بمنزله رقم ٢٣ بشارع المختار بالروضة بمصر تليفون رقم ٥٤٩٩٦

كتب أمري للمؤلف

بين تأليف وترجمة

أولاً — روايات فضائية :

سنة ١٩٢٦

المملوك المفقود

سنة ١٩٢٦

الأميرة المصرية

ثانياً — كتب علمية :

سنة ١٩٢٥

مذكرات التاريخ الطبيعي

سنة ١٩٢٩

السيناتور غراف وهندسه

سنة ١٩٣٠

علوم العرب الرياضية وانتقالها الى اوربا

سنة ١٩٣٠

هرم الحيزة الأكبر — مقاصده وعملياته البنائية

سنة ١٩٣١

حرب الغازات (محاضرة)

ثالثاً — سلسلة مقالات في العالم الرومي الهريث :

سنة ١٩٣٩

ظواهر الروحية (ملخص أعمال سير ولیم كروكس)

سنة ١٩٣٩

خلق الانسان من تراب

سنة ١٩٤٠

عالم الروح في ضوء العلم الحديث

سنة ١٩٤٠

العلاج الروحي كما يراه الطبيب الدكتور ادوين فردريك باورز سنة ١٩٤٠

بحث الطبع من هذه السلسلة

بين العالمين المادي والروحي للطبيب الدكتور كارل ا. ويكلاند

بحث في الروحية للطبيب الدكتور كارل ا. ويكلاند

العلاج الروحي كما يراه الطبيب الدكتور جورج لنديسون

العلاج الروحي كما يراه الطبيب الدكتور الكسندر كانون

رسائل في العلم والادب والاجتماع من عالم الروح